






K. VII. 59.

Const. 15. Xr.

Bot.

o.

34

Bip.

HORTUS ALSATICUS

PLANTAS IN ALSATIA

NOBILI,

INPRIMIS CIRCA ARGENTINAM
SPONTE PROVENIENTES, MENSTRUO, QUO
SINGULÆ FLORENT, ORDINE
DESIGNANS,


ANNEXO CHARACTERE,
LOCO NATALI, AC FLORUM COLORE,
ADDITIS ALIQUIBUS ICONIBUS, ÆRI
AD VIVUM INCISIS,
UT ET ALIIS

AD BOTANICES DOCTRINAM
RITE ADDISCENDAM PERTINENTIBUS,
IN USUM BOTANOPHILORUM
EXCURSIONES FACIENTIUM
CONSCRIPTUS

A

FRANC. BALTHASARE
von Sindern,

MEDICINÆ DOCTORE ET PRACTICO.



ARGENTORATI,

Impensis JOANNIS BECKII, Bibliopolæ

M D CC XLVII.

Cuilibet Medico-Practico rectissime
confirmante Galeno incumbit, ut
omnium Plantarum, quæ in usu
sunt & in usum cedere possunt,
exactam habeat notitiam, arma
enim ejus sunt optima, quibus
morbos, per Dei Gratiam, deduce-
re potest etiam gravissimos; ideo-
que Scientia Botanica Medici-
nam facienti summe necessaria
minimeque spernenda est.



PRÆFATIO.

Lectori Botanophilo Salutem!

PRodit nova facie Lector benigne!
botanicus laboris mei foetus, alio
insignitus titulo, multo auctior at-
que correctior. Diu quidem anceps
hæsi, an dignus sit, qui prælo commit-
tatur, cum præclarum illud Opus post-
humum botanicum, sub nomine Hi-
storiæ plantarum Alfaticarum Viri bea-
tæ memoriæ Marci Mappi, haud ita
pridem, à Fautore, Collega atque Cogna-
to meo Dn. Joh. Christiano Ehrmann,
Viro tam solida eruditione, quam felici æ-
grorum cura conspicuo, e cineribus quasi

PRÆFATIO.

erutum orbique erudito communicatum fuerit.

Verum enim vero cum nullus labor ita ex omni parte perfectus esse soleat, quin aliquid addi possit, idem quoque de dicto hoc opere valet; multæ enim supersunt plantæ, quæ visum Tanti Viri subterfugerunt, mihi autem excursions botanicas à prima juventute ad hunc usque diem in deliciis habitas instituenti occurrerunt. Cum itaque jam dudum apud me constitutum habuerim, novam Tournefortii mei Alsatice editionem adornandi, hunc laborem à me suscipiendum eo minus inutilem fore arbitratus sum, cum hoc ipso pulchram defectum laudati illius operis supplendi nactus sim occasionem. Alsatia autem nostra suavissima, cum nusquam steriles montes & incul-

PRÆFATIO.

incultos agros, sed fertilissimos undique campos habeat, atque amœnissimos hortos ab ipsa natura excultos repræsentet, ideo Horti Alfatici titulum huic opusculo præfigere libuit.

Coeterum facillimam rei herbariæ addiscendæ methodum elegi, cuncta sedulo declinando, quæ vel minimam memoriæ torturam inferre possent.

In fronte statim hujus libelli prima hujus doctrinæ Elementa conspicias, quibus expositis, ipsa sequitur plantarum enumeratio.

Ad facilitandum autem illarum collectionem, non tantum juxta menses, quibus singulæ florent, ordine alphabetico eas recensui, sed & notas earum characteristics ac locum natalem apposui, non neglecta perennitatis, vocumque gallicarum ac germanicarum mentione

PRÆFATIO.

atque retento simul, quantum pro scopo meo licuit, systemate Tournefortiano. In fine quoque vocabulorum plerorumque botanicorum derivationes addere placuit.

Nec omisi consulere in hac mea plantarum indagatione Botanicorum Proceres, Bauhinos, Tabernæmontanum, Dalechampium, Clusium, Lobelium, Rayum, Scheuchzerum, Zwingerum, Ruppium, Garidellum, Dillenium & fulgidissimum nostræ ætatis Sidus Hallerum aliosque, quorum vel sola nomina botanices Studiofo Reverentiam & Laudem infinuant.

Accipe itaque Lector benevole! hunc meum qualemcunque laborem, eo quo Tibi à me offertur animo, mihi que in posterum fave.



BOTANOLOGIÆ FUNDAMENTA GENERALIORA, PLANTÆ DIVISIONEM EXHIBENTIA.

Cap. I.

I.

Planta quævis dividitur, in Herbam Fruticem, Suffruticem, vel demum etiam in Arborem.

2. Herba Planta est perennis, foliosa non lignosa, cujus caulis singulis annis perit, vel arefcit, novo deinde renascente ut Gramen.

3. Frutex, Planta est gemmipara, ad arboris magnitudinem non accedens, Caudice multiplici & ramosa, quæ succifa semper suppullulet, ut Rosa, Rubus vulgaris & Idæus.

4. Suffrutex Planta, humilior est Frutice, furculosa & lignosa, non gemmipara, ut Lavendula, Salvia.

5. Arbor Planta est perennis, omnium maxima, atque altissima, trunco simplici, crasso, duro, cortice lævi aut aspero, simulque ramosa, ut Quercus, Betula, Fraxinus, & est vel Julifera, ut Castanea & Corylus.

Pomifera, ut Malum, Cydonia, &c.

Conifera, ut Abies & Pinus.

Baccifera ut Cornus & Sorbus Aucuparia.

Pruni-

Prunifera, ut Persica & Prunus
Siliquosa, ut Cytisus & Colutea Versicaria
Item Tamarindus.

6. Planta quævis, etiam ratione Durabilitatis, est vel Annua, vel Perennis, vel Sempervirens.

7. Planta annua est, quæ annuatim decre-
scit, disparet & emoritur, quæque etiam se-
mine proprio iterum refurgit terræ comisso, ut
Phaseolus, Raphanus &c.

8. Planta Perennis autem, quæ omnem fri-
goris sævitiam eludit, neque morte depascitur,
ut Erica & Buxus.

9. Planta sempervirens est, quæ folia nun-
quam deponit, ut Sabina & Buxus, aut si de-
ponat, iterum alia producit, ut Ficus & Vitis
Canadensis.

10. Porro etiam quævis Planta differt 1.)
quoad Locum, in quo provenit, alia enim est
Campestris, alia Sylvestris, alia Montana, alia
in Convallibus exfurgit, alia est Paludosa, alia
in & sub aquis nascitur, alia Maritima alia in
Nemoribus & Dumetis, alia in Pratis, alia aliis
in locis viget. & sic porro.

2. Alia quoad Qualitatem, alia enim est succi
expers, alia succulenta, liquorem varium tam
quoad saporem vel colorem fundens.

3. Ratione partium constitutivarum, quoad Ra-
dicem, Caulem & Fructus, quæ vero Caule ca-
ret dicitur Acaulos.

11. Radix, Plantæ præcipua pars est ima ter-
ra infixæ, qua Nutrimentum, pro Augmento &
Con-

Conservatione cauli, Foliis, coeterisque partibus affertur.

12. Folium plantæ pars est, ad ejus Ornamentum constitutum, constans ex petiolo aut eo carens atque costæ adhærens.

13. Petiolus, plantæ pars est, estque vel brevis vel longus, folium sustinens & cauliconnectens.

14. Caulis herbarum virga est, é radicibus immediate assurgens, variæ figuræ, quæ floribus foliisque ut plurimum donari solet; in Arboribus dicitur Caudex, in Frumentis Culmus estque vel simplex vel ramosus.

15. Quodlibet Folium, consideratur vel 1. quoad ejus Magnitudinem, aliud enim Magnum, aliud amplum, aliud parvum aliud minimum est. 2. vel ratione Formæ, dum rotundum, subrotundum, ovatum, lunatum, umbilicatum, planum, latum, angustum, longum acutum, aculeatum, lanceolatum, crispum, rugosum, verrucosum, sagittatum, undulatum, crenatum, ferratum, denticulatum, auriculatum, stellatum, digitatum, angulatum seu sinuatum, pennatum, pinnatum, fistulosum, læve atque hirsutum & lanuginosum est, & sic porro. 3. ratione Coloris, pleraque folia viridia sunt, quandoque alius coloris, quandoque etiam splendentia. 4. ratione odoris, aliud suaveolentem aliud foetidum & nauseosum, aliud nullum de se spirat odorem 5. ratione substantiæ, dum est vel pingue, tenue aut carnosum vel crassum, ficcum aut succulentum,

lentum, vel fundens succum virosum, lacteum, luteum &c. 6. Variat etiam ratione Situs, aliud exsurgit alternatim, aliud conjugatim, aliud verticillatim vel stellatim & cruciatim, aliud est inperforatum aliud foraminulis præditum &c.

16. Fructus cujuslibet plantæ Foetus est, vel pars plantæ ut plurimum annua, flori cohærens eique succedens.

CAP. II.

Florum structuram demonstrans.

I.

Flos est, pars plantæ extima, tenuior, fructui prævia, ejusque stamina in suo meditullio fovens, vel colore suo, vel odore, vel utrisque simul, inligne ejusdem ornamentum existens.

2. Partes autem Floris, sunt 1. Petala seu Florum folia, quoad numerum inter se discrepantia vid. Cap. 3. Stamina seu Capillamenta tenuia, floris medium tenentia, cum & sine apicibus, quæ vero apicibus carent Capillamenta proprie dicuntur. 3. Apices sunt Summitates & Cacuminula, staminibus incumbentia, 4. Pistillum seu Stylus, qui media pars floris est, ex umbilico aut centro inter stamina exsurgens, & nascenti Fructui adhærens
5. Ca-

5. Calix seu Perianthium, posterior floris pars est, Florem & Fructum vel involvens vel sustinens, vel utrumque præstat, sed non in omnibus observatur, differt sola figura & situ, variam repræsentans figuram vel nudus est vel foliolis obsitus &c. 6. Ovarium quod Theca seu Capsula est, semina includens, est multiformis vel uni-bi-tri-aut multicapsularis. &c.


Qui hisce gaudet partibus, ille Flos dici solet Perfectus, qui vero Petalo vel Stylo aut Staminibus caret, dicitur Imperfectus. ut in Corylo &c.

3. Porro Flores etiam considerantur ratione Situs. & Fructus, alii proveniunt longa serie, in summis ramulis, alii nascuntur verticillatim aut spicatim vel in Aristam, alii umbellatim aut racematim vel fasciculatim vel etiam in Pyramidem assurgunt &c.

4. Fructus ratione, alius enim est Capsulatus alius angiospermus, id est semine nudo ut in Jalapa, Cerinthe, alius angulosus, echinatus, umbilicatus, cellulofus, filiquosus, leguminosus articulofus, glaber vel lanuginosus &c.



CAP. III. Florum Differentias Fundamentales continens.



CAP. IV.

Clavem Literarum designatarum explicans.

- a. **F**los est, qui præter Stamina vel Capillamenta etiam habet Petala, vel majora vel minora, æqualia aut in æqualia ut in Ranunculo & Phaseolo.
- b. Qui Petalis caret, & totus vel ex staminibus seu Capillamentis tantum constat, ut in Sparganio & Equiseto.
- c. In quo nec Flosculi nec Semiflosculi adsunt, ut in Ceraso aut Pruno.
- d. Qui componitur ex flosculis aut semiflosculis, ut in Cyano, aut ex Flosculis tantum, ut in Dente leonis, vel ex utrisque ut Doronicum.
- e. Qui præter Stamina seu Capillamenta stylum ambientia, nil habet, unde nomen trahere potest ut in Equiseto & Ilice.
- f. Seu Iulus, qui ex staminibus tantum, aut apicibus vel foliolis quibusdam componitur ut in Corylo & Nuce juglande.
- g. Qui unico vel pluribus petalis donatur, & totus seu integer ab ovario decedit, ut in Digitali, Volvulo, Nicotiana.
- h. Qui duobus saltem petalis gaudet ut in Circea, Stellaria & Hederula palustr. Tabern.
- i. Qui ex tribus petalis est confectus, ut in Plantagine aquatica & Ranæ morfu, Cucubalo.
- k. Qui constat ex multis petalis planis ut in Quinque folio, Alsine, vel superimpositis qui postmodum multiplex seu plenus audit, ut in
Leu-

- Leucojo & Caltha feu Calendula hortensi.
- l. Qui ex plurimis flosculis feu petalis fistulosis est compositus, ut in Iacea, Carduo &c.
 - m. Cujus petala inferna tantum parte fistulosa, sunt, media vero & superna parte plana conspiciuntur, & dense in orbem posita sunt, ut in Scorzonera, Chondrilla.
 - n. Qui ex duabus partibus est confectus, Disco nempe flosculofo & Circumferentia, quæ etiam Corona audire solet semiflosculosa, ut in Bellide Iacobæa &c.
 - o. Qui maxime Campanæ formam obtinet, ut in Campanula, Gallio.
 - p. Cujus inferior pars tubulata, superior vero in Conum inversum infundibuli inttar diducta est, ut in Auricula Urfi, Symphyto, Cynoglossio.
 - q. Ubi petala circa discum, rotæ in modum annexa sunt, ut in Bellide, Chamæmelo.
 - r. Qui Faciem æmulam cujusdam personæ habet, vel rostrum animalis, rictu & labiis representat, ut in Antirrhino, Linaria &c.
 - s. Cujus pars inferior labio unico tantum, ut in Scordio, Bugula, Chamædri, ut plurimum autem gemino vel trifido Barba nonnullis dicta scissa est, in superiore autem Galea vel integra, ut in Lamio Cardiaca vel divisa ut in Serpillo atque Melissa comprehenditur.
 - t. Qui sub nomine singulari comprehendi nequit, ut Aristolochia, Scrophularia &c.
 - u. Qui gaudet quatuor petalis cruciatim dispositis, simulque calicem pari numero petalorum habet, ut Crucjata, Brassica

x. Cujus petala quaternum numerum superant
ut in Salicaria, Rosa, Pyro.

y Cujus petala ex ipso calice tanquam é tubu-
lo emergunt, uti est Linum, Lychnis, Caryo-
phyllus &c.

z Qui ex 6 petalis, quandoque tribus constat, aut
in 6 partes ad Lili formam accedens secatur,
ut in Asphodelo, Colchico, Hyacintho.

aa Qui suis petalis, Papilioni alis expansis non
infimilis est, aut qui constat ex petalis diffimi-
libus & cujus superior pars Vexillum, inferior
Carinam, duo lateralia Alas repræsentant, ut
in Lathyro Piso &c.

bb Qui velut in Pelvim extenditur, ut in Bryo-
nia, Gentiana.

cc Qui angustus & oblongus est, ut in Capri-
folio, Xylostio.

dd Cujus os angustius est Ventre, ut in Myrtillo
Uva ursi.

ee Cujus Tubus ejus in Discum non in conum
explicatur, ut in Primula Veris, Androface &c.

CAP. V.

Terminos Technicos in Descriptione usuales designans.


Acaulos, Planta est, quæ nullo gaudet Stylo ut in Carli-
na acaulos.

Acinus, semina vel granula baccis inclusa significat, ut
in Alkekengi, Solano.

Alæ, petala sunt lateralia, florum papilionaceorum, inter
vexillum & carinam posita.

Alatus caulis est, qui circa caulem, ab ima parte ad su-
premam, longitudinalia habet folia, ut in Lathyro, Bidente
Americano,

Ari-



Arista, Acus est exilis & longa, é glumis seu folliculis grani constans, ut in frumento.

Bulbus, Radicem denotat, suis membranis vel tunicis in orbem politis, vel etiam squammatim incumbentibus coagmentatam.

Calcar, floris pars est, quæ in ejus posteriore parte caudam habet vel brevem aut prælongam ut, in Elatine, Pinguicula & Orchidibus quibusdam & Delphinio.

Capitulum, quando flores in suprema styli parte in orbem vel in globum rotundum glomerantur, ut in Allio Cepa, Globularia &c.

Capreolus seu Clavicula; filamenta sunt tenuia in planta, circinnum in modum intorta, quibus stipibus vicinis annectuntur, ut planta se in altum erigere possit, ut in lathyro, Bryonia.

Carina, Petalum est papilionaceorum florum inferius, navem concavitate sua repræsentans, ut in Faba, Piso Asphodelo.

Cilium est quando Calicis margo squamosus villis obsitus est, ut in Iaceis quibusdam.

Corymbus est Fasciculus plurimorum flosculorum globosus vel semi globosus, ut in Opulo, Hedera.

Culmus, Caulis est Frumentorum & Graminum geniculatus.

Geniculum est Articulus seu Nodus, ut in Graminibus, in Lychnide sylvestri. Cicutaria foetida.

Gluma, est congeries granorum in folliculo, ut in Frumento.

Julus est, Fasciculus flosculorum apetalorum vermiformis, ab arboribus dependens ut in Corylo.

Panicula, est congeries ramosa, florum numerosum, in spicam longam digesta, ut in gramine miliaceo & hordeaceo

Pappus est Lanugo seminibus quibusdam inhærens, ut in Hieracio Carduo &c.

Spica est Conus & oblongus florum erectus ut in Plantagine, Bistorta.

Umbilicus, media pars est seu Floris Centrum.

HOR.



HORTI ALSATICI PLANTARUM FLORENTIUM MENSIS

JANUARIUS ET FEBRUARIUS.

Helleborus niger, amplioribus foliis
Tournesf. Instit. R. H. *Flore rosaceo ex al-
bo leviter rubente, folio latiori digitato, ra-
dice fibrosa nigra, amara & acri, fructu multi-
capsulari* Christ oder schwarze Nießwurzel,
mit breiten tief eingeschnittenen Blättern. Ic. Ta-
bernæmont hist. Plantar. sub. titulo, Veratri
nigri Stiriac. pag. 1099. Gallis. *Ellebore noir à
feuilles larges*, hin und wieder in Gärten. perenn.

Helleborus niger angustioribus foliis. T. Ic.
Clus. hist. rar. plant. pag. 274. *Sub nomine Ellebo-
ri nigri legitimi. rechte schwarze Nießwurzel, mit
schmahlen eingeschnittenen Blättern. Gallis,
Ellebore noir, à Feuilles étroites. ibid. perenn.*

MENSIS.
FEBRUARIUS ET MARTIUS.

Alyssum vulgare polygoni folio, caule nu-
do. T. *Sive Bursa pastoris minima, oblongis siliquis*
A verna

verna loculo oblongo IB. 937. *Quæ Alsine V. minima* Tabern. Hist. pag. 1087.

Plantula hæc, ex omnibus campestribus, statim ineunte vere, flosculis suis copiosis-
simis, jucundo aspectu, margines dealbat, un-
de etiam à nostratibus appellantur die Früb-
lings Blümlein, aliàs Gänse Blümlein oder Nä-
gelkraut. *annua.*

Corylus sylvestris T. seu *vulgaris flosculis*
amentaceis, foliis Alni æmulis latioribus serratis; fru-
ctu rotundo albo minore. gemeine wilde oder
Wald Haselstaude Lobel. icon pag. 192. Gall.
Noisetiere sauvage, in Wäldern und in denen He-
cken. *perenn.*

Corylus sylvestris, latiore folio, virgis re-
ctioribus & minus ramosis Dillen. Catalog.
plant. Giff. Haselstaude, mit breiten Blättern
und stracken Schossen oder Berten, in denen Wal-
dungen Oßwald und Gänßau. *perenn.*

Corylus fativa, fructu albo minore. T.
Garten Haselstaude Ic. Clus hist. 11. *Noisetiere*
domestique, perenn. non differt à Sylvestri vulgari,
nisi cultura mitiori.

Corylus fativa fructu oblongo rubente T.
Blut Haselnuß Staude, mit ablanger Frucht.
Ic. Zwinger Theatr. Botan. *Noisetier Franehe* hin
und wieder auf dem Land auf denen Höfen und in
Gärten, *perenn.*

Corylus fativa, fructu oblongo albicante
T. Haselnuß Staude mit weiser langer Frucht.
ibid. perenn.

Corylus

Corylus fativa fructu rotundo maximo T. seu Avellana Lugdunensis major. Camerar. Hort. Römisch oder Italiaenische Haselnuß Staude, mit der größten Frucht, in Gärten der Stadt und des Landes Avellanier Italien. perenn.

Cornus hortensis Mas T. five domestica fructu rubro, oblongo officulis fæto, flore rosaceo luteo, foliis virgæ sanguineæ similibus. zahmer Welsch-Kirsch-Baum Ic. Tabern. hist. plant. pag. 1459. Coronuillier Mâle ou Cornier domestique aller Orten in Gärten. perenn.

Cornus hortensis Mas, fructu ceræ colore T. Welsch-Kirsch-Baum mit gelber Frucht. ibid. perenn.

Cornus hortensis Mas, fructu albo T. Welsch-Kirsch-Baum mit weisser Frucht. ibid. perenn.

Cornus sylvestris Mas, T. five spontanea wilder Welsch-Kirsch Baum, hin und wieder in Wäldern und Büschen, in dem Zalkircher und Osvalder Wald. Ic. Clus hist. 13. Cornier sauvage perenn.

Helleborus niger foetidus T. flore rosaceo herbaceo, radice tenui nigra, foliis angustioribus profunde incisiss & serratis, five Helleborus niger sylvestris adulterinus hyeme etiam virens IB. 3. app. 880. Est Helleboraster maximus Hort. Eyst. flore & semine prægnans Lobel. Ic. pag. 679. & Garidel. hist. plant. Tab. 48. groß Läuse Kraut, groß stinckende Nießwurzel. Ellebore puant ou batard. perenn. am Weg wenn man von Sulz auf Molsheim gehet, nahe an der Capell.

Narcisso-leucojum vulgare T. *unico flore simplici liliaceo, rarius bino pendulo, foliis longis splendentibus fructu turbinato tripartito* five Leucojum bulbos. hexaphyllum. Ic. 1. Tabern. hist. 1005. & Bauh. 2. 590. Hornungs oder Merken Blum potius grosse weisse Schnee-Glöcklein, in schattichten Hohen-Gebürgen, und bey uns in den Gärten. *perenn.*

Narcisso-leucojum minus trifolium T. *tribus petalis albis minoribus cingentibus, terna majora herbacei in limbo coloris, foliis angustioribus longis glaucis, fructu ovato* five Leucojum bulbosum præcox minus Clus. pan. pag. 181. kleine Schnee-Tröpflein Ic. Clus. hist. pag. 169. est Narcissus VI. Matthiol. hin und wieder in Gärten.

MENSIS

MARTIUS ET APRILIS.

Acer montanum candidum T. *foliis in ferne candicantibus latifoliis angulatis, pediculis rubentibus annexis, floribus rosaceis ex viridi flavescentibus, fructu alato gemello multi capsulari* five Acer major, multis falso Platanus IB. I. 168. five Acer latifolium Clus. Ic. pag. 9. Ahorn-Baum mit tief eingeschnittenen Blättern Erable de montagne, ou Sycomore auf dem Hochgebürg Hochfelden und St. Ottilienberg *perenn.*

Alnus rotundifolia glutinosa viridis T. five Alnus vulgaris IB. I. 151. *floribus amentaceis fru-*

fructu squamoso. Erlen oder Eisenbaum, quia ejus lignum in aquis ferri instar durum fit & diu durat. Ic. Tabern. hist. 1395. Année. wächst aller Orten, an dem Rande des Wassers, an der grünen Wart. perenn.

Alnus folio incano T. foliis acuminatis longioribus, subtus incanis superne vero hirsutis five *Alnus incana* & *hirsuta* IB. 1. 154. roth Erlen, in dem Granwört, neben den Gartners Feldern. perenn.

Alnus Alpina minor. T. foliis Ulmi Fleiner Berg Erlen-Baum, in denen Bergen gegen Hochfeld. perenn.

Bellis sylvestris minor T. sive spontanea IB. 311. *flore prorsus albo radiato, foliis laciniatis, radice tenui.* Kleine Maßlieben oder Zitter-Nößlein, mit ganz weissen Blumen, Paquerette ou petite Margueritte hin und wieder auf denen Wiesen. Ic. Tabern. hist. 708. perenn.

Bellis sylvestris minor flore mixto T. Ic. in H. Eyst. gesprencfte Zitter-Nößlein. perenn. *Paquerette tachetée.*

Brassica campestris perfoliata T. sive Perfoliata siliquosa IB. 2. 835. *flore albo cruciformi, foliis pallide viridibus, corniculis longis quadrangulis, radice longa fibrosa alba, fructu siliquoso bicausulari* durchwachsender Feld-Rohl, mit Steck-Ruben Blättern. Ic. Clus. hist. pag. CXXVII. est *Perfoliata napifolia* Tabern. hist. 1140. in denen Frucht und Kraut Hecken. ann.

Brassica campestris perfoliata, flore purpureo T. five *Perfoliata siliquosa purpurea* Clus. IB. 2. 836. Wilder Kohl mit Steckruben Blättern und rötlichten Blumen, in denen Feldern bey Ohwald.

Bursa pastoris major, folio sinuato T. five *Bursa pastoris* IB. 2. 936. *capsula brevi cordata, flosculis albis cruciformibus, radice alba tenui fibrosa* groß Täschel-Kraut, mit gekerbten Blättern, neben denen Wegen und auf gebautem Grund. Ic. Tabern. hist. 512. & Lobel. Ic. pag. 221. *Tabouret ou Bourse à Berger. ann.*

Bursa pastoris major folio non sinuato T. groß Täschel-Kraut mit ungekerbten Blättern. *ibid. ann.*

Bursa pastoris media T. five minor *Tabernæm. hist. 512. petite bourse à berger* klein Täschel-Kraut, auf sandigem und durren Boden, an denen Zäunen und Wegen. *ann.*

Buxus arborescens foliis pictis, per limbum aureis T. *floribus apetalis luteis*, gemahlter Buchs, Zaun Buchs. *Buis peinte* Ic. Munting. hist. plant. in Gärten. *perenn.*

Buxus arborescens T. *foliis oblongis atro rubentibus & splendentibus*. Steigender Buchs, oder Buchs-Baum. Ic. 1. Tabern. hist. 1164. in unterschiedlichen Gärten und Bauren-Höfen. *perenn.*

Buxus foliis rotundioribus T. five *Chamaebuxus*. Tab. hist. 1464. Ic. 2. gemeiner Schnitt oder Ländel Buchs. *Buis, perenn.*

Chrysosplenium, foliis amplioribus auriculatis

latis T. five *Saxifraga aurea* Dod. IB. 3. 707. floribus apetalis stamineis hirsutis, radice filamentosa. fructu sicco globoso. Gulden Milk-Kraut. Ic. Tabern. hist. 1124. & Hort. Eyst. fig. 5. Herbe St. Christofle an feuchten Ränden rinnender Bächlein auf dem Gebürg hinter Ottrott, bey der Segmühl, perenn.

Chrysosplenium, foliis pediculis, longis insidentibus T. gulden Milk-Kraut, mit langen stielechten Blättern, an fließenden Quell-Wässern, hinter Haslach. perenn.

Chrysosplenium foliis minoribus subrotundis T. gulden Milk-Kraut, mit kleinen rundlechten Blättern, bey dem Brunnen, auf dem Berg der heiligen Ottiliæ. perenn.

Cupressus meta in fastigium convoluta, quæ foemina Plin. T. perpetua fronde virens, floribus amentaceis, foliis sabinae æmulis atro virentibus fructu squamoso. Cypressen, in denen Lust-Gärten, le Ciprés femelle Ic. Tab. hist. 1353. perenn.

Cupressus ramos extra se spargens, quæ Mas, Plin. T. Ic. Mathiol. epitom pag. 52. le Ciprés masle. ibid. perenn.

Equisetum arvense, longioribus setis T. five *Equisetum minus terrestre* IB. 3. 730. floribus apetalis stamineis, Presle ou queue de cheval. Raken-Wadel oder Rannen-Kraut, in denen Gersten und Haber-Feldern. Ic. Tab. hist. 568. perenn.

Equisetum palustr. majus T. Setis longissimis. Ic. Tab. hist. 569. groß Wasser Schacht-Halm, Handwercks-Kraut, in sumpfigen Wassern und

und Gräben , auferhalb der Stadt. *perenn.*

Fumaria bulbosa radice cava major , flore rubro dilutior T. five Fumaria bulbosa radice cava , flore purpurascens IB. 3. 204. polypetalo papilionaceo foliis pallide viridibus, fructu membranaceo unicapsulari Ic. Tab. hist. 38. ♂ in Rivin. Hohlwurzel mit purpur rothen Blumen. Ic. Tabern. hist. 38. in denen Hecken bey Stül / hinter Sultz und auf Bergen hinter Barr. Racine creuse. perenn.

Fumaria bulbosa , radice cava major flore niveo T. Hohlwurzel mit weißen Blumen Ic. IB. 3. 204. perenn. ibid.

Fumaria bulbosa , non cava major T. flore purpureo , quæ Aristolochia vulgaris purpurea. Hort. Eyst. Erdrauch, mit ganzen Wurzeln, in Bergichten Büschen, in dem Wald zu Gamsheim. perenn.

Fumaria bulbosa radice non cava minor T. Fleiner Erdrauch, mit ganzen Wurzeln, in dem Obern-Elsaß, in denen Neben, bey Türckheim. perenn.

Herba Paris. T. & IB. 3. 613. five Solanum quadrifolium bacciferum repens , bucca nigra, flore herbaceo cruciformi , radice tenui multifida, fructu molli globoso. Ein oder Wolfsbeer, Raisin de renard Ic. Tab. hist. 1095. in büschechten Hecken und Wäldern, in dem Busch, bey der Eckbolsheimer Zügel-Hütte. perenn.

Juncus memorosus latifolius major T. foliis fructu unicapsulari hirsutis , five Gramensylvaticum pilosum Tab. hist. 537. Ic. 4. groß Haricht Wald Gras,

Gras, in Wäldern und Büschen auf dem St. Ottilien Berg. *perenn.*

Lichen crustæ modo arboribus adnascens, colore flavescente, seu flavus Ray hist. 116. gelbes Baummoss, in dem Ruprechtsauer Wald, auch an alten Dielen der Garten-Wände.

Lichen crustæ modo arboribus adnascens pullus T. schwarz braun Baummoss in denen Waldungen an jungen Eichbäumen.

Lichen crustæ modo saxis adnascens, verrucosus cinereus T. Warzen förmig steinmoss im Cronenthal zu Wacklenheim.

Moschatellina, foliis fumarisæ bulbosæ T. odoratis, flore monopetalo rotato & multifido herbaceo, radícula oblonga alba fibrosa repente, fructu molli sive Fumaria bulbosa minima Tab. hist. Ic. XI. 94. Petite musquée in feuchten Büschen, in denen Hecken bey Oßwald. *perenn.*

Ornithogalum bifolium germanicum T. seu vernum dumetorum flore cœruleo liliaceo, radice bulbosa subdulci, fructu subrotundo. blaue Hecken Stern-Blümlein, Bauren hyacinthen Ic. Tab. hist. 1015. in dem Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Ornithogalum bifolium germanicum, flore exalbido T. Bauren hyacinthen, mit weissen Blumen, rarius occurrit in denen Feldern bey Arbogast. *perenn.*

Ornithogalum bifolium germanicum flore carneo T. auf denen Wiesen bey dem Mauer-Hof. *perenn.*

Ornithogalum luteum T. seu majus & IB. 2. 623.

grosse Feld = Zwiebel , mit gelben Blumen. Ic. 1. Tab. hist. pag. 1020. Oignon sauvage , auf Aeffern , an der grünen Warth , bey dem Kupfer Hammer , in Herrn Horrs Garten , zu Niederhauffbergen , auf den Aeffern und in den den Neben. perenn.

Ornithogalum bulbosum luteum minus T. five pannonicum, luteo flore Clus. hist. pag. 189. kleine Feld-Zwiebel, mit gelben Blumen, auf denen Feldern unter der Frucht, vor dem weissen Thurn , auf denen Aeffern zu Eingelsheim. perenn.

Ornithogalum angustifolium bulbiferum T. bey Hauffbergen in den Neben häufig , wie auch auf den Aeffern zu Eingelsheim perenn.

Petalites major & vulgaris T. flore flosculo albo , folio subrotundo magno , subtus ineano , radice longa crassa amara. fructu papposo. Pestilenz Wurzel , großer Huflattich Ic. Tab. hist. 1316. Petalite. perenn.

Populus alba , majoribus foliis T. five Populus alba IB. 1. 160. vitigineis foliis, inferne albicantibus ac lanuginosis , floribus amentaceis fructu membranaceo papposo. Aspen oder weiser Pappelbaum Peuplier blane Ic, Tab. hist. 1392. in denen Hecken und Zäunen , an denen, Flüssen in denen Waldungen. perenn.

Populus nigra T. & IB. 1. 155. seu officinarum , foliis hederaceis serratis hyeme deciduis, fructu racemoso Schwarzer Pappelbaum Ic. Tabern. hist. pag. 1392. & Mathiol. Peuplier noir, an

an den Wasser gestaden, bey der Epithal-
Mühl, ingleichen in dem Züfircher und Gansauer
Wald. *perenn.*

Populus tremula T. seu *Lybica* IB. 1. 163.
 ♂ *Matthiol. folio rotundo angulosoque punctatim albis*
notis consperso, tenuique pediculo appenso, continuo sire
sese movente Aspen oder Zitterbaum *1c. Tab. hist.*
 1392. *Niespe ou Tremble* in dem Eßbolsheimer
 und Bruumbter Wald. *perenn.*

Primula veris, odorato flore simplici T.
 ♂ IB. 3. 495. *hypocrateriformi* ♂ *multi fido lu-*
teo, folio rugoso, radice tenui candicante, fructu ob-
longo Wiesen Himmel = Schlüssel, mit wohlrie-
 chenden Blumen. *Primevere* *1c. Tab. hist.* 699.
 auf der Gallen Matt. *perenn.*

Primula veris, pallido flore elatior. T. five
Primula veris cauliflora flore pallido vix odoro IB.
 3. 496. *foliis latioribus* ♂ *in acumine rotundioribus,*
radice crassiore fibrosa, floribus subluteis inodoris.
 Wald Himmel = Schlüssel, mit bleich gelben
 Blumen, ohne Geruch. *Primevere sauvage* IB. 4.
Tab. hist. 700. ♂ *Clus hist.* 301. in dem Eßbols-
 heimer Wald. *perenn.*

Pulmonaria Italarum, ad Buglossum acce-
dens T. ♂ IB. 3595. *flore simplici monopetalo in-*
fundibuliformi ex rubro coeruleo radice fibrosa, est
Pulmonaria maculoso folio *Clus. hist.* CLXVIII. ♂
Tab. hist. pag. 748. Pulmonaire maculé ou marbrée
 Hirschmangold oder Lungen-Kraut mit gefleckten
 Blättern in denen ausgehauenen Hölzern, zu
 Hangenbiethem und Holzheim. *perenn.*

Pul.

Pulmonaria folio non maculoso T. Hirschmangold ohne Flecken *Clus. hist. CLX. Pulmonaire sans marque* zu Truttenhausen häufig. *perenn.*

Pulmonaria angustifolia, flore coeruleo, folio maculoso. T. schinahl blättricht Lungenkraut mit Flecken. *1c. 1. Tab. hist. 948. & Clus hist. CLXIX.* in dunkelen Waldungen bey Hohen Landsperg *perenn.*

Pulmonaria foliis Echii T. *1c. Lobel. 586.* five *Pulmonaria* Plin. *angustifol.* Tab. Lungenkraut mit spizigen Blättern, im Hölzlein zu Holzheim. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici coeruleo T. five *Trifolium hepaticum* flore coeruleo *1B. 2389. radice nigra fibrosa*, officinis *Hepatica nobilis fructu globoso* Edel Leber-Kraut, mit blauen Blumen. *Belle hepatique. 1c. Tab. hist. 911. & Garidel. hist. plantar. 415. perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici violaceo. T. Edel Leber-Kraut, mit violblauen Blumen *ibid. perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici rubro T. Edel Leber-Kraut, mit rothen Blumen auf dem Gebürg hinter Barr. *1c. 2. Tab. hist. 94. perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus flore simplici sub purpureo, petalis cordatis profunde divisis, apicibus albis *Mapp. hist. plant. bleich rothes Leber-Kraut mit weissen Zünglein* auf dem Gebürg hinter hohen Andlau. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus flore simplici

ci albo T. Edel Leber-Kraut, mit weissen Blumen, auf dem alten Berg zu Dorlisheim. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus flore simplici magno albo T. Edel Leber-Kraut, mit grossen weissen Blumen, auf dem Gebürg zu Hochfeld. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici violaceo minore, apicibus albis *Mapp. hist. plant. alsat. 259.* Edel Leber-Kraut mit weissen Zünglein, auf dem Gebürg zu Barr, wird unter den gemeinen Blauen öfters gefunden, non est lusus naturæ in hort. translata, semper eodem caractere viget. *perenn.*

Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici albo, apicibus rubris T. Edel Leber-Kraut mit weissen Blumen und rothen Zünglein *ibid.* *perenn.*

Ranunculus gramineo folio, flore caudato, seminibus in capitulum congestis spicatis T. sive Myufuros 1B. 512. Mäuse Schwanz *queue de souris* 1c. Tab. hist. pag. 552. *perenn.* auf denen Aeftern oberhalb dem Wirths-Häusel, zwischen Lingsheim und Ensisheim, neben denen Wasser Gräblein und weiters hinauf gegen Ensisheim an denen Gräblein der Frucht. *perenn.*

Tussilago vulgaris T. 3 1B. 3. 563. fructu paposo flore luteo radiato 1c. Tab. hist. 1-3 16. Pied de cheval. Roghub, Huflattich, auf feuchten Aeftern bey Illkirch und zu Brischwickersheim *perenn.*

Viola martia purpurea, flore simplici odoro

ro T. fructu trigono. *Viollette de Mars* Ic. 1. Tab. hist. 608. polypetalo flore simplici odore anomalo, radice fibrosa repente Wohlriechende Mergel Violen, in graslichten Orten und an denen Rändern der Zäunen. perenn.

Viola martia alba S. Ic. 2. Tab. hist. 680. Weiße Mergel Violen, in denen Hecken, in dem Zülcher Wald. perenn.

Viola martia sylvestris inodora T. foliis mucronatis oblongis & strictioribus, flore coeruleo. Ic. 5. Tab. hist. pag. 681. Hund's Violen, Wald Violen, mit grossen ablang runden Blättern und blaß blauen Blumen ohne Geruch *Viollette de bois*. auf der Mergelgerau und sonst vielen andern Orten. perenn.

Viscum baccis albis T. flore monopetalo quadripartito viridi, bacca glutinosa foliis, oblongis conjugatis angustis. Vogelberren, aus welchen der Vogelleim præparirt wird, wächst fast an allen Bäumen, oft auch auf den Eichenbäumen. Mispel Tab. hist. plant. pag. 1376.

Ulmus campestris & Theophrasti T. five *Ulmus* IB. 1. 139. folio lato scabro, leviter serrato, atque oblongo, floribus monopetalis campaniformibus Rustbaum, Rusten Orme Ic. Tab. hist. 1394. in Wäldern und auf allen Wällen der Stadt. perenn.

Ulmus folio latissimo scabro T. five *Ulmus altera latifol.* Lob. p. 2. p. 189. Berg Rusten oder Steinlinden mit beyderseits rauhem Laub auf dem Hochfelder Gebürg und Waldungen zu Oberbron, in denen Hecken der Land-Strasse nach dem Mauer-Hof unterhalb. perenn.

Ul.

Ulmus minor folio angusto scabro & Ray. p. 1426. T. Rusten mit einem harten schmahlen Blatt, an denen Aeftern neben dem Zillfluß gegen Ostwald. *perenn.*

Ulmus folio glabro T. & Ray, p. 1426. Weißrusten mit beyderseits glatten Blättern ibidem und in dem Züfircher Wald.

MENSIS.

APRILIS ET MAJUS.

Acer campestre & minus, T. sive *Acer vulgare*, *minori folio* IB. I. 166. *foliis minoribus laevibus laciniatis seu angulosis, floribus rosaceis ex viridi flavescentibus, fructu gemino alato* Ic. 2. Tab. hist. 1386. Maßholder petit Erable in denen Hecken und Büschen aller Orten. *perenn.*

Agaricus lichenis facie variegatus T. qui à loco natali apud nos *Fungus salignus venenosus* audit, Clusio in hist. est III. genus perniciosorum fungorum CCLXXII. Selber Schwamm nostratibus, Weiden Schwamm, an denen alten Weiden Bäumen, in dem Früh-Jahr.

Alfne verna glabra, floribus umbellatis albis T. *rosaceis, fructu unicapsulari, sive caryophyllus arvensis umbelliferus* IB. 3. 361. *Holosteum Caryophyllæum arvense* Ic. 2. Tab. hist. 543. weiße Acker Nägelein, auf denen Aeftern, hin und wieder, bey Schiltigheim, in der Ruprechtsau.

Alfne media T. seu *vulgaris flore albo rosaceo, foliis ex adverso binis, radice alba fibrosa*, gemei-
ner

ner Hünerdarm oder Vogel-Kraut. *1c. 3. Tab. hist. 1087. Morgeline. annua.*

Alfne pratensis gramineo folio ampliore T. flore albo simplici rosaceo five Gramen Fuchs. vel *Leucanthemum 1B. 3. 361.* est Gramen floridum majus *1c. 1. Tab. hist. pag. 542.* Weiß Nägelein Gras, aller Orten in Wäldern, häufig in dem Eckboldsheimer Wald. *ann.*

Alfne pratensis gramineo folio angustiore T. f. Gramen floridum minus. 1c. 2. Tab. hist. 542. Klein Blumen Gras auf der Mehgerau, auf denen Wiesen über der Hohenwart zwischen denen Wassern. *ann.*

Alfne pusilla pulchro flore tenuissimo, nostras, seu Saxifraga caryophylloides pusilla, flore albo pulchello Ray hist. 1033, radice alba repente in grasichten Orten, bey dem Eckboldsheimer Ziegel-Ofen. *ann.*

Alfne spargulæ facie minima, seminibus marginatis T. flore albo gar Fleiner Spurey, auf durren sandigen Fleckern in der Ruprechtsau und zu Hördt. *ann.*

Eadem seminibus nudis T. an kleinen Hügeln bey Gemar, in dem Gras.

Alyssum fruticosum T. five Thlaspi capsulis sublongis, incauum 1B. 2. 919. an sandigen Zäunen zwischen Hagenau und Weissenbarg. *perenn.*

Alyssum Veronicæ folio T. five Bursa pastoris major, loculo oblongo, flosculis albis, cruciformibus, radice tenui alba filamentosa, fructu unicapulari CB. prodr. pag. 50, & Zwinger. Theatr.

Theatr. botan. Täschel-Kraut, mit Ehrenpreis Blättern, auf denen sandigen Feldern zu Bischaweyler, zu Oberbron, an denen Rändern der Reben. *ann.*

Amygdalus fativa T. *fructu majore dulci, foliis persico similibus, flore simplici rosaceo suave rubente* Ic. *Tab. hist.* 1410. süßer Mandelbaum, *Amandier doux*; hin und wieder vor der Stadt, in Gärten und Weinbergen. *perenn.*

Amygdalus dulcis, putamine molliore. T. süßer Mandelbaum, mit Früchten weicher Schalen, Weiß-Mandeln *perenn. in horto medico.*

Amygdalus amara T. Mandelbaum mit bitterer Frucht, *Amandier amere.* *ibid. perenn.*

Amygdalus Indica Nana H. R. P. Ic. *Munting. histor. plant.* 34. Niedriger Mandelbaum *ibid. perenn. in hybernac.*

Asarum vulgare T. & IB. 3. 548. *flore apetalae subrufo, folio subrotundo, pingui, atro, virente, fructu anguloso multicapsulari* Ic. *Tab. hist.* 1129. Haselmurkel, *Nard sauvage*, in schattichten Hölzern, bey Blobsheim und im Schwindelsheimer Wald.

Asarum americanum majus Hort. Reg. Par. seu *Asarum Cornut. Canadense.* 24. *foliis vulgari latioribus & dilute virentibus, radice repente*, Grosse Americanische Haselmurkel, per me satum luxuriose viget auf dem Haulenberg.

Boletus esculentus in metam fastigiatus T. est 1. gener. fungor. escul. spec. IV. *Clus. histor.* CCLXIII. Epik Morcheln, roth gelbe Maulbeer Morchel. B Bole-

Boletus phalloides T. five XXIII. generis perniciosior. fungor. 5. species *Clus. hist. CCLXXXVI.* est Fungus penis imaginem referens, CBP. in feuchten Wäldern, und sumpfigen Wiesen, Nicht Schwamm, auf Matten und Waldungen bey Linßweyler. ann.

Calamintha humilior, folio rotundiore T. flore simplici, purpureo, monopetalo, labiato, officinis *Hedera terrestris* E IB. 3. app. 855. radice repente fibrosa, Gundelreb oder Gundermann Ic. 2. Tab. hist. 1280. E in Rivin. *Lierre terrestre*, allermwegen an denen Hecken und Zäunen. perenn.

Calamintha humilior, folio rotundiore minor & elegantior T. Ic. *Vaillant. Tab. VI. fig. 5.* E 6. kleine Gundelreb. ibid.

Cardamine IV. Dalechamp. Lugd. 659. vel *Nasturtium aquaticum minus* CBP. five *Sisymbrium cardamine hirsutum minus* flore albo IB. 2. 888. *cruciformi fructu siliquoso*, gar fleiner Wasser Kresse, in schattichten feuchten Wäldern.

Caryophyllata vulgaris T. flore parvo, luteo, rosaceo, IB. 2. 398. foliis pinnatis, radice tenui, subrusa, bene spirante, fructu globoso *Benedikten oder Merkwurzel* Ic. 1. Tab. hist. 326. E Lobel. Ic. 693. *Benoitte*, aller Orten in denen Hägen und Zäunen. perenn.

Caryophyllata vulgaris, majore flore T. *Benedikten Wurzel*, mit grossen gelben Blumen, Ic. Fuchs. hist. 385. auf denen Wiesen, bey Andlau häufi. pe renn.

Caryophyllata aquatica, flore nutante T. *rubro*

rubro striato IB. 2. 398. *purpureo pallescente, striato, rosaceo, radice longa & densa, sed minus fibrosa purpurascente amariuscula*, Ic. 2. *Tab. hist.* 326. *Benoite aquatique*, Wasser Benedikten Kraut, mit hangenden Blumen, auf feuchten Wiesen des kleinen Hochfelds gegen Lotharingen *perenn.*

Cerasus major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente T. sive *Cerasus sylvestris fructu nigro* IB. 1. 220. *flore simplici albo rosaceo*, Merisier, schwarze süsse wilde Kirschen, in der Ruprechtsau *unde fructus apud nos audiunt Ruprechtsauer Kirschen*, in dem Zulkircher und Gansbauer Wald. *perenn.*

Cerasus fructu albo dulci T. weisse süsse Kirschen, auf Brach-Äckern bey Zulkirch, auch häufig auf dem Gebürg hinter Barr. *perenn.*

Cerasus fructu parvo rubro amaricante, Mapp. hist. sive *Cerasus sylvestris fructu rubro* IB. 220. wilde rothe Wald-Kirschen, in dem Gansbauer Wald. *perenn.*

Cerasus fructu acido ferotino, succi sanguinei T. Amarellen Baum Ic. 4. *Tab. hist.* 1399. an denen Wegen vor dem Epithal-Thor, und in denen Gärten.

Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli nigrominore, T. sive *Padus* IB. 1. 228. Eisen Beeren Baum, schwarze Bogelfirschbaum. *Bois de Lucie* XI. 11. *Tab. hist. plant.* 1401. *perenn.*

Cerasus pumila fructu rubro minore, sive *Chamaecerasus fructu rubro* *Tab. hist.* Ic. 12.

1401. Kleiner wilder Kirschbaum, Erd Weixelbaum, auf dem Hochfelder Gebürg. *perenn.*

Cerasus sylvestris amara Mahaleb putata *IB.* 1. 227. *Tab. hist.* 1402. Grenouillier Steinfirschen, Dintenbeeren, bey Rheinau an dem Rhein. *perenn.*

Cerasus major fructu magno cordato T. five *Cerasa Pliniana* *Tab. hist.* 1c. 1399. Herkirschen, Bigarotier in Gärten. *perenn.*

Cyperoides nigro luteum vernum majus, T. five *Graminis nigro lutei verni* varietas major *IB.* 2. 494. *floribus apetalis in spicam congestis*, frühblühendes schwarz gelbes cypern Gras, hin und wieder auf feuchten Wiesen. *perenn.*

Cyperoides sylvarum spica varia, Garidel *caule triquetro fructu triangulo* Scheuchzer. *Agrost.* pag. 448. *Tab. X. Fig. 14.* in abgehauenen Hölzern in dem Brumbter Wald. *perenn.*

Cyperoides nigro luteum vernum minus T. früh blühend kleines cypern Gras, mit schwarz gelber Aehre 1c. *IB.* 2. pag. 494. auf dürrer Wiesen, gegen Ostwald. *perenn.*

Cyperoides spicis variis nemorense T. Melcken Gras in Büschen und Wäldern in dem Illkircher Wald 1c. *CB. prodr.* 2. pag. 9. *perenn.*

Cyperoides foliis caryophyllæis, *spicis è rarioribus & tumidioribus vesicis compositis* T. auf tiefen und feuchten Wiesen, in der Nusprechtsau. *perenn.*

Dens leonis folio latiore T. five *Hedypnois*, vel *Dens Leonis* *Fuchs.* *IB.* 2. 1035. *flore luteo*

com-

composito semi flosculofo, vulgo Taraxacum officinarum, Löwen Zahn, Pfaffenröhrlein, Seichblumen, Ic. 1. Tab. hist. pag. 481. Pisenlit, auf allen grasichten Böden und Rändern perenn.

Dens leonis amplissimo folio T. obtuso breiter blättrichter, vornen zu stumpfer Löwen Zahn, ibid. perenn.

Fagus T. Oxya græcorum IB. 1. 117. roth Buchen, floribus amentaceis glomeratim positis Ic. Tab. hist. pag. 1388. in denen Wäldern um die Statt. auf dem Gebürg zu Oberbron. perenn.

Fragaria sterilis T. seu non fragifera, flore simplici albo rosaceo, foliis hirsutis. vel non vesca IB. 2. 395. falsch Erdbeer Kraut Ic. Lob. 395. häufig in dem Eckbolzheimer Wald. perenn.

Fraxinus humilior, five altera Theophrast. minore & tenuiore folio T. IB. 1. 177. Stein oder Bachesche, auf dem Hochgebürg Kappolstein. perenn.

Fraxinus excelsior T. five vulgator IB. 1. 174. floribus subluteo purpureis apetalis, foliis pinnatis ac crenatis, semine acri linguam exprimente, Ic. Tab. hist. 1428. Frêne an der Landstrasse gegen Züllich, in dem Züllicher Wald. perenn.

Fungus pileolo rotundiori Mouceron dictus T. seu esculentus IB. 3. 823. Dorn Schwamm in dem Gankauer und Züllicher Wald.

Fungus orbicularis exalbidus pratensis Haller. quod III. genus clus. hist. Fungor. esculent. CCLXIV. Mayschwamm, Weißling, zu Obwald.

Geranium Cicutæ folio inodorum, T. Stor-
chenschnabel, mit Schierlings Blättern, neben dem
Weg, gegen der Alubruck, und sonst auf Ae-
ckern, in der Ruprechtsau, est Geranium ino-
dorum H. Eyst.

Gramen spicatum, glumis variis, T. five
Gramen versicolor IB. 2. 466. auf denen bergich-
ten trockenen Orten, zu Rappolstein perenn.

Hesperis sepiaria allium redolens T. five Al-
liaria Math. IB. 2. 883. *flore albo simplici cruciformi,*
foliolato serrato radice longiuscula Ic. Tab. hist. pag.
1144. Hecken Knoblauchkraut, an allen Zäu-
nen ann.

Juncus villosus capitulis psyllii T. five Gra-
men cyperinum pilosum Tab. hist. Ic. 2. pag. 532.
est Gramen exile hirsutum cyperoides Lob. IB.
2. 493. haricht cypern Gras hinter Baar auf
dem Gebürg. perenn.

Lamium alba linea notatum T. *flore albo. sim-
plici monopetalo labiato, folio oblongo, radice fibro-
sa* Ic. 1. Tab. hist. pag. 923. ♂ Garidel hist. plant. Tab.
58. todte oder taube Nessel, mit bezeichneten
Blättern, oder weissen Strichen. *Ortie mort, à ra-
ies blanches.* auf dem Spital-Wall, und andern
Orten mehr. perenn.

Lamium alba linea notatum, flore purpureo
simplici, taube Nesseln, mit gestriften weissen Blät-
tern, und rothen Blumen. perenn. *ibid.*

Lamium foliis caulem ambientibus majus
flore rubro, grosse Acker Nessel, mit rothen Blu-
men Ic. Tab. hist. XII. 1090. ♂ in Rivin. non est va-
rietas

rietas mente Mapp. auf allen Fleckern. *ann.*

Lamium folio caulem amplectente minus T. five *Galeopsis iners minor* IB. 3. *app.* 853. *Galeopsis folio caulem ambiente Rivin* Ic. 1. *Fleis-
ne todte Ufernefel, mit rothen Blumen* *ibid.*
ann.

*Utrumque quandoque invenitur floribus albis, sed
varius.*

Lamium folio oblongo, flore rubro T. five *Galeopsis iners* flore purpurascente majore, folio non maculato IB. 3. 321. taube Nefel mit langlichten Blättern und rothen Blumen Ic. 1. *Tab. hist. pag.* 903. aller Orten auf denen Wällen und an denen Bäumen. *perenn.*

Lamium vulgare album T. five *Lamium folio oblongo non maculato non foetido, flore albo*, est *Galeopsis iners floribus albis* IB. 3. 322. *Ortie blanche morte todte weise Nefel, Weiss-
ber Nefel quia floribus uti solent ad compescend. fluo-
rem album* est *Lamium verum* Plin. *ibid.* *perenn.*

Lamium purpureum foetidum folio subrotundo seu Galeopsis Dioscor. T. *Galeopsis* five *Urtica iners folio & flore minore* IB. 3. 321. vel *Galeopsis minor* Rivin. rothe stinckende taube Nefel, mit rundlichten Blättern, an denen Bäumen aller Orten. *ann.*

Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo minus, H.L.B. Ic. in Rivin. auf denen Fleckern bey Schiltigheim und Oßwald. *ann.*

Leucojum luteum vulgare T. *flore simplici cruciformi* five Keiri officinar. *Violette jaune gelbe*

gemeine Nügelblum, Ic. Clus. hist. 299. hin und wieder in Gärten,

Leucojum hesperidis folio T. five Turrita major Plateau, Clus hist. CXXVI. Turritis 2. Clus. & IB. 2. 836. zu Ostwald in den Ostwinckel häufig.

Leucojum vernum perenne album majus T. quod Draba II. Clus. hist. CXXV. five Hesperis alpina, aut muralis minor, repens IB. 2. 880. foliis incis, imis per terram sparsis hirsutis & asperis, è principio radicis angustis, ad extremum autem sensim sensimque latioribus, flosculis cruciformib. pallide cœruleo albicantibus, siliquis longis, radice alba lignosa, est Hesperis saxatilis Tournef. allat. ubi Ic. pag. 130. Kleine weisse Stein-Leucogen, auf dem Berg der heiligen Ottiliæ.

Linaria hederaceo folio glabro T. feu Cymbalaria vulgaris, flosculis purpurascens, monopetalis, labiatis, radice tenui, Ic. Rivin. & IB. 3. 685. Linaire de Muraille, an denen alten Mauern der Stadtgräben. perenn.

Mercurialis testiculata montana T. five Cynocrambe Mas, vel mercurialis, IB. 2. 979. repens floribus apetalis viridibus trilobatis, radice alba Ic. Tab. hist. 942. Mercuriale sauvage de montagne ou Chou de Chien, per me sata copiose provenit auf dem Haulenberg, Bingelkraut Männlein, auf dem Hochgebürg hinter Haslach, gegen Niederb. perenn.

Mercurialis montana spicata T. repens vel Cynocrambe femina florib. amentaceis fructubicapsulari IB. 2. 979.

2. 979. *Œ Tab. hist. pag. 942.* Wald oder Berg-
Bingelfraut Weibl. in dem Barrer Wald-Weg,
bey der ersten Erßgrub. *perenn.*

*Morus fructu nigro T. flore subluteo amenta-
ceo conglomerato Ic. Tab. hist. pag. 1390. Meurier noir*
Maulbeerbaum, mit schwarzer Frucht, auf dem
Schießreiner Wacken.

*Morus fructu albo T. Maulbeerbaum, mit
weiser Frucht. Meurier blanc Ic. Tab. hist. pag. 391.
ibid copiose.*

*Myosotis arvensis subhirsuta, flore majore,
T. five Auricula muris, parvo flore albo IB.
3.360. rosaceo albo, fructu uniloculari, five Holo-
steum Caryophylæum Tab. hist. Ic. 1. pag. 543. &
Vaillant Ic. 4. Tab. XXX. weiß Nägelein Gras,
weise Acker Negelein, Oreil de souris. zu Of-
wald an denen Ackeren, in der Contrescarpe
am Steinstrasser Thor perenn.*

*Myosotis arvensis hirsuta parvo flore T. five
Myosotis arvensis folio subrotundo hirsuto,
flore parvo albo rosaceo, quæ Auricula muris
quorundam flore parvo, vasculo tenui longo IB.
3. 359. & Vaill Ic. 3. Tab. XX. kleine Acker Ne-
gelein, mit ablang runden harichten Blättern, ge-
gen der Hohenwart und Schnackenloch über, am
Weg, wie auch an denen Wegen, in der Ru-
prechtsau. perenn.*

*Myosotis hirsuta altera viscosa T. flosculis al-
bis. rosaceis gleibichter Acker Hüner-Darm Ic. 1. Vail-
lant Tab. XXX. an denen Wegen gegen Eschbols-
heim, und auf Ackern in der Rupprechtsau.*

Myosotis hirsuta minor T. *flore albo.* **Heiner**
harichter Hüner-Darm, *lc. 2. Vaill. Tab. XXX.*
auf durren Wiesen auf der Gansau.

Napus sativa T. *flore simplici luteo cruciformi, ra-*
dice rapacea alba, fructu siliquoso **Saat oder Steck-**
ruben. *lc. Matth. comment. 398. Naveau auf de-*
nen Aeftern ann.

Napus sylvestris T. *flore luteo radice crassa* &
longa, acri amaricante five *Napus seu Bunias syl-*
vestris flore luteo. *Lob. lc. 200. & Matthiol. Epi-*
tom. 220. wilde Steckruben *cujus semina à nostra-*
tibus appellantur. **Rebssaamen, Navet sauvage,** auf
denen Aeftern um die Statt. *ann.*

Nasturtium petræum, foliis burfæ pastoris
T. glabris, flore simplici cruciformi albo, capsulis la-
tis, radice tenui fibrosa, *lc. Tab. hist. 842. five*
Pastoria bursa minima Lobel. Icon. 221. vel
Bursa pastoris parva, folio glabro spisso *lc. IB. 2.*
937. Stein oder Bergkresse, Cresson de Montagne.
zwischen denen Fugen alter Schlösser, häufig auf
dem alten Bergschloß, zu Rappolstein.

Omphalodes pumila verna symphyti fol.
T. flore monopetalo caeruleo, rotato five *Symphyt. pu-*
milum repens, vel Borrago minima herbarior.
IB. 3. 597. in Gärten und auf dem Haulenberg.

Orchis trifolia major T. five *Triorchis tri-*
folia *lc. VII. Tab. hist. 1059. Couillon de Renard, Berg-*
Knaben-Kraut, mit 3. Wurkeln, auf dem Ge-
bürg im Steinthal. *perenn.*

Orobis sylvaticus vernus T. *flore purpureo sim-*
plici papilionaceo, siliquis erectis, foliis latioribus pin-
natis,

natis, radice longa fibrosa fructu tereti siliquoso, frühzeitige Wald-Erbfen, est Orobus Rivin & Clus hist. Ic. 1. pag. CCXXX. sub nomine Orobi Pannon, im Oberneheimer Wald, bey der Gänßburger Melckeren, in dem Barrer Wald. perenn.

Oxys flore albo T. five *Trifolium acidum*, flore alb. IB. 2. 387. flore albo monopetalo campaniformi multifido, radice oblonga fibrosa, fructu oblongo, Sauerflee, mit weissen Blumen, Buchampfer, *Alleluja à fleur blanche* Ic. 1. Tab. hist. 910. in dem Oberehenheimer und Barrer Wald.

Oxys flore purpurascence T. five *Trifolium acidum* flore purpurascence IB. 2, 387. *Alleluja à fleur purpurine*, Sauer Klee, mit röthlichten Blumen. *ibid.*

Persica molli carne & vulgaris viridis & alba T. floribus rosaceis incarnatis, foliis oblongis serratis & amaris, fructu molli, ossiculo faeto gemeiner Pfersich-Baum, *Pecher de montaigne* Ic. 1. Tab. hist. 1408. aller Orten in Gärten, und in denen Weinbergen perenn.

Persica succo quasi sanguineo T. five *Persica rubra extus lanuginosa*. Tab. hist. Ic. 1408. Blut oder roth Pfersichbaum *ibid.* perenn.

Persica dura carne buxea T. gemeiner Feld Pfersichbaum, mit kleiner harten und gelben Frucht. in denen Weinbergen.

Pervinca vulgaris angustifolia, flore coeruleo T. five *Clematis Daphnoidis*, minori flore coeruleo simplici IB. 2. 130. monopetalo infundibuliformi, fructu siliquoso. Sinngrün Todten-Blu

Blumen 1c. Tab. hist. pag. 1270. *Pervenche à fleur bleue*, an dem Hag hinter St. Gallen, bey St. Helena, an denen Zäunen. *perenn.*

Pervinca vulgaris angustifolia flore albo T. & IB. 2. 130. Sinngrün, mit weissen Blumen, *Pervenche à fleur blanche* in dem Foren Wäldlein gegen Ensisheim. *perenn.*

Polygaloides Haller. *humilis, foliis imis subrotundis, superioribus perangustis linea designatis, flore oblongo flavescente papilionaceo, colluteæ simili, macula ochroleuca insignito, siliquis cordatis, bursa pastoriæ æmulis* five *Chamæbuxus flore coluteæ* CB. est *Pseudo chamæbuxus* H. Eyst. vel *Anonymos* Clus hist. 105. Kleiner wilder Buchs, auf dem Hochfelder und Wassenburger Gebürg.

Prunus sylvestris T. & IB. 1. 193. seu *Acacia germanica officinar. flore simplici albo rosaceo odoro, fructu ex cœruleo nigricante*, 1c. Tab. hist. 1405. *Prunier sauvage*. Schlehen Hecken, oder Schlehendorn, fast aller Orten in denen Hecken und Zäunen.

Prunus sylvestris præcox altior. HRPar. *Pruna avenaria* Haber Schlehenbaum 1c. Tab. hist. 1403. bey dem Mauerhof, in denen Hecken Nuprechtsauer Wald, an dem Rhein *perenn.*

Pulsatilla folio crassiore & majore flore T. *purpureo simplici rosaceo; radice oblonga fibrosa subdulci* 1c. 1. Tab. hist. pag. 8. five *Pulsatilla purpurea cœrulea* IB. 3. 409. Coquelourde, à fleur bleue. blaue Kuchen Schelle, nostratibus Osterblum,

blum , auf der Heyde zu Osward häufig. *perenn.*

Pulsatilla flore rubro obtuso, fructu multicapsulari T. sive *Pulsatilla rubra* IB. 3. 410. & *Lob. Ic.* 282. Kuchen Schelle, mit rothen Blumen *Coquelourde, à fleur purpurine.* auf der Gansau, bey dem Frümmerich , auf den Wiesen bey Marlenheim.

Quinquefolium majus repens T. sive *Quinquefolium vulgare rapens* IB. 2. 397. *floribus rosaceis auro æmulis, radice subrufo oblonga repente fructu globoso.* Ic. 4. *Tab. hist. pag.* 351. *Quintefeuille.* gemein 5. Finger Kraut, auf der Meksgerau, in der Ruprechtsau, an denen Wegen, und anderen sonnenreichen Orten und Reinen der Weinberge. *perenn.*

Quinquefolium majus album alterum T. sive *1. majus albo flore clus. hist. CV.* weiß wild 5. Finger Kraut, est *Pentaphyllum flore albo* IB. 2. 598. & *H. Eyst.* auf dem Wassenburger Gebürg, bey Oberbronn, auf Bergmatten bey Lichtenberg *perenn.*

Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum T. *flavo colore 1. species Clus hist. CVI.* feu *Pentaphyllum minus, molli lanugine pubescens, flore luteo* IE. 2. 598. auf dem Gebürg, hinter Kappolsweiler *perenn.*

Quinquefolium minus repens luteum T. est *Quinquefolium minus* *Tab. hist. Ic. XIII. pag.* 354. feu *Pentaphyllum parvum hirsutum* IB. 2. 398. Klein harricht 5. Finger Kraut, hin und wieder an denen Strassen und Hügeln *perenn.*

Ranun-

Ranunculus phragmites albus vernus T. *flore simplici rosaceo, radice ruffa repente, wilder weißer Wald oder Hecken Hahnen-Fuß, Ic. Tab. hist. 8. pag. 109. Grenouillete blanc, de bois in dem Eßbolsheimer Wald.*

Ranunculus phragmites purpureus vernus T. *rother Wald oder Hecken Hahnen Fuß, Renoncule de bois à fleur purpurine, zu Oßwald im Ostwinckel. Ic. Tab. hist. IX. pag. 109. perenn.*

Ranunculus phragmites luteus, *flore minore modo simplici, modo gemello. gelber Wald Hahnen Fuß, Renoncule de bois, à fleur jaune. bey Oßwald sehr häufig, und auf dem Gebürg St. Ottiliæ. perenn.*

Ranunculus nemorosus folio rotundo T. *fructu globoso vel Sylvaticus, foliis inferioribus rotundis, superioribus floribus proximis valde angustis, laciniis dissectis luteis. est Ranunculus rotundifolius vernus sylvaticus IB. 3. app. 857. Sueser Wald Hahnen-Fuß, Renoncule de bois à feuilles rondes Ic. II. Tab. hist. pag. 117. perenn.*

Ranunculus arvensis, foliis chamæmeli, *flore phœniceo T. fructu globoso seu Flos Adonis Matthiol. Eptim. 647. 3 Tab. hist. Ic. I. pag. 72. hoch rothe Feld- oder Acker-Köflein, in denen Feldern unter der Frucht ann.*

Ranunculus arvensis, foliis chamæmeli *flore citrino T. qui Adonis flore luteo Tab. hist. Ic. 2. 72. gelbe Feld-Köflein, in denen Frucht Feldern bey Niederhauffbergen, wie auch zwischen Lingolsz und Ensisheim. ann.*

Ranun-

Ranunculus pratensis erectus acris T. *non repens, flore luteo simplici* IB. 3. 416. *folio napello simili, radice alba fibrosa* Ic. II. Tab. hist. pag. 107. est Ranunculus pratensis surrectis cauliculis Lob. Ic. 665. *Renoncule piquant des prez. brennender Wiesen Hahnen Fuß. perenn.*

Ranunculus pratensis acris erectus & maculatus, T. radice alba non repente brennender Hahnen-Fuß mit gefleckten Blättern. prioris est varietas. *perenn.*

Salix latifolia rotunda T. five Salix. caprea rotundifolia Tab. hist. Ic. III. 1452. *foliis inferne hirsutis* IB. 1. 215. *floribus luteis amentaceis suaveolentibus* Palm oder weiß Weiden. Marceau. in denen Hecken gegen Ostwald, neben dem Canal am Eckbolsheimer wald. *perenn.*

Salix vulgaris alba arborescens T. five Salix maxima fragilis hirsuta IB. 1. 212. *floribus luteis spicatis in pappum abeuntibus, foliis superne virentibus, inferne candicantibus utrinque hirsutis, vix serratis, cortice cinereo.* Saule. est Salix Dioscorid Lob. Ic. 136. Pfahl oder weisse Baum Weide, an denen Wassern und an denen feuchten Orten. *perenn.*

Salix vulgaris nigricans folio non ferrato T. feu Phoenicea Lugd. 277. *quæ rubra & minus fragilis, folio longo angusto, subtus nonnihil candicante* IB. 1. 215. rothe Baum, oder Seilweide, Korbmacher Weide Ic. IB. 1. 215. & Lugd. 277. *perenn.* an dem Canal an der Breusch, und anderen Orten mehr.

Salix vulgaris rubens T, *foliis longis & angustis*

stis quæ *Salix Amerina* Lugd. 714. rothe Kiefer oder Baumweide, oberhalb der grünen Warth, am meisten in denen Baumgärten Ozier. *perenn.*

Salix aurita & *non aurita*, folio amygdalino utrinque virente T. quæ *latifolia sylvestris* Ic. 1. Tab. hist. 1452. & *fragilis*, mürbe Bruchweide, Roßweide, fast an allen Wasserbächen *perenn.*

Salix oblongo incano acuto folio T. *foliis angustis* & *longissimis crispis*, *subtus albicantibus* IB. 1. 212. Spißweide, mit langen krausen Blättern, an dem Canal, copiose, an der Ill, gegen den Wasser über. *perenn.*

Salix humilis capitulo squamoso T. quæ *fragilis*, folio minore angusto, utrinque glabro sub cæruleo, est *Salix tenuior*, folio minore I. B. 1. 213. seu *Salix helice* Theophrasti Lugd. 277. kleine Sumpf-oder Rhein-Weide, an dem Rhein, vor dem Spithal-Thor, unten in der Tiefe *perenn.*

Salix latifolia repens T. Erd oder Kriechende Weide Ic. V. Tab. hist. p. 1453. in tiefen Gruben, neben dem Canal. *perenn.*

Salix fragilis T. seu *spontanea*, *Julis brevibus*, folio angusto, prona parte incano, superius atrovirente, cortice albo. Bruch oder Glasweide, in sumpfichten Orten, und oberhalb der grünen Warth. *Perenn.*

Salix pumila, foliis utrinque canticantibus & lanuginosis T. kleine weiß oder Bruchweide, aller Orten auf feuchten Wiesen bey Osward, in der Ruprechtsau in den XV. Wört. *perenn.*

Salix

Salix folio ex rotunditate acuminato T. five Aquatica seu Caprea latifolia Tab. hist. pag. 1452. Kägelweide, Holweide, mit rundlechten und etwas zugespizten Blättern; in feuchten Gräben, an dem Illflus, gegen Arbogast, ist die erste die ausbricht, wovon die jungen Knaben die Frühlings-Pfeiffen zubereiten. perenn.

Salix sativa lutea, folio crenato T. flore amentaceo, seu Vimeia angustifolia sylvestris, cortice luteo, est Salix vulgatissima. gelbe Band-Weide Ic. 2. Tab. hist. 1452. an dem Escholsheimer Canal, und auf allen Band-Plätzen. perenn.

Salix folio longo, angustissimoque, utrinque albido T. five Elæagnus Dalechamp. Lugd. 278. Weide, mit den schmähesten und längsten beyderseits weissen Blättern, in der Wangenau auf denen Rheinwörten.

Sambucus racemosa rubra T. seu acinis rubris IB. 1551. fructu globoso floribus ex albido flavescent. monopetal. rotatis multifidis five Montana racemosa Lob. hist. 163. ♂ Tab. hist. Ic. 3. 1440. Sureau de Cerf. Wilder edler Hirschholder, auf denen Bergen, in feuchten dunkelen Orten, auf dem St. Ottilien Gebürg. perenn.

Saxifraga alba rotundifol. T. five Saxifraga alba radice granulosa IB. 3. 706. flore albo rosaceo foliis parvis subrotundis pinguibus, radice granulosa fructu subrotundo bicausulari Ic. 1. Tab. hist. 1222. Saxifrage, weisser Steinbrech, auf der Wiese, bey dem Escholsheimer Ziegelofen. perenn.

Saxifraga verna annua humilior T. five Tri-
C
dactylites

lites tectorum, flore albo IB. 3. 762. *simpli-*
ci rosaceo, folio rutaceo, radice fibrosa. Frosche Da-
hen, Händlein Kraut, Kleiner weiser Steinbrech
Ic. 2. Tab. hist. 1088. auf allen unsauber gehaltenen
Zächern, auf alten Mauern. ann.

Sinapi album, siliqua hirsuta; semine albo &
rufo, flore cruciformi fructu siliquoso T. Ic. IB. 2
856. *Moutarde* gelber Senf, Garten Senf, auf
den Dörfern, hin und wieder auf den Aeckern,
mit weissen Körnern. ann.

Sinapi rapifolio T. quod *Sativum seu vulgare,*
siliqua latiuscula glabra, semine ruffo. IB. 2. 855. ge-
meiner wilder brauner Senf, mit braunen Kör-
nern, neben denen Aeckern, hinter Gunders Ho-
fen. ann.

Sorbus fativa T. *flore rosaceo albo racemoso, fru-*
ctu carnosio oblongo, Eschen Kößlein Baum Ic. 1.
Tab. hist. 1426. *Sorbier,* in dem Gebürg und Wal-
dungen zu Osthofen, wie auch zu Niederbronn. perenn.

Taxus T. & IB. 1. 241. *floribus amentaceis*
luteis, foliis abieti similibus pinnatis, fructu rubro
glutinoso, molli pulposo Ic. Matth. 414. & Epitome
540. *Jvenbaum, Taxbaum,* If. in dem Niede-
cker-Thal am Bach, und sonst in hohen schat-
tichten Waldungen: perenn.

Thlaspi arvense perfoliatum majus T. five
Bursa pastoria, foliis perfoliatæ IB. 2. 938. *flo-*
sculis albis cruciformibus est *Thlaspi oleraceum* Tab.
hist. Ic. 9. 851. *Bauren Senf,* mit durch Wachs-
Blättern, auf steinichten Aeckern und in Wein-
bergen. ann.

Thlaspi

Thlaspi perfoliatum minus T. Kleiner Bauren
Gens, mit durchwachs Blättern *lc. 19. Tab. hist.*
854. est *Thlaspi III. pumilum*, *Clus. hist.*
CXXXI. ann.

Thymelæa alpina linifolio humilior, flore
monopetalo purpureo *infundibuliformi* odora-
tissimo T. *fructu ovato*, sehr wohl riechender Keller-
hals, auf dem Hochgebürg Hochfelden. *lc. Mat-
thiol. sub nomine Cneorum, pag. 42. perenn.*

Thymelæa laurifolio deciduo, sive Lau-
reola fæmina, *fructu ovato* T. sive *Mezereum*
Germanicum IB. 1. 566. Seidelbast, Kellerhals,
auf der Gansau, und in dessen Wald, wie auch
im Wald zu Illkirch *Mezereon. perenn.*

Thymelæa laurifolio semper virens, seu Lau-
reola major T. sive *Laureola semper virens*
flore luteolo *IB. 1. 564. Laureole ♂ Tab. hist.*
1488. Seidelbast oder Kellerhals, mit immer zu
grünenden Blättern, in dem Gansauer Wald.
sed rarissime.

Tithymalus cyparissias T. sive *Tithymalus*
cupressinus sive *humipinus Lob. lc. 356, est E-*
sula officinarum, flosculis luteis monopetalis campa-
niformih. globosis divisih, radice longa fibrosa, fructu
multicapsulari Wolfs oder Teuffels-Milch, *lc.*
Tab. hist. 990. quæ Esula Rivini, Titimale, auf un-
gebauten Oertern, auf der Mezgerau und in der
Ruprechtsau perenn.

Tithymalus cyparissias capitulo rubente T.
lc. 12. Tab. hist. 990. Wolfs-Milch, mit rothen
Käplein, auf dem Gebürg bey Ottrot. perenn.

Tithymalus cyparissias foliis punctis croceis notatus CBp. seu *Esula degener Rivin* Wolfs-Milch mit punctirten Blättern, zwischen denen andern Gattungen. *perenn.*

Turritis vulgaris ramosa T. *florib. cruciformibus, fructu siliquoso bicausulari* sive *Bursa pastoria* seu *Pilosella siliquosa* IB. 2. 870. Wilder Stein oder Bergkresse vid. Tab nostr. I. *perenn.*

Turritis hirsuta montana flore albo Rupp! Flor. Ienens. 62. quæ *Erysimo* similis *hirsuta alba* CB. Prodr. ubi Icon pag. 942, Kleiner Bergkresse, auf steinichten Feldern / unten an dem Hochgebürg Hochfelden.

Turritis, foliis inferioribus cichoraceis, cœteris perfoliatæ T. *floribus ex albo pallescentibus cruciformibus, fructu siliquoso*, seu *Sinapi album* Lugd. 1168. Thurnsens oder Köhl, in dem Ostwinckel, an denen Hecken häufig. *perenn.*

Valeriana palustris major T. *foliis latioribus laciniatis, floribus monopetalis, infundibuli formibus albicantibus divisis, radice crassa subflava, odoris gravis, fructu oblongo.* groser wilder Wasser-Baldrian oder Rakenwurk *Valeriane sauvage* Ic. in Rivin. in feuchten Orten, auf der Gallenmatt, in allen Gräben ausserhalb der Statt. *perenn.*

Valeriana sylvestris major T. *sive magna aquatica* IB. 3. par 2. 210. groser wilder Baldrian, gemeine Raken-Wurk, in der Ruprechtsau, und beim Mauerhof. *perenn.*

Valeriana palustris minor T. seu *Minor pratensis*

Turritis vulgaris

ramosa . J.



J. Striedbeck sculp

tenfis vel aquatica 1B. 3. part. 2. 211. Fleiner Sumpf-Baldrian, in der Ruprechtsau, häufig an denen Wassergräben / wie auch in sumpfigen Wiesen, bey Ofwald. 1c. Tab. hist. IV. p. 455.

Valeriana hortensis, Phu folio Olu satri Dioscorid. T. five *Valeriana major odorata radice*, 1B. 3. part. 2. 209. Grande valeriane Baldrian, zwischen Motterhausen, in dem Bitscher Gewäld, in dem Stättl. Reichshofen. perenn.

Valeriana sylvestris major altera, folio lucido HRP. *radice fibrosa*, Baldrian mit glänzenden Blättern, auf dem Gartners Feld, hinter der Spithal-Mühl, gegen dem Ziegel-Ofen. perenn.

Valeriana sylvestris minor T. *radice tenui fibrosa repente* 1c. 4. Tab. hist. 455. & in Rivin, Fleiner Sumpf oder Wiesen-Baldrian, an denen Wasser-Gräben, in der Ruprechtsau, zu Ofwald, auf feuchten Matten. perenn.

Valeriana aquatica minor, flore minore, Ray hist. pag. 389. Fleiner Sumpf-Baldrian, mit kleinen Blümlein 1c. in Rivin auf feuchten Wiesen bey dem Mauerhof. perenn.

Valerianella arvensis præcox humilis, semine compresso T. *flore simplici albo monopetalo infundibuliformi, folio integro, fructu monospermo*, quæ Locusta herba 1B. 3. 323. & Rivin. seu *Lactuca agnina* Tab. hist. Mache Lämmer-Lattich. oder Acker Salat, Nebfresse, aller Orten, auf denen Acker unter der Frucht. ann.

Valerianella arvensis præcox humilis, foliis ferratis T. five Locusta altera, foliis ferratis

IB. 324. Lämmer-Lattich mit geferbten Blättern prioris est varietas.

Valerianella femine umbilicato nudo oblongo Moris. Umb. *Mache à graine nue* Ic. *Gari-del Tab.* 98. auf Wiesen in der Ruprechtsau. ann.

Valerianella arvensis serotina altior, femine turgidiori T. späther Lämmer-Lattich Moris Umb. auf brachliegenden Feldern, in der Ruprechtsau.

Viola arvensis bicolor T. flore candido & luteo, simplici polypetalo anomalo, papilionacei floris æmulo, fructu trigono Ic. 3. Tab. hist. 690. & in Rivin Acker Freysam-Kraut, mit weiß und gelben Blumen, in denen Frucht-Feldern, die brach liegen, aller Orten. ann.

Viola arvensis flore coeruleo & luteo T. Acker Freysam-Kraut, mit blau und gelben Blumen. *ibid.* ann.

Viola arvensis flore coeruleo & candido T. Acker Freysam-Kraut, mit blau und weißen Blumen. *ibid.* ann.

MENSIS

MAJUS ET JUNIUS.

Abies taxifolio, fructu sursum spectante T. sive Abies femina IB. I. 235. foliis pectinatim dispositis, utrinque virentibus, floribus amentaceis, quæ Mas fructu squamoso, Ic. Clus. hist. 34. Thannen-Baum, weiß Thannen-Mastbaum Holz, Sapin, in hohen Waldungen, auf dem St. Ottilien Gebürg.

Abies

Abies tenuiore folio, fructu deorsum spectante, inflexo oblongo, est Picea major rubra, seu Abies mas Theophrast. IB. 1. 238. roth Thanne, Ficht Thannenbaum, la Pece Ic. Tab. hist. 1347. Garidel Tab. 1. pag. 54. im Brumbter und Oberehenheimer Wald. perenn.

Acer major, folio rotundiore minus laciniato, an Opulus Italorum Ray hist. 1701. floroso-rosaceo, fructu foliaceo, Ahorn-Baum, auf dem Gebürg St. Ottilien und gegen Hochfeld. perenn.

Acer platanoides Munting. hist. pag. 57. foliis atrovirentibus acutis, seu aceris majoris varietas IB. 1. 168. Grand Erable, à feuilles de Plane, flosculis amentaceis, semine triangulari, ibid. in gleichen auf dem Halgenstein, etliche Stund von Blinschweyler perenn.

Acetosa arvensis lanceolata T. five Oxalis parva auriculata repens, IB. 2. 992. foliis pinguisculis hamatis laevibus, flosculis apetalis rubentibus, quæ Lanceolata minor est Munting. hist. 273. seu Oxalis ovina Tab. hist. 827. wilder Kleiner Sauerampfer, mit langen förmigen Blättern, Schafampfer, auf durren sandigen Erdrich, häufig am Canal, bey der Eckbolsheimer Brucken. perenn.

Acetosa lanceolata angustifolia repens T. quæ minima Munting. pag. 278. ♂ Tab. hist. 827, fig. 6. Kleiner Ampfer, mit schmahlen langen förmigen Blättlein, auf durren trockenen Orten zu Ringelsheim, und auf der Gansau. perenn.

Acetosa arvensis minima, non lanceolata

quæ *Oxalis minima* II. Tab. hist. pag. gar fleiner
Feldampfer.

Acetosa pratensis T. IB. 2. 989. seu *Oxalis*
vulgaris, folio longo, fructu capsulari triquetro, radi-
ce fibrosa subrubra, gemeiner Wiesenampfer, mit
langen Blättern, Ic. I. Tab. hist. pag. 826. auf al-
len Wiesen. *perenn.*

Eadem foliis crispis.

Acorus verus, seu *Calamus aromaticus vul-*
garis, five Acorum IB. 2. 734. *flosculis luteis cru-*
ciformibus, radice geniculata acris, atque amaricante,
foris ex flavo rufescente, intus alba fungosa, foliis
gramineis rigidis Tab. hist. 1031. Callmus oder
Uckermuck, bey dem Wickhäusel, copiose auf
dem Backen, zu Züllich in denen Höfen, in
Mistpfützen, auf der Hohenwart hinten im Gar-
ten *perenn.*

Alchimilla linariæ folio, calice florum albo
T. seu Linariæ similis IB. 3. 461. *flosculis sublu-*
teis apetalis, stamineis fructu pentagono, radice candi-
cante vel Anonymos linifolio Clus hist. 324. 3 Tab.
hist. pag. 1209. est *Linosyris* Rivin. falsch Leintraut,
auf durren grasichten Orten, zu Ostwald auf
der Heyde. *perenn.*

Alchimilla montana minima Col. I. 146.
five *Perchepier* Anglorum quibusdam IB. 3.
part. 2. 74 *foliis inferne albicantibus, flosculis stanni-*
neis herbidis, est Scandix minor Tab. hist. Ic. 2. 288.
Flein Berg oder Ucker Sinau, aller Orten auf
denen Frucht-Feldern zu Ostwald. *ann.*

Alchimilla erecta gramineo folio, flore mi-
nore

Alsine Saxatilis



J. Striedbeck sculp.

nore T. *viridi*, five Polygonum minus alterum Tab. hist. 1217. kleiner Wegtritt, mit Graßblättern, auf denen Aeftern zu Ohwald, auf der Nachtweyde, auf denen Aeftern, vor dem Cronenburger Thor. ann.

Allium sativum alterum five Allioprasum caulibus summo circumvoluto Walth. est Scolodoprasum II. Clus. hist. 191. Schlangen-Knoblauch, Gallis *R. cambole*, in Gärten und auf denen Gärtners Feldern. perenn.

Allium sativum T. vulgare IB. 2. 566. Knoblauch, gemeiner Knoblauch, in Gärten und Gärtners Feldern. perenn.

Allium sylvestre latifolium T. *fructu subrotundo tricapsulari, foliis binis latis splendentibus, flore albo liliaceo umbellato, radice alba fibrosa*, five Allium Ursinum bifolium verum, sylvaticum IB. 2. 565. Ic. Tab. hist. pag. 875. wilder oder Hecken Knoblauch, *Ail sauvage*. in der Ruprechtsau, zwischen denen Hecken, im Züllicher Wald. perenn.

Alfinastrum serpillifolium, flore albo tripetalo, *serpens*, Vaillant Ic. 2. Tab. 2. in sumpfsüchten Orten auf der Insel am Canal. ann.

Alfine saxatilis *foliis longissimis ac tenuissimis, flore candido majori cruciformi*, nob. zwischen denen Steinen zu Naßweiler auf dem Gebürg vid. Tab. nostr. II.

Alfine tenuifolia T. & IB. 3. 364. *pediculis florum longissimis* Vaill. five Chamælinum Clus hist. 319. *floribus albis rosaceis, foliis tenuissimis, per genicula binis* Ic. Vaill. Tab. III. fig. 1. auf der alten Stattemauer

mauer, zwischen dem Steinstrasser und Cronen,
burger-Thor. *ann.*

*Alfine spergulæ facie minima, seminibus
marginatis T. auf durren Fleckern in der Ru-
prechtsau. ann.*

*Alyssum segetum foliis auriculatis T. capsu-
lis minoribus sive Myagrum sativum, floribus cru-
ciformibus pallide virentibus, ♂ foliis minus cinereis
est Chamælinum Tab. hist. I. 1252. Wilder Lein-
doster auf denen Fleckern ann.*

*Alyssum incanum luteum serpillifolio majus
T. sive Thlaspi incanum campestre majus, folio po-
lygoni, flosculis luteis cruciformibus, siciliculis tenui ra-
dice alba Ic. Tab. hist. 4. pag. 850. groß Schild-
besen Kraut, mit runden Blättern, auf dem
Weg, an denen Mändern gegen Blobsheim. ann.*

*Alyssum perenne incanum montanum T.
seu Thlaspi montanum luteum IB. 2. 928. est
Thlaspi supinum luteum Lob. Ic. 220. unter
den zerfallenen Felsen Stücken, gegen Niedeck
in dem Hochgebürg perenn.*

*Alyssum incanum luteum minus serpillifo-
lio T. seu minimum, Clus hist. CXXXIII.
quod Thlaspi chypeatum minus Tabern. hist. Ic. 18.
853. Klein Schild besen Kraut, zwischen dem
Wickhäusel, und der Hohenwart, an dem Weg.
ann.*

*Anagallis phœniceo flore fructu globoso sive
Anagallis phœnicea Mas, IB. 3. 369. rother Gauchheil,
Heil aller Welt Ic. Tab. hist. I. 1092. à nostratibus
dicitur Wutkraut, quia morsibus venenatorum anima-*

um adversa, Mouron male, à fleur rouge, auf brach-
liegenden Aekern und in Gärten. ann.

Anagallis flore coeruleo T. five Anagallis coe-
rulea fæmina IB. 3. 369. simplici monopetalo multi-
fido, foliis ex adverso binis vel ternis, nascentibus, Ic.
2. Tab. hist. 1092. blauer Gauchheil, Mouron femelle
ibid.

Anagallis paludosa minima, foliis rotundis
alternatis flosculis albis monopetalis cruciformibus
Vaill. Tab. IV. fig. 2. neben denen Wasser- Grus-
ben zu Wörtheim und Lauterburg perenn.

Anemone sylvestris alba major T. flore albo
simplici, radice fibrosa, fructu oblongo lanuginoso weise
Wald Anemonien Ic. 1. Tab. hist. 73. & H.
Eyft. fol. 13. fig. 3. Clus hist. 244. zu Obwald
häufig. perenn.

Anethum hortense T. foliis fœniculaceis, floribus
luteis rosaceis umbellatis suaveolentibus, radice alba fibro-
sa, semine plano ovato. Dilleu, Till, Ic. Tab. hist.
165. Anet. in Gärten und Gärtners Feldern.
ann.

Antirrhinum arvense majus T. foliis angustio-
ribus, flosculis monopetalis anomalis tubulatis, ob-
solete purpureis, radice fibrosa five Antirrhinum
angustifolium sylvestre IB. 4464. Dorant, wild
Löwenmaul, mit rothen Blumen Musle de veau
Ic. 4. Tab. hist. 1236. ♂ Garidel Tab. 7. ♂ Rivin. ann.

Antirrhinum arvense majus flore albo HRP.
fructu biloculari. Dorant, mit weissen Blumen, un-
ter der Frucht in der Ruprechtsau, sed rarissime
Aparine vulgaris T. flosculis albis campani formib.
fructu

fructu testiculato, groß Klebkraut *Grateron* Ic. Vaill. Tab. 4. fig. 4. fast an allen Hecken und Zäunen ann.

Aparine semine lævi HPar. *foliis brevissimis*, *flore albo campaniformi quadrifido*, *caule quadrato* Ic. Vaill. Tab. IV. fig. 3. in denen Frucht-Neckern, besonders zu Ehrstein ann.

Aparine latifolia humilior montana T. sive *Matrifylva officinar.* *floscul. albis campaniformibus odoratis*, *foliis stellatis* est *Hepatica stellata* IB. 3. 718. Waldmeister, Sternleber-Kraut, Ic. Tab. hist. 9. 201. in dem Holzheimer Wald, Muguet. perenn.

Aparine supina pumila flore coeruleo T. in *fundibuli formi*, *semine aculeato*, sive *Rubia parvo flore coeruleo se spargens* IB. 3. 719. Klein blaues Stern-Kraut, hin und wieder auf denen Neckern.

Aquifolium T. ♂ IB. I. 114. sive *Ilex aculeata baccifera*, *folio sinuato spinoso*, *flore monopetalo albo rotato*, *fructu ossiculo faeto* Stechpalmen *Houx*. Ic. Tab. hist. 1. 352. auf den Ottilen Berg, in dem Wald zu Niederhenheim, in dem Hagenauer Forst. perenn.

Aquifolium non spinosum Munting *Phytogr.* fig. 39. *foliis laurinis* Palmen ohne Dornen, in hohen Andlau, nahe an dem Schloß perenn.

Aquilegia sylvestris T. *flore simplici* IB. 35. 484. *coeruleo polypetalo pendulo*, *foliis lobatis*, *semine ovato* milde blaue Agley, Ancolie sauvage Ic. I. Tab. hist. 97. in dem Gansbauer Wald und in dem Zulfircher Wört. perenn.

Aquile-

Aquilegia hortensis, flore simplici, quam pleno, varii coloris. auf dem Haulen Berg, per me assurgentes.

Arum vulgare non maculatum T. flore monopetalo cucullato, fructu cinnabarino acri, radice alba fibrosa acri, fructu globoso. gemeiner Aron oder Zehrwurzel, ohne Flecken. 16. Tab. hist. 1. 123. In Rivin. Pied de Veau, sans marque, in denen Hecken gegen Illkirch. Oßwald und in der Ruprechtsau.

Arum maculatum folio subrotundo, maculis nigris HRP. Zehrwurzel oder Aron Wurzel, mit schwarzen Flecken, an denen Hecken und Zäunen, gegen dem Mauerhof, und in dem Ostwinckel. perenn.

Arum maculatum maculis nigris T. gefleckte Zehrwurzel, mit schwarzen tupfichten und zugespitzten Blättern *ibid.* Pied de Veau marque perenn.

Arum palustre radice arundinacea, foliis cordiformibus, sive *Dracunculus aquatilis* IB. 2. 789. est *Dracontium palustre* Tab. hist. rectius *Arisarum* Lobel, Wasser Aron, bey Still, neben einem grossen Weyer, auf einer sumpfigen Wiese perenn.

Asclepias flore albo T. sive *Hirundinaria* seu *Vincetoxicum* officinar. flosculis albis monopetalis campaniformibus, radice alba fibrosa, Domppe Venin 16. Tab. hist. 1. 105. in allen Hölzern um der Statt, auf der Hart, gegen Molsheim. perenn.

Bellis sylvestris media caule carens sive *Bellis media*, Clus hist. XLIV. est *Bellis sylvatica* IB. 3. 214. Pacquerette de montaigne wilde Wald Maßliebend

lieben, mit kleinen Blättern, in dem Gebürg und Wiesen hinter Baar. *perenn.*

Berberis dumetorum T. five *Berberis vulgo* quæ & *Oxyacantha* putata *IB.* 1. 52. *flore simplici rosaceo luteo, fructu molli cylindraceo*, saur Dorn oder Saurach, aller Orten in der Ruprechtsau, in denen Zäunen, in dem Eckbolsheimer und andern Waldungen *Epine Vinette* 16. *Tab. hist. pag. 1448.* *perenn.*

Betula T. ♂ *IB.* 1. 148. *flore amentaceo sublu- teo, folio subrotundo late virenti, per ambitum serrato, fructu cylindraceo squamoso* Bircken = Baum 1c. *Tab. hist. 1. 398.* *Bouleau* in allen Wäldern, copiose auf dem Jesuiter Hof. *perenn.*

Boletus esculentus rugosus albicans, quasi fuligine infestus T. feu 1c. 1. fungor. spec. *Clus hist. CCLXIII.* Morille, Morcheln, hin und wieder in feuchten Waldungen. *ann.*

Boletus esculentus rugosus fulvus T. 2da spec. 1. gener. escul. fungor. *Clus hist. CLXIII.* roth gelbe Maulbeer-Morcheln *ibid. ann.*

Brassica alba crispa T. *fructu siliquoso, folio ru- goso patulo, flore simplici luteo cruciformi*, five *Brassica Sabauda*, *IB.* 2. 828. Krauser oder Welscher Kohl, *Chou frisée* 1c. 6. *Tab. hist. pag. 784.* auf denen Gartners Feldern *ann. ibid.*

Brassica arvensis T. five *Brassica rubra mi- nor* *IB.* 2. 833. aut *Brassica Sylvestris Crambe di- sta*, Schnitt-Kohl 1c. 15. *Tab. hist. 787. ibid. ann.*

Brassica capitata alba T. weiß Kraut / gemein Kraut, Kraut zum einmachen, so man nachge- hendes

hends Sauerkraut nennet Chou Ic. 4. Tab. hist. 784. *ibid.* ann.

Brassica capitata rubra T. & IB. 2. 831. *foliis arcte convolutis & occlusis rubris*, roth Köpfel oder Salat-Kraut, Chou rouge Ic. 5. Tab. hist. 784. *ibid.* ann.

Brassica cauliflora T. seu *multiflora* IB. 2. 832. Blumen Kohl, Chou Fleur. *ibid.* Ic. Tab. hist. 9. *ibid.* ann.

Brassica fimbriata T. sive *crispa laciniosa* IB. 2. 832. vel *tophosa* Ic. 12. Tab. hist. 786. Wirsching oder Winter-Kohl, Chou frisé, à feuilles fendues. perenn.

Brassica gongylodes T. caule rapum gerens rotundum, vel *Brassica caulorapa* IB. 2. 829. Kohl-Ruben oder runder Ruben-Kohl Chou rave Ic. 1. Tab. 789. ann.

Brassica gongylodes rapo longiore Langer Ruben-Kohl. Ic. 2. Tab. hist. 789. ann.

Brassica rubra, folio crispo laciniato IB. 2. 832. Frauser Kohl Chou rouge frisée perenn. ann.

Brassica alba seu *viridis* T. vel *vulgaris* IB. 2. 829. gemeiner oder Ruchen-Kohl, Ic. 1. Tab. hist. 783. Chou blond ou verd. ann.

Brassica alpina perennis T. perfoliata, Berg-Kohl, auf dem Gebürg und Waldung gegen Niedeck, ingleichen oberhalb Haslach.

Bryonia aspera, sive *alba*, baccis rubris T. *globosis* sive *Vitis alba* IB. 2. 143. *foliis asperis floribus monopetalis campaniformibus albis*, radice alba rapacea amara. Zaun oder Scheiß-Ruben, mit rothen Beeren, aller Orten in denen Zäunen und Hecken
Bryone

Bryone ou Couleuvre Ic. Tab. hist. 1292. perenn.

Bugula T. five *Consolida pratensis media*, IB. 3. 430. flore monopetalo coeruleo unilabiato, semine subrotundo, gulden Günsel Bugle Ic. 1. Tab. hist. 945. & in Rivin. perenn. auf denen Wiesen.

Bugula five *Consolida media pratensis*, flore purpureo T. gulden Günsel, mit rothen Blumen, am Schnacken-Loch, an denen Zäunen perenn.

Bugula sylvestris villosa, flore speciosiore coeruleo T. feu *Consolida media Genevensis* foliis hirsutis IB. 3. 432. gulden Günsel, mit harichten Blättern, auf der Gansau, gegen Obwald, in der Gegend des kleinen Brückleins. Bugle de Geneve, perenn.

Eadem flore suave rubente sed varius.

Caprifolium germanicum T. five *Periclymenum germanicum non perfoliatum* IB. 2. 104. flore monopetalo tubuloso diviso, fructu molli, five *Periclymenum non perfoliat.* IB. 2. 104. Speck oder Zaun-Lilien, in denen Hagen in der Ruprechtsau, in dem Gansauer und Züllicher Wald, Ic. 1. Tab. hist. pag. 1. 299. & Rivin.

Campanula radice esculenta, flore coeruleo T. monopetalo five *Rapunculus vulgaris campanulatus* IB. 2. 793. foliis inferioribus bellidi similibus, humi accumbentibus, superioribus angustis & glabris, radice longiuscula alba subdulci Rapunkel, Fürwilein, Ic. 1. Tab. 1. hist. 293. perenn.

Campanula arvensis procumbens. T. five *Avicularia Salvii* quibusdam IB. 2. 800. Doucette.

FRANZ

Frauen-Spiegel, in denen Frucht = Aeffern nahe bey Züllich. *ann.*

Caprifolium non perfoliatum, foliis sinuosis T. flore monopetalo tubuloso diviso, Speck-Lilien, mit eingeschnittenen Blättern, und kleinen Durchwachs-Blättern, in dem Gansauer Wald, in der Ruprechtsau, in denen Zäunen, gegen Züllich. *perenn.*

Caprifolium non, perfoliatum foliis sinuosis variegatis T. Speck-Lilien, mit durchwachsenden, gesprengten Blättern, in dem Eckbolsheimer und Gansauer Wald, wie auch in Horto medico.

Caprifolium non perfoliatum, flore interius albo, rubro externe, Boerhav. in dem Eckbolsheimer Wald, gegen den Ziegelofen, auf dem St. Ottilien-Berg. *perenn.*

Cardamine pratensis, magno flore purpurascante T. cruciformi, sive Nasturtium pratense sylvestre IB. 2. 889. Wiesen-Kresse, Gauch-Blum, mit grossen Leibfarben Blumen, Cres-son des prez, lc. 1. Tab. hist. 844. auf allen feuchten Wiesen, *perenn.*

Cardamine pratensis magno flore albo, weisse Gauchblumen, ibid. bey dem Canal. *perenn.*

Cardamine pratensis magno flore albo pleno T. & IB. 2. 889. gefülter weisser Wiesen-Kresse, auf dem Schluten-Feld, vor dem Fischer-Thor, auf dem Glacis. *perenn.*

Cardamine flore majore elatior T. sive Nasturtium aquaticum erectum majus & amarum, folio longiore flore, simplici cruciformi albo, fructu siliquoso

D

est

est *Nasturtium aquaticum* flore majore elatius IB. 2. 885. Ic. Matthiol. epitom. 270. *Cresson d'eau amere*, Bitter Brunnen-Kress, in Wasser-Gräblein, in der Ruprechtsau, in dem XV. Wört, wie auch zu Oßwald. perenn.

Cardamine annua exiguo flore T. foliis pinnatis siliquis gracilibus, live *Sisymbrii Cardamine* species, quædam insipida IB. 2. 886. in dem Ober-Haßlacher Wald. ann.

Castanea sativa T. fructu majore dulci, echinato floribus flamineis amentaceis, in julum congestis, foliis læte virentibus ac splendentibus, acuminatis rigidis, zahmer Castanien-Baum, Ic. 1. Tab. hist. pag. 1385. *Chataigner*. perenn.

Castanea sylvestris T. flore amentaceo fructu echinato, fructu dulci minore. folio multifido, *Chataigner sauvage* wilder Castanien-Baum, zu Ottrott, am Gebürg, wie auch zu Oberbronn. perenn.

Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro T. five *Periclymenum rectum* fructu rubro IB. 2. 106. flore simplici monopetalo labiato, Zäunling, Hunds-Kirschen-Staude, *Cerisier bas*, est *Xylosteum* Rivin. Ic. 4. Tab. hist. 1. 299. in denen Hägen in der Ruprechtsau, in Hecken, in dem Zäfircher und Oßwalder Wald, perenn.

Chamæcerasus alpina, fructu gemino rubro, duobus punctis notato T. seu *Chamæcerassus alpina* Lob. Ic. 173. foliis integerrimis, Berg oder Hunds-Kirschen, in dem Gebürg, hinter hohem Andlau, perenn.

Chamæmelum vulgare leucanthemum T.
live

five Chamæmelum vulgare amarum IB. 3. 116. *flosculis radiatis, foliis tenuiter dissectis amaricantibus*, Chamillen, Apothecker Chamillen, hin und wieder auf denen Frucht-Neckern, Ic. 1. Tab. hist. 58. Camomille ann.

Chærophylum sativum T. *flosculis albis rosaceis umbellatis*, Garten oder Küchen-Körbel, nostratibus, Körbel-Kraut Ic. Tab. hist. pag. 283. Cerfeuil. ann.

Chærophylum sylvestre perenne, cicutæ folio T. five Myrrhis seminibus lævibus, *flosculis albis rosaceis*, Cicutaire Ic. 2. Tab. hist. 284. ♂ in Rivin. aller Orten, in denen Zäunen, in der Musprechtsau. ann.

Chelidonium majus vulgare T. five Chelidonia IB. 3. 482. *flosculis luteis cruciformibus, radice croceo succo amaro madente, fructu unicapsulari*, groß Schöll-Kraut, an denen Zäunen und Mauren, Ic. 1. Tab. hist. 101. Grand chelidoine. perenn.

Chelidonium majus laciniato flore, & foliis quernis T. five Chelidonium majus laciniato flore, Clus. hist. CCIII. per me satum uberime crescit, beim Schnackenloch. perenn.

Chenopodium folio triangulo T. *foliis spinachiae similibus, floribus stamineis luteis, fructu stellato*, vulgo Bonus Henricus IB. 2. 965. wilder Feld-Spinat. Bon Henry, ou Epinat Sauvage. Ic. Tab. hist. 810. aller Orten, an denen Wegen. perenn.

Chenopodium latifolium minus ramosum, florum petiolis longissimis, ex foliorum alis

confertim nascentibus, foliis sinuatis, Buxb. Enumerat. Plantar. Hallens. cum figura pag. 69. in durren Gräblein, in Schiltigheim.

Christophoriana vulgaris nostras racemosa & ramosa T. flore simplici rosaceo folio elegantissime dissecto, fructu molli ovato nigro, radice nigra fibrosa, St. Christopffels Kraut, Herbe de St. Christoffle, Ic. Tab. hist. 1163. auf dem Haulen Berg, im Wald, bey Ottmarsheim / auf der Haart. perenn.

Cirsium singularibus capitulis parvis, T. fructu papposo foliis non laciniatis, floribus flosculosis purpurascentibus, five Ill. montanum Clus. hist. CXLIX. vel Macrocaulon IB. 3. 45. auf dem Naßweiler Gebürg. perenn.

Cochlearia folio cubitali T. fructu globoso five Raphanus rusticanus, flore albo simplici, radice crassa alba acris Ic. Tab. hist. 799. Meerrettich, auf denen Gärtners Feldern, auf der Contrescarpe des Juden-Thors linker Hand, vor dem Fischers Thor, neben dem Schlutten-Feld. perenn.

Cornus fæmina T. five Cornus sylvestris, putata virga sanguinea, IB. 1. 314. floribus cruciformibus subalbicantibus, fructu nigro amaro & acerbis, foliis nervosis corno proximis, Blutgerten, Cornel-Strauch Ic. Tab. hist. 1459. Cornier sauvage perenn.

Crataegus folio laciniato T. fructu pyriformi five Mespilus apii folio sylvestris non spinosa, flore rosaceo albo. five Sorbus torminalis IB. 1. 63. & Lob. Ic. 200. Tom. 2. Tab. hist. 3. pag. 1427. wilde

wilder Eschröfl. Baum, Vogelbeeren Baum, Alizier, perenn. in dem Jngweiler Wald, zu Brumbf in des Jägers Garten, und in horte medico. perenn.

Crataegus folio subrotundo serrato, subtus incano T. sive Sorbus alpina IB. 1. 65. quæ Aria Lugdun. 202. wilder Sperber-Baum, auf dem Gebürg und Waldungen, zu Baar, und Oberbronn, allhier auf dem St. Johannis Wall, in der Stadt unter den Linden-Bäumen. perenn.

Cruciata hirsuta T. flore luteo cruciformi, foliis quaternis hirsutis, gulden Waldmeister, Croisette jaune Ic. IB. 3. 717. hln und wieder in denen besuchten Wegen, ann.

Cucumis vulgaris sativus fructu carnosio tereti T. floribus monopetalis luteis campaniformibus multifidis, foliis angulosis, fructu luteo, Cucumern, mit gelber Frucht, Ic. 1. Tab. hist. 864. Concombre, in Gärten, und Gärtners-Feldern. ann.

Cucumis sativus vulgaris, maturo fructu albo T. Cucumern, mit weisser Frucht, ibid.

Cucumis flexuosus T. fructu longissimo, krumme Cucumern Ic. Tab. hist. 865. ann.

Cyanus segetum flore coeruleo T. semine paposo sive Cyanus IB. 3. 21. simplici composito flosculoso, foliis integris, Bliet, blaue Korn-Blumen, Ic. 1. Tab. hist. 428. in denen Korn-Feldern, ann.

Cyanus segetum, flore albo T. weisse Korn-Blumen, auf Aeffern, bey Niederhauffbergen. ann.

Cyanus segetum disco coeruleo T. corona candida, weisse Korn-Blumen, zu Oßwald, unter der Frucht, ann.

Cydonia fructu brevior & rotundior carnosior T. *floribus albis rosaceis*, Apfel Quitten-Baum, hin und wieder in Gärten der Stadt, als aus dem Land, *lc. 1. Tab. hist. 1412. Coigner mâle, perenn.*

Cydonia fructu oblongo & levior T. Birn Quitten-Baum, *Coigner femelle lc. 2. Tab. hist. 1413. perenn.*

Cynoglossum majus vulgare T. *floribus monopetal. in fundibuliformibus, multifidis purpureis, foliis oblongis, radice longa succulenta, fructu capsulari, aspero*, Hundes Zung, *Langue de Chien*, an denen Landstrassen häufig, in der Ruprechtsau, neben den Bäumen, *lc. Tab. hist. 1113. G 1B. 3. 598. perenn.*

Cyperoides sylvarum tenuius spicatum, foliis mucronatis glabris, carinatis, pallide viridibus, culmo triquetro geniculato, spica crassa, ferruginea, *Parckins. Theatr. 1171. an dem Canal. perenn.*

Cyperoides spicis parvis, longe distantibus T. auf feuchten Wiesen, in der Ruprechtsau, und der grünen Wart. *perenn.*

† *Cyperoides foliis caryophyllæis, spicis oblongis & pediculis longioribus propendentibus* T. auf feuchten Wiesen bey Zülich, Cypern-Gras, mit Nägelein-Blättern und ablangen, an langen Stielen hangender Blüth. *perenn.*

Cyperoides polystachion, spicis teretibus erectis T. sive Gramen palustre majus *Lobel. lc. 11. foliis angustis*, auf feuchten Wiesen, am Canal. *perenn.* Cype-

Cyperoides latifolium, spica rufa, caule triangulo T. paniculis nigris, floribus apetalis stamineis, foliis spurganio similibus, groß breit blättricht Cypern-Gras, Ic. 1. Tab. hist. pag. 533. est Gramen *Cyperoides* Lob. Ic. 11. hin und wieder an denen Ufern der Ill, perenn.

Cyperoides latifolium spica spadiceo viridi majus T. & IB. 2. 495. breit blättricht Cypern-Gras, mit braunroth grüner Aehre, in sumpfigen Pfützen, in der Ruprechtsau, und andern Orten am Rheingiesen. perenn.

Cyperoides spica pendula brevior T. nigra, seu *Pseudo cyperus* Lob. Ic. 76. & IB. 2. 496. Cypern-Gras, mit kleiner schwarz abhangender Blüthe, an dem Rheingiesen, am Ufer, bey der Pulvermühl. perenn.

Cyperoides spica pendula longior & angustior T. five Gramen *Cyperoides spica pendula longior* & angustior CB. prod. 6. 13. & IB. 2. 497. in denen meisten Gräben, ausser der Stadt, in dem 2ten Graben, vor dem Fischers Thor. perenn.

Cyperoides palustre majus spica divisa vel *gramen Cyperinum palustre minus* Tab. hist. Ic. 4. pag. 533. klein Wasser Cyper-Gras, auf feuchten Wiesen, bey dem Schnackenloch. perenn.

Cyperoides polystachion lanuginosum T. viel ährichtes Cypern-Gras, mit wollichten Blättern, auf feuchten Matten, zwischen Obwald, und Gravenstaden, an denen Endungen feuchter Aecker, in der Ruprechtsau. perenn.

Cyperoides polystachion flavicans, spicis brevibus, prope summitatem caulis T. gelbichtes viel ährichtes Cypern-Gras, mit kleinen zu oberst am Stengel sitzenden Blättern, auf den feuchten Wiesen beym Mauer-Hof. *perenn.*

Cyperoides minus, spicis densioribus T. five Gramen *Caryophyllæum* Tab. hist. 521. quod Gramen est spicatum foliis *Vetonicæ caryophyllatæ* Lob. lc. 10. frühes Cypern-Gras, mit Nadel-Blättern, auf durren grasichten Orten, bey allen Lüssen. *perenn.*

Cyperoides palustre aculeatum capitulo brevior T. five Gramen *palustre echinatum* Lob. 15. & IB. 2. 497. Wasser-Gras, mit stechender Aehren, Igel-Gras, vor dem Metzger-Thor, in feuchten Orten, vor dem Glacis, wie auch in der Ruprechtsau. *perenn.*

Dens Leonis folio angustiore T. *foliis radiatis per terram sparsis*, semine papposo, schmahlblättrichter Löwen Zahn, auf durren und sandigen Erdreich. *perenn.*

Dens Leonis minimis foliis hirsutis & asperis T. five *Hieracium parvum hirsutum*, caule aphylo crispum ubi siccatum IB. 1038. auf brachliegenden Aekern, gegen Zülkirch. *perenn.*

Dens Leonis minor foliis radiatis T. *radice parva nigra* auf der Metzgerau, in der Ruprechtsau, an magern grasichten Orten. *perenn.*

Dens Leonis qui pilosella officinar. T. five *Pilosella major repens hirsuta*, flore composito flosculoso luteo, Mauß-Dehrlein, auf trockenen grasich-

grasichten Orten, Ic. 1. Tab. hist. pag. 506. *Pilosella ou Oreille de Rat. perenn.*

Dens Leonis qui *Pilosella*, folio minus villosa T. seu *Pilosella major*, folio angustiore, minus piloso repens IB. 2. 1090. auf dem Ried bey Bischofsheim, auf der Mezgerau. *perenn.*

Dentaria heptaphyllos baccifera T. flore cruciformi ex candido leviter purpurascente, siliqua corniculata, sive *Coralloides altera vel septifolia*, IB. 2. 899 Zahn-Kraut, oder Schuppmurk mit sieben Blättern, Ic. 4. Tab. hist. 324. & Clus. hist. CCXXII. auf dem Barrer Gebürg, in dem Dambacher Wald, per me auf dem Haulenberg. *perenn.*

Dentaria pentaphyllos, foliis mollioribus T. sive *Dentaria VII. Clus. hist. GCXXII.* est *Quinque folia* IB. 2. 900. Ic. Tab. 1. 323. auf dem Ottilien Berg, in dem Barrer Wald, wo man Eisen gräbt *perenn.*

Digitalis purpurea, folio aspero T. sive *Digitalis purpurea* IB. 2. 812. grosse rotthe Fingerhütlein, *Digitale rouge* Ic. 2. Tab. hist. 960. auf dem St. Ottilien Berg häufig / *perenn.*

Digitalis flore magno candido T. *monopetalo anomalo tubulato*, folio aspero, fructu rotundo cuminato, *Digitale blanche*, große weisse Fingerhütlein, in denen Hecken, 3. Viertel Stund hinter Blinschwenler. *perenn.*

Digitalis lutea magno flore T. *folio latiore Digitale jaune* Tab. Ic. 1. hist. 960. gelbe Fingerhütlein IB. 3. 813. est *Digitalis lutea*, auf dem obersten Gebürg des Falckensteins, cum precedente, *perenn.*

Doronicum radice scorpii brachiata T. five
I. *Tab. hist.* 715. Gembseurck auf dem Hau-
len Berg, per me fatum, *perenn.*

Elichrysum montanum longiore folio & flo-
re, purpureo T. *composito flosculoso semine pap-
oso*, Berg Ruhr-Kraut, mit langen rothen Blu-
men und Blättern, Ic. 8. *Tab. hist.* 781. bey allen
Lüften, auf denen Wiesen, umb Eschau. *perenn.*

Elichrysum montanum, longiore flore &
folio, albo T. Berg Ruhr-Kraut, mit weissen
langen Blumen und Blättern, *ibid.* auf der ma-
gern Wiese, der Eckolsheimer-Schlut, *perenn.*

Elichrysum montanum flore rotundiore sub
purpureo T. Ragen-Pfötlein, mit schönen runden
rothen Blumen, rothe Engelblumen, Ic. 7. *Tab.
hist. pag.* 781. *Pied de chat, ou Immortelle rouge*, auf
der Molkheimer Hart. *perenn.*

Elichrysum montanum flore rotundiore can-
dido T. five *Gnaphalium montanum album*, Lob.
.cl 482. Ragen-Pfötlein, mit runden weissen Blüm-
lein, Ic. *Tab. hist.* 6. 781. *ibid.* und in dem XV.
Wört an Rhein. *perenn.*

Elichrysum montan. flore rotundiore suave
rubente T. five *Gnaphalium montan, suave rubens*
Lob. Ic. 483. ♂ *Garidel* *Tab.* 30. bleich rothe Ra-
gen-Pfötlein, *ibid.* *perenn.*

Equisetum sylvaticum tenuissimis fetis T.
five *Hippuris tenuissima*, non aspera lB. Ic. 3.
730. & *Tab. hist.* Ic. 6. 569. Wald Ragen-Wadel,
mit zarten glatten Blättern, in feuchten schat-
tichten Wäldern, auf dem Hochfelder Gebürg,
perenn. Euoni-

Euonymus vulgaris, granis rubentibus T. seu *Euonymus multis*, aliis *Tetragona* IB. 1. 201. *floribus albicantibus rosaceis male olentibus* Ic. Tab. hist. 1462. *Bonnet de Iesuit*. Habnen-Hüddlein, oder Spindelbaum, Jesuiter-Käplein, in denen Hecken u. Wäldern, zu Illkirch, und Eckbolsheim. *perenn.*

Ferrum equinum germanicum, filiquis in summitate T. seu *Comosum Rivin.* & Garidel Tab. 33. gelbe Steinwicfen, zu Oßwald und Geistspizen häufig. *perenn.*

Fragaria vulgaris T. *floribus albis rosac. fructu ovato acuminato, ferens fraga rubra* IB. 2. 394. Erdbeeren Kraut, Ic. Tab. hist. 346. Fraiser, aller Orten, an denen Reinen der Zäunen, *perenn.*

Fragaria foliis hispida T. *ex utraque parte cinereis*, Stein oder Pflaster-Beeren, zu Buschweiler in denen Neben, zu Blinschweiler, *perenn.*

Frangula T. five *Alnus nigra baccifera*, IB. 1. 260. *flore rosaceo, fructu molli globoso*. Faulbaum, Zapfen-Holz, zu Ringelsheim, in der Ruprechtseau, unter den Hecken, *Anne noir* Ic. Tab. hist. 1461. *perenn.*

Frangula montana pumila saxatilis, folio subrotundo duro, fructu globoso molli nigro. T. zu Niederhaufbergheim, hinten zu auf Flecken bergichten Hügeln. *perenn.*

Fumaria officinarum flore purpureo T. *polypetalo anomalo papilionaceo, fructu filiquoso unicapsulari*, Tauben-Kropf, Ic. Tab. hist. 85. *Fume terre*, auf denen Fleckern, und in Weinbergen, *ann.*

Fumaria officinarum & *Dioscorid.* flore albo

bo T. Tauben-Kropf, mit weissen Blumen, in denen Neben bey Heiligenstein. *ann.*

Galeopsis vel Urtica iners, flore luteo, *fructu capsulari* T. & IB. 3. 323. est Lamium folio oblongo flore luteo, Ic. Rivin. *Ortie jaune*, gelbe taube Waldnessel, bey Waslenheim, in dem Grund-Thal, zu Baar, bey der Kirchen. *perenn.*

Geranium cicutæ folio minus, & supinum flore rubro, *fructu rostrato*, sive Arvense Tab. hist. Ic. 3. 123. Klein Acker Storchenschnabel, mit Schirlings-Blättern, *Bec de Grue* fast überall auf denen Aeffern, und neben den Landstrassen, *perenn.* Idem flore albo. T. Klein Acker Storchenschnabel, mit weisser Blüth, auf denen Aeffern, bey Bennisfeld. *perenn.*

Geranium Robertianum T. *flore dilute rubello striato simplici*, Stinckender Storchenschnabel, St. Ruprechts Kraut, Ic. 1. Tab. hist. 122. & Rivin. *Herbe Robert.* an alten verfallenen Mauern, und andern schattichten Orten *perenn.*

Geranium Robertianum viride T. est Geranium Murale IB. 3. 480. vel Foetens Rivin. Stinckender Storchenschnabel, mit grünen Stenglen, auf alten Mauern und Dächern, in der Ruprechtsau, *perenn.*

Geranium Robertianum flore albo T. Stinckender Storchenschnabel, mit weissen Blumen, auf fetten Aeffern zu Zülkirch, an der Landstrass gegen Fegersheim.

Geranium pimpinellæ fol. Dillen. feu Robertianum Rivin, Storchenschnabel mit Bisbernell

bernell Blättern, auf der Hart gegen Molkheim,
an der Landstrassen gegen Fegersheim. *perenn.*

Geranium Cicutæ folio moschatum T. Stor-
chen-Schnabel, mit wohlriechenden Schirlings-
Blättern, *lc. IB. 3. 479.* auf denen Aickern, in
dem Ostwinckel. *ann.*

Gladiolus minor, floribus uno versu disposi-
tis T. *purpureis monopetalis liliaceis, radice bulbosa,*
fructu oblongo, braun Schwertel, *lc. Tab. hist.*
1024. perenn. auf dem Hochgebürg beyrn Scheer-
weiler Schloß. *perenn.*

Globularia vulgaris T., *fructu capsulari, sive*
Globularia, bellidi similis *IB. 3. 13. sive Bellis*
coerulea, caule folioso, radice fibrosa, lc. 6. Tab.
hist. 708. blaue Maßtleben, auf dem Polygon
oder Schießberg, auf der Meßgerau / und zu
Oßwald, *perenn.*

Gramen palustre cyperoides triquetrum,
spica integra *IB. 2. 497.* Wasser Cyper-Gras,
an der Breusch, bey der grünen Wart, auf
dem Wacken, neben der Zll. *perenn.*

Gramen cyperoides palustre, spica divisa,
CBp. an *Gramen cyperoides palustre majus,*
spica divulsa, bey Gravenstaden, in einem feuch-
ten Wäldlein, wie auch zu Eschau, an dem
Mühlbach. *perenn.*

Gramen sylvaticum *III. Tab. hist. 537. spica*
divulsa, Klein Wald-Gras, an verschiedenen
feuchten Orten, beyrn Jägerhof, in der Ru-
prechtsau. *perenn.*

Gramen cyperoides palustre majus, spica
com-

compacta, CBp. *caule exacte triangulari*, Wasser Cypern-Gras, an dem Ufer der Preusch und der Ill. *perenn.*

Gramen cyperoides spicatum minus, spica longa divulsa. CBp. *Ray hist.* 297. im Oswald der Wald. *perenn.*

Gramen nemorosum, panicula rufescente molli T. five Gramen sylvaticum vel nemorosum *Tab. hist. Ic. I. pag.* 537. est, Gramen sylvaticum parvum tenuifolium rigidiusculum *IB. 2.* 509. Busch oder Wald-Gras, auf Wiesen, gegen Oswald, bey dem Steeg im Ostwinckel.

Gramen dactylon radice repente five officinar T. quod legitimum Clus est, CCXVII. in denen Kuchengärten, in der Ruprechtsau und andern Orten. *perenn.*

Gramen dactylon angustifolium, spicis villosis T. five Ischaemum II. *Tab. hist.* 534. est Gramen digitatum hirsutum *IB. 2.* 445. auf denen Wiesen gegen Oswald, an der Landstrassen nach Blobsheim, auf einer durren Wiese, an dem Rhein Ziegelofen, *perenn.*

Gramen spicatum, spica cylindracea molli & densa T. five Alopecuroides *Lob. Ic.* 8. Kolben-Gras, auf denen Wiesen bey Oswald, auf denen Aekern, vor dem Cronenburger-Hochgericht. *perenn.*

Gramen spicatum glumis cristatis T. Ramm-Gras, bey Merkweyer, auf denen Wiesen, *perenn.*

Grossularia hortensis major, fructu molli
T.

T. flore simplici rosaceo subviridi, foliis amplioribus, fructu rubro, grosse Sanct Johannis Traublein Staude, mit rother Frucht, *Grosseiller rouge*, Ic. Tab. hist. 1492. in allen Gärten, *perenn.*

Grossularia hortensis, majore fructu albicante, *mollis globoso*, *Groseiller blanc*. *T. grosse Johannis - Traublein* Staude, mit weisser Frucht/*perenn.* *ibid.*

Grossularia sylvestris spinosa, simplici acino *T. five Uva crispa*, IB. 1. 47. wilde Stachelbeeren Staude, Ic. Tab. hist. 1491. *Grosseiller sauvage*, fast in allen Hägen und Zäunen, in der Stadt, zwischen der Mauer, auf dem Graben, gegen dem Spitz-Thor zu. *perenn.*

Grossularia non spinosa, fructu nigro major *T. five Ribes nigrum vulgo dictum*, folio o-lente & fructu, & schwarze Johannis Beeren Staude Ic. 2. Tab. hist. 1492. & IB. 2. 98. *Grosselier noir*. in denen Hecken und Büschen, zu Obwald und Züllich im Wört. *perenn.*

Grossularia non spinosa, fructu nigro minore *T. schwarze Johannis Beeren-Staude*, mit kleinen schwarzen Beeren. *ibid. perenn.*

Grossularia multiplici acino, five non spinosa hortensis rubra *T. five Ribes officinarum vulgaris*, gemeine St. Johannis Trauben-Staude, mit rothen Beeren, *Grosseiller rouge* Ic. 1. Tab. hist. 1492. in allen Gärten. *perenn.*

Hedera arborea T. feu communis major IB. 2. III. vel scandens & corymbosa, floribus roseis, foliis triangulatis, fructu nigro Ic. 1, Tab. hist.

1278. *Lierre*, *Epheu*, *Mauer Epheu*, mit großen Blättern, an denen Stämmen der Bäume, an Mauern hin und wieder. *perenn.*

Hedera communis minor IB. 2. 113. *feu sterilis* Lobel. aut *Helix* Fuchs. 432. *klein Epheu*, unfruchtbarer, auf Erden kriechender *Epheu*, mit spitzigen Blättern, *Petite lierre*, an denen Stämmen, unten der Wurzel zu, Eichen und anderer Bäume. *perenn.*

Helianthemum vulgare, *flore luteo* T. *simplici rosaceo fructu globoso*, *Sonnen-Gunsel*, Ic. Tab. hist. 1474, *Elianteme*, hin und wieder auf dürren graslichten Orten, *perenn.*

Herniaria glabra T. *flore apetalis*, *fructu capsulari oblongo* sive *Millegrana*, Lobel. Ic. 421. *Herniole ou Turquette*, *Harn-Kraut*, *Bruch-Kraut*, in feuchten sandigen Gruben, aller Orten, vor allen Thoren der Stadt. *ann.*

Hieracium luteum glabrum, *feu minus hirsutum*, IB. 2. 1024. *flore semi flosculoso*, *semine paposo*, *est Aphaca*. Lugd. 562. *gelbe Wegwart*, an der Landstrasse, bey Züllich, bey der Lohmühl, oberhalb der Stadt, auf der Glacis, vor dem Cronenburger-Thor, neben dem Fleckern, *ann.*

Hieracium majus erectum angustifolium, *caule laevi* T. sive *Hieracium majus* Dioscoridis. Tab. hist. Ic. 1. pag. 481. *groß Wiesen Hasbich-Kraut*, mit einem glatten Stengel, im Ostwinckel auf den Wiesen, auf der Gallen-Matt, vor dem Weisenthurn-Thor. *perenn.*

Hieracium montanum umbellatum angustifolium

folium T. *multiflorum flore parvo*, Berg Habich-
Kraut, mit gestirnten kleinen Blümlein, an rau-
hen steinichten Orten, zu Heiligenstein, *perenn.*

Hieracium montanum glabrum latifolium
minus T. *Tab. hist. 495.* Klein Berg Habich-
Kraut, mit breiten Blättern, hinter Haar auf
feuchten grasichten Orten. *perenn.*

Hippocastanum vulgare T. *sive Castanea*
equina, flore simplici rosaceo spicato folio multifido, fru-
ctu amaricante echinato, Roß Castanien-Baum,
Marronier d'Inde Ic. 2. *Tab. hist. 1385.* aller Orten
in Alleen, in der Ruprechtsau, am Jesuiters-
Garten. *perenn.*

Iris palustris lutea T. *sive Acorus adulteri-*
nus IB. 2. 732. *flore monopetalo luteo liliaceo, folio*
ensiformi, radice tuberosa, fructu oblongo, gelbe
Sumpf-Lilien, Wasser-Schwertel, Ic. *Tab.*
hist. 103. Flambe bastard, ou Glajeu de marais,
in allen sumpfigten Gräben, vor denen Tho-
ren, *perenn.*

Iris pratensis angustifolia humilior T. *Kleine*
Gras-Lilien, est *Iris tenuifolia Chabraei. 243.*
auf feuchten Wiesen bey'm Mauerhof. *perenn.*

Iris pratensis angustifolia non foetida altior
T. *sive Iris tenuifolia major, flore coeruleo &*
striato angustifolia IB. 2. 727. *lc. 12. Tab. hist.*
1073. Gras Lilien, blauer Wiesen-Schwertel,
auf denen dunkeln und feuchten Wiesen, bey'm
Mauerhof. *Glajel de prez. perenn.*

Isatis sativa latifolia T. *Isatis sive Glastrum sa-*
tivum, IB. 2, 909. floribus luteis cruciformibus, ra-

dice alba longa, minus fibrosa, fructu lingulari, Weid, *Pastel ou Guide à feuilles larges*, 1c. 2. Tab. hist. 1114. auf dem Glacis, am Metzger- und Spithal-Thor. *perenn.*

Ifatis sylvestris angustifolia T. *Ifatis* five *Glastum spontaneum* 1B. 2. 999. wilde Weid, mit schmahlen Blättern, 1c. Tab. hist. 1114. *Pastel sauvages à feuilles étroites*, auf dem Schliessen. *perenn.*

Iuncus angustifolius villosus, floribus albis paniculatis, T. *fructu trigono* five *Gramen Luzulae affine flore albo* 1B. 2. 492. haricht Wald-Gras, auf dem Hochgebürg Hochfeld. *perenn.*

Lathyrus arvensis repens tuberosus T. five *Chamaebalanus leguminosa* 1B. 2. 324. floribus papilionaceis elegantissime purpureis suaveolentibus, *radice esculenta*, Erckel-Nuß, kleine tief stehende Erdgriebeling, nostrat. Sau-Mandeln, 1c. Tab. hist. 891. ♂ in Rivin. Gesse, in denen fetten Korn-Feldern, zu Brischwickersheim, nahe an der Capell. *perenn.*

Lathyrus latifolius luteus foliis viciae T. five *luteus sylvestris dumetorum* 1B. 2. 304. *radice fibrosa fructu siliquoso tereti*, gelbe Wicke, 1c. Tab. hist. 890. ♂ in Rivin. sub nomine *Lathyri arvensis*, auf denen Wiesen, bey dem Canal.

Leucanthemum caule villis canescente T. five *Bellis sylvestris*, caule folioso hirsuto major, folio acutius CBp. Gänse-Blumen, mit rauhen Stengeln, und spizigen Blättern, zu Dorlisheim, am Dattel-Brunnen, auf denen Matten, bey dem Mauerhof und allen Lüsten, *perenn.*

Lilac T. *flore cœruleo monopetalo infundibuliformi, fructu compresso lingulari*, blaue Zirincken, in Hagen, in der Ruprechtsau, in Gärten, Ic. 1. Tab. hist. 1459. perenn.

Lilium convallium album T. five Lilium conuallium vulgo IB. 3. 531. *flore monopetalo campaniformi, radice alba repente, fructu globoso molli*, Meyen-Blumen, Ic. Tab. hist. 1135. Muguet à fleur blanche, zu Oskwald, im Ostwinckel, perenn.

Lilium convallium latifolium T. Meyen-Blumen, mit grossen Blättern und Blumen, Ic. 1. Tab. hist. 1335. bey Rheinau, unten gegen dem neuen Dörfel, auf dem Haulenberg, perenn.

Lilium convallium floribus è folliculis prodeuntibus Mapp. Ic. hist. plantar. pag. 174. perenn. auf dem Wangenburger Gebürg gegen Zabern.

Linagrostis panicula ampliore T. five luncus Bombycinus IB. 2. 514. est Gramen tomentarium, Bettgras, Linagrostis Tab. hist. Ic. 540. auf denen feuchten Wiesen bey Oskwald.

Linagrostis panicula tenuiore seu minori T. & Vaill. zu Waslenheim bey der Papier-Mühle.

Lithospermum minus repens latifolium T. *flore purpureo infundibuliformi, semine subrotundo polito*, five Lithospermum repens, majus, Clus hist. CXLIII. Stein-Hirse, auf denen Gebürgen, hinter Heilgenstein. perenn.

Lotus pentaphyllos flore majore luteo papilionaceo splendente, *fructu siliquoso* T. five Loti corniculatæ major species, IB. 2. 355. Ic. Ri-

ein grosse Vogelwicke, auf dem Schießrein, an denen Gärten, und Gräben, ohnweit der Bruck, nahe der Lohmühl, *Lotier perenn.*

Lotus pratensis filiquosus luteus major & durior. T. Clus. hist. CCXLIV. five Trifolium filiquos. Tab. hist. 1. 904. est Lotus tetragonolobus Rivin. Schoten-Klee, in der Ruprechtsau, gegen der Schiffmatt, bey den Linden-Bäumen. perenn.

Lunaria major filiqua longiore, Boerhav. five Viola lunaris Ic. 2. Tab. hist. 696. Mond Beysel, oder Silberblatt auf dem Gebürg, im Niedercker-Thal, biennio durat.

Lunaria major filiqua rotundiore Boerh. five Viola lunaris Ic. 1. Tab. hist. 696. Silberblatt mit runden Schoten, ibid.

Lychnis montana viscosa alba latifolia T. five Polemonium petræum Gesneri IB. 3. 351. florum petalis supra albis, subtus virescentibus, interdum contrahentibus caryophyllæis, five Lychnis Sylvestris Tab. hist. pag. 674. & Clus. hist. IX. pag. 291. zu Heiligenstein / in denen Holwegen, auf den St. Ottilien-Berg. perenn.

Lychnis pratensis flore admodum laciniato simplici T. purpureo, Flos Cuculi dictus, Tab. hist. Ic. 15. 677. Girofle de prez, rothe Bauch-oder Guguck's-Blumen, auf allen Wiesen, perenn.

Eadem flore albo T. weisse Guauks-Blumen, auf der Glacis, vor dem Metzger-Thor, auf denen Wiesen bey der Gansau, perenn.

Lychnis sylvestris alba simplex T. major hirsuta, foliis latioribus, five Ocimoides album multiplex,

tiplex , IB. 3. 342. five Ocimastrum Tab. hist. Ic. pag. 679. weiser Wiederstoß , auf allen Contre-scarpes , und an denen Hecken , vor dem Zulkircher Wald , wie auch an denen Landstrassen. perenn.

Lychnis sylvestris five Aquatica purpurea simplex T. flore rubello simplici T. five Ocimastrum rubrum Tab. hist. Ic. 2. 679. rother Wiederstoß , in feuchten waldichten Orten , an Wasser-Bächen , Basilic sauvage, à fleur rouge, perenn.

Lychnis sylvestris viscosa angustifolia rubra T. foliis caryophyllaceis , Ic. 7. Tab. hist. 670. quæ Viscaria Rivin. wilde purpur rothe Marien-Köflein , Kleb-Melcken , in der Hart , bey Ottersheim, perenn.

Eadem alba T. Pech oder Kleb-Melcken / mit weissen Blumen , in dem Urbis Thal , in denen Hecken. perenn.

Lyfimachia humifusa , folio subrotundo acuminato , flore luteo T. monopetalo rotato 6, multifido , fructu globoso five Nummularia seu Centimorbia IB. 3. 370. quæ Anagallis lutea Lob. Ic. 466. Ic. Tab. hist. 3. 1092. gelber Bauchheil, Wald Pfennig-Kraut , in dem Oberehenheimer und Barrer Wald , Mouron, à fleur jaune, perenn.

Malus sylvestris fructu valde acerbo carnosoglobofo , T. flore albo rosaceo, fructu albo. wilder Apfel-Baum , Pomier sauvage, ou de bois , in Büschen und Wäldern , in dem Zulkircher Wald, und sonst an denen Strassen hin und wieder, perenn.

Malus acido fructu sylvestris T. five *Mala sylvestria rubentia* Tab. hist. 1c. 21. 1420. Holz Aepfel-Baum, mit rother Frucht, *ibid.*

Malus sylvestris fructu acido albo T. Holz Aepfel-Baum, mit weisser Frucht, *ibid.*

Matricaria vulgaris seu sativa T. *foliis graveolentibus latioribus incisiss, floribus compositis radiatis,* five *Artemisia tenuifolia* Tab. hist. 1c. 3. Mett-ram, in der Ruprechtsau, an denen Zäunen, der Gärten, *Matricaire, perenn.*

Medica echinata minima T. IB. 2. 386. five *Trifolium echinatum arvense*, fructu minore echinato, est *Tribulus minor rectus* Dalechamp, Lugd. 513. auf sandigen steinichten Aeckern in der Ruprechtsau, *ann.*

Melissa humilis latifolia, maximo flore purpurascente T. *semine subrotundo* five *Lamium montanum melissæ folio* CBP. *monopetalo labiato suave rubente, grati odoris, foliis ex opposito binis latioribus, in ambitu serratis,* est *Melissa* Fuchs. Lob. 1c. 515. Berg-Melissel, mit Melissen-Blätter, nostratibus, Griesß Kraut, 1c. Rivin. *Melisse de Montaigne. perenn.*

Menyanthes palustre T. five *Trifolium Fibrinum majus*, flore *monopetalo cœruleo infundibuliformi, radice amarissima succulenta*, 1c. Tab. hist. pag. 906. Bieher oder Gumpß-Klee / in sumpfichten Gräben, bey der Ringelsheimer Nachtwende. *Meniante, perenn.*

Menyanthes palustre angustifolium & tryphyllum T. *flore monopetalo infundibuliformi, fructu oblon-*

oblongo. T. seu *Trifolium Fibrinum* *Tab. hist. schma-*
les Bieber-Klee, auf dem Hochgebürg Hochfeld
beym Quell-Bächlein, *perenn.*

Mercurialis spicata seu *foemina*, T. *flore ape-*
talo viridi, Bingel-Kraut, Weibl. *Mercuriale fe-*
melle, Ic. 2. *Tab. hist. 941. ann.* aller Orten in
Gärten, und auf denen Kraut-Neckern.

Mercurialis testiculata five *Mas* T. *Mercuria-*
le mâle Bingel-Kraut, Männlein, Ic. 1. *Tab. hist.*
pag. 941. cum præced. ann.

Mespilus apii folio sylvestris spinosa T. five
Oxyacantha vulgaris, *flore simplici rosaceo albo, fructu*
globoso, Weißdorn, Hagedorn, *Epin blanche* Ic. 1.
Tab. hist. 1448. in Wäldern, Büschen, in denen
Hägen und Zäunen. *perenn.*

Mespilus folio subrotundo, *fructu rubro*
globoso T. five *Cotoneaster* *Gesner. 1B. 1. 73.*
est *Chamæmespilus* *Munting. ubi icon elegans.* Zwerg-
Nespeln, wilde Quitten, hinter dem Ottilien-
Berg, *perenn.*

Mespilus folio rotundiore subtus incano,
fructu nigro subduli T. *f. osculis albis rosaceis*, five
Vitis Idæa. III. *Clus. hist. 62. Amelanchier*, Flie-
gen-Beer, im Gebürg, zu Barr und Oberbronn.
Ic. *Tab. hist. 1488. perenn.*

Mespilus germanica folio laurino non ferra-
to T. five *Mespilus vulgaris* *1B. 1. 69.* Nespelbaum,
in Gärten, und in denen Weinbergen, Neflier
Ic. *Tab. hist. 1447. perenn.*

Mespilus sylvestris foliis trifidis splendenti-
bus, *Vaillant. floribus rosaceis foetidis*, Weißdorn,
E 4 mit

mit 3. eingeschnittenen Blättern, so glänzen, und weissen übelriechenden Blumen, in der Ruprechtsau, an denen Hägen, und an dem Eckbolsheimer Wald, gegen dem Cauval. *perenn.*

Millefolium vulgare album T. five *Stratiotes pennatum* terrestre IB. 3. 136. *foliis pinnatis, flosculis albis compositis, radiatis & umbellatis, semine tenui,* Schafgarbe, Garben Kraut, mit weissen Blumen, Ic. 3. Tab. hist. pag. 372. *Mille feuille, perenn.*

Millefolium purpureum majus T. Garben Kraut mit rothen Blumen. *perenn.*

Myagrum monospermum latifolium T. est *Myagrum monospermum* IB. 2. 894. *flore cruciformi, fructu unicapsulari, quod hortense Hort. Eyst. zu Yulfirch, neben den Aefern. ann.*

Myosotis hirsuta altera viscosa T. fleblicher Aefer Hinderdarm, Ic. Vaill. Fig. 1. Tab. XXX. auf denen Aefern, in der Ruprechtsau, an dem Weg gegen Eckbolsheim. *perenn.*

Myrrhis palustris latifolia alba T. *flore roseo, fructu gibbo striato, quæ Myrrhis palustris Rivin, & Cicutaria alba Lugd. 789.* Wasser Myrrhen Körfel, mit weissen Blumen, in der Ruprechtsau, in Wassergräben, bey der Lohmühl, oberhalb der Stadt, *perenn.*

Myrrhis palustris latifolia rubra T. five *Cicutaria latifolia hirsuta* IB. 3. part. 2. 182. *Cicutaria rubra Lugd. 789.* breitblättrichter Myrrhen Körfel, mit rothen Blumen, auf den Wällen, Cronenburger und Juden-Thors, *perenn.*

Myrrhis tuberosa nodosa, Conyophyllon
Mor.

p. 73.

Tab III.

Nissolia . J.



J. Striedbeck sculp

Mor. Umb. 67. five Myrrhis cicutaria, Tab. hist. Ic. 292. est Myrrhis foetens Rivin. stinckender Myrrhen-Körnel, nach Singelsheim, an der Landstrass häufig, auf dem Haulenberg. ann.

Nidus avis T. five Orchis abortiva fusca caule & flore majore fusco, polypetalo anomalo Ic. IB. 2. 782. Nid d'oiseau, Vogel-Nest, Magendrehen, in schattichem Gebürge, auf dem Ottilien-Berg, unter den Bäumen.

Nissolia vulgaris T. five Lathyrus angustifolius erectus, folio singulari, sine capreolis Dn. Nissole HR Monsp. fructu siliquoso, est Catanance leguminosa IB. 2. 309. wilde Acker-Wicke, in denen Gersten-Feldern, bey Ehrstein. vid. Tab. nostr. III.

Nux juglans five Regia vulgaris T. floribus amentaceis, exjulo pendentibus, fructu ovato, Welscher Nußbaum, Ic. Tab. hist. 1382. perenn.

Ophris bifolia T. flore herbaceo polypetalo anomalo, radice fibrosa repente, five Bifolium majus, IB. 3. 533. Zweyblatt, zu Osward, in der Ruprechtsau, und zu Singelsheim, in denen Heiden. Double feuille, perenn.

Opulus T. five Sambucus aquatica IB. 1. 152. flore simplici albo monopetalo rotato umbellato, bacca molli Ic. 4. Tab. hist. 1440. Schwelgen-Baum, Obier, in feuchten Wäldern, und auf dem Haulenberg.

Orchis bifolia latissima CBp. foliis binis splendentibus IB. 2. 772. grosse Fuchshoden, mit sehr breiten Blättern, zu Zülkirch, perenn.

Orchis bifolia altera T. five *testiculus, vulpinus* IV. hermaphroditicus, flore albo calcari longissimo, radice gemina longa. *Ic. 5. Tab. hist. 1054.* *Orchis hermaphroditica, bifolia* IB. 2. 772. est *Testiculus vulpinus* Hort Eyst. Weiß Knaben-Kraut, mit langen Spörlein, *Couillon de Renard*, in dem Ruprechtsauer Wald. *perenn.*

Orchis morio, foliis sessilibus maculatis T. five *Cynosorchis maculata* *Tab. hist. Ic. 5. 1048. flore purpureo violaceo, testiculo duplici*, est *Cynosorchis delphinia maculosis foliis, flore purpureo violaceo* IB. 2. 760. Knaben-Kraut, mit purpurfarbenen Blumen, auf denen feuchten Wiesen, in der Ruprechtsau, auf den Matten, gegen Haslach und Nideck. *perenn.*

Orchis foliis sessilibus non maculatis T. five *Orchis V. Clus hist. 268. vel Orchis major tota purpurea, non maculata* IB. 2. 760. est *Cynosorchis foemina* HE. Ragwurß Weiblein, mit purpurfarbenen Blumen, auf der Gansau, und in der Ruprechtsau, auf trockenen Wiesen. *perenn.*

Orchis morio mas foliis maculatis Vaill. 150. *sessilibus flore magno roseo, bulbo gemino*, Knaben-Kraut, mit bleichrothen Blumen, und gefleckten Blättern, am Wald, auf der Eschbolsheimer Wiese, *perenn.*

Orchis morio foemina T. & Vaill. 150. *tota purpurea foliis non maculatis* *Ic. 7. Tab. hist. 1048. ibid.*

Orchis fucum referens colore rubiginoso T. & Vaill. 146. *Tab. XXX. flore hirsuto, foliolis superioribus*

perioribus viridibus, calcari non gaudente, bulbo gemino Ic. 3. Tab. hist. 1053. & Buxbaum Cent. III. Tab. XXXVIII. five Testiculus sphægodes hirsuto flore IB. 2. 767. braune Hummel-Blum, braun Knaben-Wurzel, auf durren Orten, zu Oßwald und Lingelsheim. *perenn.*

Orchis fucum referens, floribus variegatis T. Himmel-Blumen, mit bunten Blumen, auf den Paßberg zu Buchsweyler. *perenn.*

Orchis fucum referens flore subvirente T. quæ Melitias IB. 2. 767. & Tab. hist. Ic. 5. pag. 1056. five Testiculus vulpinus sphægodes Lob. Ic. 179. Fuchshöddlein, mit gelb grünen Mücklein/ auf dem Haulenberg, *perenn.*

Orchis fucum referens major, foliolis superioribus candidis & purpurascentibus T. cum aviculis testiculata, five *Orchis fuciflora*, galea & alis purpurascentibus IB. 2. 766. Knaben-Kraut, oder rothe Hummel-Blum, zu Lingelsheim und Hangenbiethem, *Triple Couillon de chien* Ic. 6. Tab. hist. 1051. *perenn.*

Orchis Araneam referens, petalis superioribus magnis, intense purpureis, rostello longiori aviculam mentiente, apice lutea, in extremitate petali inferioris Mapp. Ic. Vaill. fig. 10. 11. & 13. Tab. XXX. est *Orchis Melitias* seu *Apis cadaverculum* exprimens Lob. 180. & Vaill. 152. auf dem Paßberg zu Buchsweyler.

Orchis palmata pratensis latifolia, longis calcaribus, folio non maculato T. five *Palmata non maculata* IB. 2. 774. Ic. 1. Tab. hist. 1059. & H.

& H. Eyft. schmahl blättricht Knaben = Kraut ,
mit langen Sporen , auf feuchten Wiesen , bey
Eingelsheim , *perenn.*

Orchis palmata pratensis angustifolia minor
T. five Palma Christi 3. Hort. Eyft. *flore purpu-*
reo odoratissimo, longo calcaris prædito rubello, wohl-
riechend Händlein Wurk mit schmahlen Blättern,
und rōthlichten Blumen / auf der Eingelsheimer
Nachtweyde. Ic. 3. Tab. hist. 1060. *perenn.*

Orchis palmata pratensis angustifolia major.
T. *floribus dilute purpureis vel Palma Christi tertia*
HE. auf der Eingelsheimer Nachtweyde , auf ber-
gichten Wiesen bey Barr. *perenn.*

Eadem flore albo *ibid.*

Orchis palmata minor calcaribus oblongis
T. quæ *Palmata angustifolia non maculosa Ri-*
vin five Palmata rubella B. 2. 278. est Palma Chri-
sti fæmina Tab. *floribus inodoris rubellis*, Klein
Händlein Wurk , mit langen rōthlichten bespor-
ten Blumen , zu Mundelsheim , in dem Wald
zu Zulfirch , zu Hangenbietheim , *perenn.*

Eadem flore albo , sed rarius.

Orchis palmata montana maculata, flore
variegato, foliis pallide viridibus angustioribus, flori-
bus rubris punctatis, quæ *Orchis Palmata al-*
ba IB. 2. 775. auf dem hohen Andlauer Gebürg,
perenn.

Orchis palmata Batrachites T. seu *Myodes*
Lob. Ic. 193. & Vaill. Tab. XXXI. num. 6.
flore galeato viridi Händlein Wurk , mit grünen
Helms

Helm-Kappen, auf dem Haulenberg, zu Oßwald und Lingelsheim, *perenn.*

Orchis palmata palustris latifolia T. five *Serapias palustris latifolia*, flore atro sub purpurascente *IB.* 2. 775. *folio maculato*, qua *Palma Christi* 3. *Tab. hist. pag.* 1061. breit blättricht Händlein Wurk, mit bleich röthlichten Blumen, zu Lingelsheim auf der Nachtweyde, bey dem Bächlein, bey den 7. Fußfällen, und in der Ruprechtsau. *perenn.*

Orchis palmata palustris altera T. *foliis latioribus maculatis*, *floribus violaceis* *IC.* *Tab. hist.* 9. 1061. five *Palmata serapias palustris*, *leptophylla*, *violacea maculata & non maculata* *IB.* 2. 776. Wasser Händlein Wurk, mit punctirten Blättern, auf feuchten Wiesen, zu Oßwald und Ruprechtsau, *perenn.*

Orchis palmata palustris maculata T. five *Palmata palustris Nephelodes* *IB.* 2. 777. quæ *Palma Christi palustris* 1. *Tab. hist. p.* 1061. Wasser Händlein Wurk, mit gefleckten Blättern, *IC.* *Tab. hist.* 7. *pag.* 1061. zu Lingelsheim, und auf andern feuchten Wiesen, *perenn.*

Orchis palmata palustris tota rubra T. five *Palmata floribus impense rubris* *IB.* 2. 777. *foliis & floribus non maculatis rubris*, quæ *Palma Christi* 2. est *Tab. hist.* 1061. Wasser Händlein Wurk, mit ganz rothen Blumen, zu Oßwald, *perenn.*

Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans Mas T. & Vaill. 147. *testiculata* Stendel Wurk,

Wurk, wo die Blum einen nackenden Menschen præsentirt, in der Ruprechtsau, auf den Matten, und in dem XV. Wört auf grasichten Boden. *perenn.*

Orchis flore Simiam referens T. five Cynorchis latifolia, hiantæ cucullo minor Tab. hist. Ic. 2. 147. testiculata, five Orchis Cercopithecum exprimens lusitanica altera Breyn. Cent. 101. p. 42. gemein Knaben-Kraut, optima icon in Inst. RH. Tournef. Tom. 2. Tab. 247. & Vaill. Tab. XXXI. N. 25. fast aller Orten bey Obwald, und auf dem Haulenberg. perenn.

Orchis papilionem referens foliis maculatis T. testiculata seu Orchis ornithophora, folio maculoso IB. 2. 759. Lobel. Ic. 183. Fuchshöddlein, zu Ringelsheim, und auf dem Gebürg, zu Kappolsweyler, perenn.

Orchis barbata odore hirci, brevior latiorque folio T. calcari donata, five Orchis barbata foetida Tab. hist. 1. 1055. & IB. 2. 756. Couillon de bouc, grosse Bockshöddlein, stinckende Weilwurk, mit breiten Blättern, auf dem Paßberg, zu Buchsweyler häufig, zu Hangenbiethheim, in der Ruprechtsau, bey dem Jägerhof, in denen Hecken. perenn.

Orchis odore hirci minor T. five Triorchis, minor flore fuliginoso IB. 2. 764. Ic. Tab. hist. 3. 1053. & Lob. Ic. 177. testiculata cum calcari, potius Cimicum odore, flore obsolete purpureo, stinckend Wangen Knaben-Kraut, bey Ringelsheim häufig, auf einer fetten und feuchten Wiesen, linker Hand bey dem Krengel. perenn. Or-

Orchis latifolia hiantе cucullo major T. testiculata five *Cynoforchis major trifolia, galea & alis fere cinereis* IB. 2. 757. elt *Satyrium triphyllum* Tab. hist. 1056. groß Knaben-Kraut, mit Aschen farbigen Blumen, zu Eingelsheim, Osward, und anderen Orten mehr. *perenn.*

Orchis latifolia hiantе cucullo altera T. five Cynoforchis prior Dod. pempt. 234. ♂ IB. 2. 758. Berg Knaben Wurk, auf dem Haulenberg, und in der Ruprechtsan. *perenn.*

Orchis latifolia spica compacta T. purpurea testiculata vel *Cynoforchis III. Dodon. Lobelio major alter* IB. 2. 762. five *Cynoforchis major IV. Tab. hist. 1047. Knaben-Kraut, mit dichter schön rothen Flor, nostratibus, Blutwurk, in der Ruprechtsau, in denen Hecken. perenn.*

Orchis militaris major T. testiculata, galea fusca ♂ *floribus eleganter punctatis, seu Orchis strateumatica major* IB. 2. pag. 758. five *Orchis latifolia altera* Clus hist. 267. quæ *Orchis latifolia* est H. Eyst. Tab. 195. *Grand Coullon de Chien Ic. Tab. hist. 5. pag. 1050. sub nomine Testiculus V. militaris, groß Knaben-Kraut, mit braun schwarzem Helm, und schönen punctirten Blumen, in dem Gankauer Wald häufig, ist unter allen die größte und schönste.*

Orchis militaris minor T. floribus parvis albis multis punctis purpureis notata testiculata, Ic. Tab. hist. 7. pag. 1051. five Orchis strateumatica minor IB. 2. 19. 758. ♂ Vaill. Tab. XXXI, fig.

Eyft. breit blättricht Knaben-Kraut, mit langen Sporen, auf feuchten Wiesen, zu Oßwald und Lingelsheim, *perenn.*

Variat colore carneo, lacteo, suave rubente, lituris purpureis.

Orchis militaris pratensis humilior T. testiculata flore guttato sanguineo. sive *Orchis pannonica* *Clus hist.* 268. est *Orchis minima* Rivin, Klein punctirtes Knaben-Kraut, bey Oßwald auf denen Wiesen.

Orchis militaris montana spica rubente, conglomerata T. *testiculata* *lc.* 8. *Tab. hist. pag.* 1051. roth Knaben-Kraut, mit gedrungenem Strauß, in dem Zülkircher Wald. *perenn.*

Eadem flore albo. in dem Ruprechtsauer Wald.

Orchis minor palmata, radice repente, Camerar. ubi opt. icon seu *Orchis repens* H. Eyft. seu *Helleborine sylvatica, radice repente* Ray. falsch Stendel-Wurk, in dunkeln und schattichten Orten, unter den Bäumen, in dem Barrer und Oberehenheimer Wald, *perenn.*

Orchis palmata montana maculata T. sive *Palmata alba* *IB.* 2. 775. vel. *Palma Christi maculata*, *Tab. hist. lc.* 6. 1060. Berghändlein-Wurk, mit weissen Blumen, und gefleckten Blättern, auf Berg-Wiesen, hinter Barr. *perenn.*

Orchis palmata pratensis maculata T. *calcaribus longis, flore purpurascete*, sive *Palmata speciosiore thyrsos, folio maculato* *IB.* 2. 774. *lc.* 5. *Tab. hist. pag.* 1060. Händlein-Wurk, mit gefleckten Blättern, und rothen Blumen, *Satyrion Royal,*

Royal, auf feuchten Wiesen zu Oßwald, und in der Ruprechtsau, *perenn.*

Orchis palmata pratensis maculata flore albo T. *longis cacaribus*, sive *Palma Christi erecta flore candido* H. Eyst. debet esse picta, cum maculis, Händlein-Wurk, mit gefleckten Blättern, und weissen Blumen bey Oßwald. *perenn.*

Orchis palmata pratensis latifolia maculata flore variegato T. sive *Palma Christi erecta, flore variegato*, Hort. Eyst. Händlein Wurk, mit gefleckten Blättern, und bunten Blumen, auf der Nachtweyd zu Ringelsheim, *perenn.*

Orchis bifolia minor calcari oblongo CBP. sive *Orchis alba, calcari longo* IB. 2. 771. Sten- del-Wurkel, mit weissen lang besporten wohlriechenden Blumen, zu Heiligenstein, zu Hangenbiethem. *perenn.*

Papaver erraticum majus T. sive *Papaver erraticum rubrum campestre* IB. 3. 395. *flore puniceo rosaceo, fructu ovato corenato*, rothe Korn oder Klapper-Rosen, Feld-Mag-Saamen, Coquelicoc Ic. 1. Tab. hist. 966. in denen Saamen und Korn-Feldern. *ann.*

Papaver erraticum minus T. Kleiner wilder Mohn, Ic. 2. Tab. hist. 966. auf steinichten und durren Korn-Aeckern, *ann.*

Parietaria vulgaris seu officinar. T. & IB. 2. 976. *flore herbaceo apetalo, folio hirsuto, semine oblongo*, Glas-Kraut, Tag und Nacht-Kraut, *Parietaire* Ic. Tab. hist. 939. an schattichten Orten und zerfallenen Mauern.

Pastinaca latifolia sativa T. *flore luteo rosacea umbellato, radice alba.* Pastenen oder Pestnägel. *Panaïs ou Pastenade* Ic. 1. Tab. hist. 198. in denen Gartners-Feldern, ann.

Pastinaca sylvestris latifolia T. seu *Pastinaca germanica sylvestris* IB. 3. part. 2. 149. *floribus luteis rosaceis foliis latioribus dissectis semine ovato*, sive *Branca Leonina* Tab. hist. Ic. 2. 198. *Pastenade sauvage*, wilde Pastenack, auf denen Wiesen, in der Ruprechtsau, ann.

Pedicularis pratensis purpurea, T. seu *Crista Galli, flore rubro* IB. 3. 437. *flosculis monopetalis personatis, foliis elegantissime dissectis fructu bifario*, rother Hahnen-Kamm, *Pediculaire de prez*, à fleur rouge Ic. Tab. hist. 1180. ♂ Rivin, auf feuchten Wiesen zu Ostwald, perenn.

Pedicularis palustris rubra elatior, Ray. hist. 770. ♂ in Rivin. hoher Wasser, oder Sumpf-Rödel, mit purpurfarben Blumen, cum præced. perenn.

Pedicularis pratensis lutea T. *Crista Galli Fæmina dicta* IB. 3. 436. *Hanen-Kamm, Wiesen-Rödel*, mit gelben Blumen / *Crete de Cocq*, à fleur jaune auf allen Wiesen, ann.

Pedicularis lutea erectior pratensis, calice floris hirsuto T. sive *Crista Galli Mas* IB. 3. 436. *grosser gelber Hahnen-Kamm*, est *Pedicularis lutea* Tab. hist. 1180. auf Wiesen, in dem Ostwinckel.

Pedicularis angustifolia montana T. *foliis oblongis angustis* ♂ *crenatis, floribus pallide luteis*,
Wald

Wald Hahnen-Rödel, im Gebürg hinter
Barr. ann.

Pentaphylloides argenteum alatum, seu *Potentilla* T. sive *Potentilla* vel *Argentina* IB. 2. 398. *quæ* *Anserina officinarum*, *flore simplici*, *rosaceo*, *foliis serratis subtus incanis*, Silber-Blatt, *Argentine*, Gänserich, an denen Wegen, und Landstrassen, Ic. Tab. hist. 342. perenn.

Phalangium parvo flore ramosum T. Ic. IB. 2. 635, *albo liliaceo*, *radice filamentosa*, *fructu subrotundo*, Spinnen-Kraut, Ic. 1. Tab. hist. pag. 557. Gall. *Phalangium*, zu Oswald in denen Hecken, perenn.

Phalangium ampliore flore non ramosum T. seu *pulchrius non ramosum* IB. 2. 635. & Tab. hist. 2. pag. 557. Erdspinnen Kraut, in dem Gansbauer und Lingelsheimer Wald, perenn.

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta T. *Sanguisorba minor* IB. 3. part. 2. 113. Klein Sperber-Kraut, Klein haaricht Wimpernell, Ic. Tab. hist. 316. auf allen Wiesen, perenn. *Petite Pimpernelle*.

Pimpinella sanguisorba minor lævis T. Kleine glatte Wimpernell, prioris est varietas in hortis culta mutatur.

Pinus sylvestris vulgaris Genevensis T. & IB. 1. 253. *coma brevi*, *foliis rudioribus* & *acutioribus*, *strobis apetalis luteis*, *fructu squamoso*, Fichten oder Kienbaum, Ic. 5. Tab. hist. 1345. *Pin sauvage*, in dem Brumbter Wald, perenn.

Pinus sylvestris altera montana T. sive *Pinus*

Sylvestris Mugho, five Crein IB. 1. 246. Alpen
Keinbaum, Ic. Tab. hist. 6. 1345. perenn.

Pisum hortense majus T. flore candido papilion-
neco, fructu rotundo albo, fructu siliquoso, runde
Garten oder Stecken-Erbfen, mit weiser Blütze,
Ic. Fuchs hist. plant. pag. 627. auf denen Gartners-
Feldern, ann.

Pisum hortense majus flore purpureo T. run-
de Garten oder Stecken-Erbfen, mit rothen Blu-
men, *ibid.* ann.

Pisum humile caule firmo T. Kriechende Feld-
Erbfen, auf denen besambten Aeffern, ann.

Pisum filiqua incurva carnosu, seu falcata
Ray hist. 891. Krumme Schoten-Erbfen, *ibid.*
ann.

Pisum arvense fructu viridi T. grüne Feld-
oder Lotharinger Erbfen, auf denen Gartners-
Feldern, ann.

Pisum arvense fructu albo T. weisse Saat-Erb-
fen, Ic. 4. Tab. hist. 883. ann. *ibid.*

*Pisum majus quadratum, fructu cinerei colo-
ris* T. Lob. Ic. 65. grose 4. eckichte Stock Erbfen,
ibid. ann.

Pisum umbellatum T. five *Pisum proliferum*
Tab. hist. 882. Büschel-Erbfen, *Poir à bougets* ann.

Plantago angustifolia major T. floee monopeta-
lo hypocrateriformi quadripartito, radice fibrosa, fru-
ctu ovato Ic. 1. Tab. 4. 1107. Spitz-Wegerich, auf
denen Wiesen, und Keinen der Aeffern, *Plantain*,
à feuilles étroites. perenn.

Plantago latifolia glabra minor T. Fleiner
glatz

glatter Breitwegerich, *lc. 3. Tab. hist. 1107.* auf denen Wiesen, zu Eschbolsheim, *perenn.*

Plantago angustifolia minor T. kleiner Spitzwegerich, *lc. 3. Tab. hist. 1107.* auf sandigen Orten, beym Canal, auf denen Wiesen zu Obwald. *Petit plantain. perenn.*

Plantago latifolia sinuata T. gemeiner Breitwegerich, an allen Wegen, auf den Matten, beym Canal. *lc. 1. Tab. hist. 1107. perenn.*

Plantago latifolia hirsuta minor T. & Haller. 472. kleiner Breitwegerich, mit haarichten Blättern, auf durren steinichten Orten, in der Aussprechtsau. *perenn.*

Plantago trinervia folio angustissimo T. *foliis valde pilosis* Wegerich, mit 3. Rippen, bezeichneten schmahlen Blättern, vor dem Fischerthor, auf dem Glacis, neben einer Mauer, am Rhein Ziegel-Ofen, *perenn.*

Plantago latifolia incana T. Schaf-Zunge, oder Breitwegerich, *lc. 4. Tab. hist. 1107. Plantain à la larges feuilles,* aller Orten, auf denen Wiesen, und an denen Wegen, *perenn.*

Pœonia folio nigricante & splendente T. *flore intense purpureo, simplici rosaceo, foliis latioribus dissectis, radice alba crassa, fructu siliquoso cornuto lanuginoso,* rothe Gicht oder Pfingst-Rosen, *lc. 1. Tab. hist. 1171. Pivoine male,* in Gärten, und in denen Weinbergen.

Pœonia foemina flore pleno rubro majore T. *radice bubosa,* rothe gefüllte Gicht, oder Pfingst-

Rosen, 1c. Tab, hist. 3. 1172. Pivoine à fleur double
ou Pivoine Femelle, perenn. ibid.

Pœonia communis vel Fæmina T. radice bust-
bosa, gemeine Pfingst- oder Gicht-Rosen, 1c. 2.
Tab, hist. 1171, perenn.

Polygonatum latifolium vulgare T. flore albo
simplici monopetalo, campaniformi tubulato diviso, fru-
ctu molli globoso, five Sigillum Salomonis officina-
narum, 1c. 1. Tab. hist. pag. 1136. Seau de Salomon
à larges feuilles, Weiß-Wurzel, in schattichten
Hölzern, zu Holzheim, und Zulkircher Wald.
perenn.

Polygonatum latifolium maximum T. five
Polygonatum latifolium 111. Clus hist. 1. pag. 275.
plus grande Seau de Salomon, groß Weiß-Wurzel,
mit breiten Blättern, in dem Gansbauer Wald,
über dem Krümmeri, gegen Gravenstaden, häufig.
perenn.

Polygonatum latifolium minus, flore majore
T. breit blätterichte Weißwurzel, mit großen
Blumen, auf denen Felsen bey Kappolstein, nahe
bey dem alten Schloß, perenn.

Prunus fativa vulgaris, fructu magno crasso
subacido T. vulgo Prunus damascena, flore ro-
faceo albo, folio oblongo serrato, Pflaumen oder
Quetschen-Baum, Prunier 1c. 1. Tab. hist. 1403.
in Gärten und Weinbergen. perenn.

Populago flore majore T. rosaceo fructu vagi-
nulato, radice fibrosa, Dotterblum, mit großen Blu-
men, 1c. Tab. hist. pag. 1128. an dem Mauerhof, vor
der grünen Wart, am Graben. perenn.

Popu-

Populago flore minore T. seu *Populago minor* *Tab. hist.* 1128. auf der Lingelsheimer Nachtweyde, in sumpffichten Orten, bey dem Mauerhof. *perenn.*

Prunus fructu ovato magno flavescente, flore albo rosaceo T. *Spilling*, *Imperiale jaune*, in Gärten und Neben.

Prunus fructu ovato magno rubente T. *Imperiale rouge*, rothe *Spilling. ibid.*

Prunus fructu ovato maximo T. *Prune de Monsieur*, grose *Spilling* oder *Marruncken. ibid.*

Prunus fructu cerei coloris T. five *Pruncea cerea* *lc. 4. Tab. hist. pag. 1404. Prune de St. Catherine*, gemeine *Spilling. ibid.*

Prunus fructu parvo dulci, atro coeruleo T. five *Pruna damascena*, *Petit damas noir* Pflaumen-Baum, mit kleinen schwarzen Früchten, in allen Gärten.

Prunus fructu parvo præcoci T. five *Avenaria*, *Tabern. hist. 2. 1403. Haber-Schlehen*, in denen Weinbergen.

Pyrus sativa, T. *floribus albis rosaceis*, zahmer Birnbaum, *lc. 1. Tab. hist. 1422. Poirier* in allen, Gärten. *hujus species fere innumerabiles recenset in Institutione rei Herb. Tournef. pag. 628.*

Pyrus sylvestris T. seu *Pyra sylvestria* T. *Poirier sauvage*, wilder Birnbaum, Holzbirn-Baum, *lc. hist. 1425.* an denen Dörffern, und Landstrassen.

Quercus latifolia Mas, quæ brevi pediculo est T. & 1B. 1. 70. & *Tab. hist. 1375. flosculis rubentibus*

amentaceis fructu glanduloso, Eichbaum mit Früchten, an kurzen Stielen, *Chene* in dem Ruprechtsauer und Zulfircher Wald.

Quercus cum longo pediculo T. five *Quercus vulgaris cum longis pediculis*, IB. 1. 70. & *Tab. hist.* 1374. Eichbaum mit Früchten, so an langen Stielen hangen, in allen Wäldern, auf dem Weg gegen Lingelsheim, *perenn.*

Ranunculus aquaticus capillaceus T. five *Ranunculus aquaticus omnino* IB. 3. 781. est *Foeniculum aquaticum*, *Tab. hist.* 3. 187. weisser Hahnen Fuß, mit Stabwurk-Blättern, in stehenden Wasser-Bächen, in der Ruprechtsau, und zu Zulfirch. *perenn.*

Ranunculus aquaticus capillaceus, cum globulis in extremitate foliorum *Mapp. hist. plant. alsatic. pag.* 262. in der Breusch, oberhalb der grünen Wart, *perenn.*

Ranunculus aquaticus folio rotundo & capillaceo T. *flore albo rosaceo*, five *Ranunculus aquatilis albus tenuifolius* IB. 3. 781. *Grenouillette*, invenitur quandoque flore pleno, in einem stillstehenden Wasser, bey der Gansau, Fluß Hahnen Fuß, *1c. Tab. hist. pag.* 119.

Ranunculus aquaticus albus fluitans, *peucedani foliis*. *HLBat. seu Millefolium maratriphyllum fluitans*, IB. 3. 782. *1c. opt. Mapp. hist. pag.* 262. Locf mit Feuchel-Blättern.

Ranunculus aquaticus albus, foliis circinatis tenuissime divisis, floribus ex alis longis pediculis

diculis innixis Pluck. Phyt. Fluß Hahnen Fuß,
mit gar zarten Blättern, bey Molsheim, in den
ausgetretenen Fluß-Wässerlein, *perenn.*

Ranunculus aquaticus flore albo parvo hede
raceo T. *lc.* *IB.* 3. 782. & Lugd. 1031. Wasser
Hahnen-Fuß / mit Epheu-Blättern, zu Mols-
heim, in den Gräben, bey dem Kloster St. Jo-
hann, und in den Gansbauer-Wald. *perenn.*

Ranunculus montanus aconiti folio flore al-
bo majore T. *sive Ranunculus IV.* *Clus hist.* 236.
E³ *lc.* 5. *Tab.* 108. est *Ranunculus* flore albo, al-
pinus major, *IB.* 3. *app.* 861. Wald Hahnen-
Fuß, hinter Muzig, gegen Haslach, an dem
Bach.

Ranunculus montanus folio aconiti, magno
flore *globoso luteo lc.* *Clus hist.* 237. E³ *Tab hist.*
11. 109. Kugel Hahnen-Fuß, auf bergichten
Wiesen bey Wimmenau.

Ranunculus pratensis erectus dulcis T. süe-
ser Hahnen-Fuß, Ancken oder Butter-Blu-
men, auf denen Wiesen, *lc.* 1. *Tab. hist.* 117.
perenn.

Ranunculus pratensis major, radice verti-
cilli modo rotunda T. *acri*, *sive Ranunculus*
bulbosus, *Lob. lc.* 667. E³ *Tab. hist.* 108. Wiesen
Hahnen-Fuß, mit knollichter braunen Wurzel,
auf Matten, zu Osward und Ruprechtsau.

Ranunculus pratensis minor, radice verticilli
modo rotunda T. *sive Ranunculus tuberosus*
major. *IB.* 3. 417. Kleiner Wiesen Hahnen-Fuß,
mit knollichter brennenden Wurzel, St. Antoni-

us Rüblein, auf denen Wiesen, bey allen Lüs-
ten, in der Ruprechtsau an denen Wegen.

Ranunculus pratensis repens hirsutus T. flo-
re luteo simplici *IB.* 3. 479. *dulci* kriechender
harichter Wiesen Hahnen-Fuß / auf allen gras-
sichten Orten, ingleichen auf denen Brach-Fel-
dern. *1c.* 6. *Tab. hist.* 118. *perenn.*

Ranunculus arvensis echinatus T. seu *arvo-
rum* *Lob.* *1c.* 665. 13. & 14. *Tab. hist.* 110. *Acker*
Hahnen-Fuß, *nostratibus* Acker oder Frucht-
Läuse, á *Tabernæmont.* *Ranunculus* *hic dividi-*
tur in latifol. & angustifol. sed est naturæ lusus fast
auf allen Frucht-Aeckern. *ann.*

Raphanus major oblongus T. *cortice albo &*
nigro, *Raifort*, grose schwarze und weise Bauren-
Kettich, vulg. Sprachmeister, in Gärten, und
Garten-Feldern. *ann.*

Raphanus niger, T. gar groser schwarzer
Kettich, Pfand-Kettich, *1c.* *Lob.* 202. *ann. ibid.*

Raphanus major orbicularis vel rotundus
T. *floribus rubellis*, gemeiner Kettich, mit rothe-
lichten Blumen, *1c.* 1. *Tab. hist.* 797. *ibid. ann.*

Idem floribus candidis T. Kettich mit wei-
ßen Blumen, *ibid.*

Raphanus minor oblongus T. *cortice rubro*
& *albo*, frühe oder Monath-Kettich, mit rother
und weiser Rinde: Radisgen, *1c.* *Matth. epit.*
2. 400. *ann.*

Raphanistrum flore albo cruciformi striato,
siliqua articulata glabra minore T. sive *Rapi-*
strum *flore albo striato*, seu *Erucæfolio* *Lob.*
1c.

Ic. 191. Heydrettich, Hederich, auf den Aefchern bey Gemar, ann.

Raphanistrum flore albo striato, filiqua articulata striata minore unicapfulari Moris hist. & IB. 2. 851. ♂ Tab. hist. 800. weiß Hederich, auf denen Aefchern, bey Haußbergen und Züfirch. perenn.

Raphanistrum segetum flore luteo vel pallido cruciformi T. Lampfana flore melino Tab hist. 793. Hederich, wilder Senf, mit schwarzen Körnern, auf allen Frucht-Aefchern. ann.

Rapistrum arvense folio auriculato acuto T. filiqua rotunda floribus albis spicatis five Myagro affinis herba, capitulis rotundis IB. 2. 895. & in utroque Banhin. Rübsen, unter der Frucht, bey Niederhaußbergen. ann.

Rapunculus folio oblongo spica orbiculari T. flore caeruleo monopetalo campaniformi. fructu loculari, Ic. Rivin five Rapunculus flore globoso purpureo IB. 2. 810. Wald-Rapunkel, mit runden Blumen, zu Heiligenstein, auf den Gebürg, auf den Bergmatten hinter Baar. perenn.

Rapunculus spicatus, T. five Alopecuroides, foliis urticae, spica longiore, floribus monopetalis caeruleis, Wald-Rapunkel, Ic. IB. 2. 809. Grand reponce, auf den Gebürg, zu Hochfeld.

Rapunculus spicatus flore saturate violaceo foliis maculis nigris notatis, seu comosus IB. p. 2. 809. Wald-Rapunkel, mit Viol-blauen Blumen, und schwarz gefleckten Blättern, in dem Eckbolsheimer Wald, perenn.

Idem

Idem foliis non maculatis *quod non lusus naturæ est, uterque non mutatur*, Wald Kapungel, mit blauen Blumen, und Blättern ohne Flecken. *perenn.*

Rhamnus T. five Rhamnus catharticus, *flore monopetalo infundibuliformi ex albo virescente, foliis pyri, baccis nigris*, in officinis, Spina Cervina seu infectoria, Kreuzbeeren-Baum, Färberbeer-Baum, Ic. Tab. hist. 1. pag. 1489. bey Züllich und Lingsheim. *perenn.*

Rosa sylvestris vulgaris *flore odorato incarnato, folio glabro T. fructu rubro rotundo oblongo*, wilde Feld oder Hecken-Rosen, mit rothlichten Blumen, Eglantier Ic. Tab. hist. pag. 1495. *perenn.* an denen Strassen.

Rosa sylvestris odorata, *flore candido T.* wilde weisse Hecken-Rosen, *ibid.*

Rosa sylvestris repens alba T. *floribus in umbellam congestis*, Haber-Rose, an dem Weg nach Oßwald, *perenn.*

Rosa sylvestris, *flore majore & rubente T. five Rosa sylvestris flore rubro Hort. Eyst. grose Büeten-Rosen, nostratibus, Essig-Rosen, in Gärten, und zu Haugbergen, Rose rouge ou Roses des Provins, perenn.*

Rosa campestris, spinosissima *flore albo odoro T. foliis rotundis dense dispositis*, quæ Rosa præcox spinosa *flore albo Hort. Eyst. seu Rosa pumila spinosissima foliis pimpinellæ glabris, flore albo, IB. 2. 40. weisse Rosen, mit Pimpernell-Blättern, in dem Eckbolsheimer Wald/*

Wald, bey den Wiesen, neben den Aickern gegen Oßwald. *perenn.*

Rosa sylvestris pomifera major T. five *Rosa pomo spinoso folio hirsuto*, *IB.* 2. 38. Wilde Rosen, mit stechender grossen Frucht, auf dem Gebürg, zu Niedeck. *perenn.*

Rosa rubra simplex T. *IB.* 2. 34. seu *Damascena* *Lob.* *lc.* 206. gemeine Garten-Rosen, mit einfachen Blättern, *perenn.*

Rosa rubra multiplex T. gefülte Garten-Rosen, mit rothen Blumen, *Tab. hist.* 2. 1493.

Rosa purpurea T. seu *Provincialis major* *Tab. hist.* 3. 1494. seu *Rosa rubello flore majore multiplicato* *IB.* 2. 36. grose gefülte Provinz-Rosen. *perenn.*

Eadem flore simplici.

Rosa maxima multiplex T. seu *Hollandica rubella plena*, seu *Centifolia*, *IB.* 2. 37. die grösste gefülte Holländische Rose. *perenn.*

Rosa alba vulgaris major T. seu *Rosa alba*, *Tab. hist. flore semipleno*, weisse Garten Rosen.

Rosa flore albo pleno T. *lc.* *Hort Eyst. & Tab. hist. pag.* 1493. weisse gefülte Rosen. *perenn.*

Rosa lutea multiplex T. *IB.* 2. 48. seu *Rosa flava plena*, *Clus hist. pag.* 114. gelbe gefülte Rosen. *perenn.*

Rubus Idæus spinosus T. *flore albo rosaceo rubro globoso*, *odoro* *IB.* 2. 59. & in *Matthiol. epit.* 357. Holbeer, Himbeer-Staude, mit rother wohlriechender Frucht, in denen bergichten Büschen, bey Barr. Frambosier, *perenn.*

Rubus

Rubus Idæus spinosus fructu albo T. Hohlbeer-Staude, mit weißer Frucht, hin und wieder in Gärten, in dem Hochgräflichen Leiningerischen Garten. *perenn.*

Rubus repens fructu cæsius T. *cæruleo* sive Rubus minor, fructu *cæruleo* IB. 2. 59. Klein Frieschende Kragbeer, oder Brombeer Staude, neben denen Aeftern, und Gräben gegen Ostwald, vor dem Illkircher Wald. *perenn.*

Rubus vulgaris fructu nigro T. *albo rosaceo* sive Rubus major IB. 2. 57. Ic. Tab. hist. pag. 1297. *perenn.* Ronce, Krag- oder Brombeer-Staude, mit weißer Blüthe, in dem Eckbolsheimer Wald.

Rubus vulgaris fructu nigro, flore purpurascente nostr. Brombeer-Staude, mit rother Blüthe. *ibid.*

Prior species non raro occurrit. etiam flore pleno, foliis laciniatis.

Ruta hortensis latifolia T. floribus luteis rosaceis, foliis saturate viridibus graveolentibus, fructu tetragono, Garten-Raute, Rue Ic. 1. Tab. hist. 387. *perenn.*

Salix humilis angustifolia T. seu repens, ante folia, julos ferens suaveolentes. Girrl. Weyde, Ic. IB. 1. 214. & Lobel. Ic. 173. an der Zuhausig, hæc prima inter salices floret. *perenn.*

Sambucus humilis, sive Ebulus officinarum T. sive Sambucus herbacea IB. 1. 546. flore albo rosaceo multifido, fructu racemoso globoso. Attich, niedriger Hollunder, Ic. Tab. hist. 1160. *Veble*

zu Bischofsheim und Hühnheim, am Weg. *perenn.*

Sambucus fructu in umbella nigro T. flore albo monopetalo rotato Hollunder-Staude, Holders Baum, mit schwarzen Beeren, *Sureau* Ic. 1. Tab. hist. 1440. aller Orten, in Hägen und Hecken, bey der Catharinen-Brücke, bey dem Sande-Platz. *perenn.*

Sambucus fructu in umbella viridi T. five Sambucus fructu albo Lob. Ic. 162. Holders baum, mit weissen Beeren, in der Stadt, in Gärten, in den Hecken, bey dem Rhein = Giesen. *perenn.*

Sanicula officinarum T. five Sanicala Mas Fuchs IB. 3. 639. *flore rosaceo, umbellato sub viridi* Sanickel, *Sanicle*, Ic. Tab. hist. 1. 244. & in Rivin. in Hölzern zu Obwald, und Gansbauer Wald. *perenn.*

Satureja fativa T. five hortensis flore galeato purpurascente monopetalo, Saturey, Bohnen-Kraut, Ic. 1. Tab. hist. pag. 744. *Sarriette*, aller Orten in Gärten, *ann.*

Scabiosa pratensis hirsuta, quæ officinarum T. flore ex cœruleo purpurascente composito, folio laciniato, Apostem-Kraut, blaue Scabiosen, *Scabieuse vulgaire*, Ic. 6. Tab. hist. 442. auf allen Wiesen. *perenn.*

Scabiosa major, flore ex cœruleo purpurea T. Ic. 2. Tab. hist. 441. grose purpurblaue Scabiosen, neben dem Canal, auf denen Wiesen zu Singelsheim, bey der Capell, *perenn.*

Scabiosa

Scabiosa montana latifolia non laciniata rubra & prima T. five Pannonica purpureo flore IV. Clus hist. 11. *breitblättrichte rotthe Berg-Scabiosen*, Ic. Tab. hist. 7. 442. auf dem Gebürg, hinter Baar. *perenn.*

Scandix vulgaris, semine rostrato T. flore rosaceo albo, five Pecten veneris IB. 3. part. 2. pag. 71. & in Rivin. Nadelkörfel, *Peigne de Venus*, in denen Frucht-Feldern, fast aller Orten, Ic. 1. Tab. hist. 288. *ann.*

Scirpus palustris altissimus T. five Iuncus altissimus seu maximus Hololchænos IB. 2. § 22. *caule meduloso floribus apetalis flamineis, semine triangulari*, grosse Weyher- & Bingen, Ic. Tab. hist. 565. in stillstehenden Wasser-Graben, vor dem Fischer-Thor. *perenn.*

Sclarea pratensis, foliis ferratis, flore cœruleo T. five Sclarea sylvestris flore magno cœruleo IB. 3. 11. *monopetalo labiato, semine subrotundo*, wilder Scharlach, Ic. 4. Tab. hist. pag. 705. & in Rivin. *sub nomine*, Hormin. pratense, *Toute bonne*, auf denen Wiesen, auf allen Contrescarpes. *perenn.*

Variat quandoque vel flore rubente vel albo.

Sclarea major, foliis in profundas lacinias incisus T. five Gallitricum sylvestre, coma virescente IB. 3. 312. quæ Hormini sylvestris IV. prima species Clus. hist. XXX. Scharlach, mit tief eingesechnittenen Blättern, auf dem Glacis, vor dem Spithal-Thor, auf den Wiesen zu Obwald und Gravenstaven. *perenn.*

Senecio minor vulgaris T. five Senecio vulgaris Erigeron IB. 2. 1041. *flore composito luteo flosculoso papposo, semine papposo* Ic. 1. Tab. hist. pag. 462. *Senecion*, Creukel oder Canarien-Kraut, in allen Gärten und Feldern. *ann.*

Sideritis foliis hirsutis, profunde crenatis T. *flore monopetalo ochroleuco labiato, semine oblongo*, Reißgen-Kraut, Beruf oder Glied-Kraut, Crapaudine Ic. 5. Tab. hist. 370. & Rivin, neben denen Landstrassen, an der Klamme zu Achenheim. *perenn.*

Sinapi rapifolio T. *flore subluteo cruciformi, siliqua latiuscula glabra, semine rufo*, Ic. 1. Tab. hist. 838. Wilder Senf, mit braunrothen Samen, zu Gundershofen, neben den Aeffern, *Moutarde sauvage. ann.*

Sisymbrium aquaticum T. *supinum pumilum, flore albo simplici cruciformi, siliqua bipartita* five Nasturtium aquaticum IB. 4. 884. Brunnen oder Wasser-Kresse, *Cresson d'eau ou de fontaine*, Ic. 1. Tab. hist. pag. 846. in fließenden Wasser-Bächlein, auf dem Wackel, in Gräben. *perenn.*

Sisymbrium Erucæ folio glabro, flore luteo T. five Eruca latifolia Barbarea dicta IB. 2. 862. & Tab. hist. Ic. 1. 843. Barbarea minor Boerhav. *Herbe de St. Barbe*, an denen Gräben, und andern feuchten Orten. *perenn.*

Sisymbrium aquaticum raphani folio, siliqua brevior T. five Rapistrum aquaticum, Tab. hist. 1. 792. Wasser-Kresse, oder Hederich,

in stillstehenden Wasser-Gräben, in der Kuprechtsau, Raifort sauvage, perenn.

Sisymbrium aquaticum, foliis in profundas lacinias divisis, siliqua brevior, T. flore luteo *cruciformi* seu *Raphanus aquaticus* Tab. hist. 3. 797. Wasser-Kettich, mit tief eingeschnittenen Blättern, vor dem Fischer-Thor, unten an dem Glacis, an der Ill, oberhalb der grossen Schliesse, perenn.

Sisymbrium palustre repens nasturtii foliis T. five *Eruca palustris minor*. Tab. hist. 2. 836. *Roquette sauvage*, kleine Wasser-Kraut, aller Orten in feuchtem Grunde, neben, und an denen Wasser-Flüssen. perenn.

Smilax unifolia humillima T. five *Unifolium* vel *Ophris unifolia* IB, 3. 534. flore monopetalo albicante rosaceo, folio nervoso cordato, fructu molli subrotundo, Ein Blatt, potius Herz oder 2. Blatt, Ic. Tab. hist. 1134. in denen Hecken, zu Oskwald, im Ostwinckel, auf dem Gebürg, hinter Barr. perenn.

Solanum scandens T. five *Dulcamara* vel *Amara dulcis Glycypicros*, IB. 2. 109. floribus rosaceis graveolentibus monopetalis caeruleis rotatis, baccis rubris, Hunds-Kraut, Ic. Tab. hist. 1290. an denen Wasser gestaden, gegen der grünen Wart, und auf der Gallen-Matt.

Staphylodendron Matthioli T. five *Pistacia sylvestris*, flore albo rosaceo racemo oblongo pendente, foliis fraxini, fructu vesiculari, Pimpernüsslein-Baum, hin und wieder in der Kuprechtsau, in dem

dem Gansbauer, und Züllicher-Wald. Ic. Tab. hist. 1430. *Nez coupez ou Pistachier sauvage. perenn.*

Stellaria aquatica Vaill. 190. & Lobel. Ic. 792. five *Foeniculum stellatum* Tab. hist. 6. 187. *oblongis flosculis dipetalis albis, ex foliorum alis prodeuntibus*, auf der Wiese, beym Rhein Ziegel-Ofen, zu Eckbolsheim in dem Wald, in sumpfigen Orten. *perenn.*

Stellaria minor & repens & fluitans, nostr. seu *Alsine fluviatilis* Tab. hist. Ic. 10. pag. 1090. in feuchten Gruben, bey dem Eckbolsheimer Ziegel-Ofen, neben dem Seiler-Bahn, vor dem weissen Thurn. *perenn.*

Stramonium fructu spinoso, flore albo simplici T. *monopetalo infundibuliformi*, five *Pomum spinosum* IB. 3. 624. Stech-Aepfel, *Pomme Epineuse*, vor dem Metzger-Thor, linker Hand, ohnweit dem Wirthshaus zum rothen Ochsen häufig. *perenn.*

Symphytum majus vulgare T. five *Consolida major, flore purpureo monopetalo infundibuliformi, foliis oblongis hirsutis, radice crassa nigra, semine polito*, Schwarz oder Schmeer-Wurk, Wallwurk, Ic. 2. Tab. hist. 949. est *Consolida Rivin. Grande Consoude ou Oreille d'ane*, auf allen feuchten Wiesen. *perenn.*

Synaphytum majus, five Consolida major flore purpureo coeruleo T. *quæ Mas est Symphytum magnum* IB. 3. 593. Wallwurkel, mit purpur farben Blumen. *ibid.*

Symphytum majus, flore albo, quæ fæmina
T. Wallwurzel, mit weissen Blumen. *ibid.*

Syringa alba five Philadelphus Athenæi T.
flore albo rosaceo, fructu turbinato, wilder Jasmin, Ic.
Tab. 1. hist. 1457. in der Ruprechtsau, in denen
Hägen und alhier in vielen Gärten. *perenn.*

Tamnus racemosa T. *flore minore luteo pallescente monopetalo campaniformi, fructu ovato* five
Bryonia nigra seu lævis racemosa scandens,
foliis cordatis splendentibus quæ sylvestris est
Lob. Ic. 625. & Tab. hist. 1. 1288. *carot clavicularis, hinc non ad Bryoniam pertinet, est Vitis nigra* Matthiol, schwarze Stick Wurzel, falsche
Mechoacana, Bryone noire, ou faux Mechoacanne.

Thlaspi vulgatus T. & IB. 2. 921. five Thlaspi
Vaccariæ folio incano majus, flore albo
cruciformi, *fructu subrotundo plano*, quod Thlaspi
majus est Tabern. hist. 2. 849. gemeiner wil-
der Bauren-Senf, grose Hirten-Tasche, *Moutarde sauvage*, auf denen Ackeren, und in denen
Weinbergen. *ann.*

Thlaspi arvense filiquis latis T. IB. 2. 923.
seu Thlaspi majus Tab. hist. 1. 849. breit Tä-
schel-Kraut, Bauren-Senf, mit breiten Ta-
schen, auf denen Feldern, und Gartners Ae-
ckern. *ann.*

Thlaspi umbellatum arvense amarum IB. 2.
925. Iberidis folio, Tab. hist. 10. 851. bitter
Bauren-Senf, zu Holzheim, auf denen Aecke-
ren, bey der Capell, auf dem Ottilien-Berg,
Rotunda genannt, *ann.*

Thymus

Thymus vulgaris folio latiore T. flore monopetalo labiato candicante. Thymian, nostratibus Rummig, Ic. in Rivin & Tab. hist. 2. 742. in Gärten, ann.

Tilia foemina folio majore T. flore rosaceo luteolo, fructu unicapsulari Linden-Baum, mit breiten Blättern, Ic. 2. Tab. hist. 1396. auf denen Wällen der Stadt, auf der Promenade in der Stadt, und in der Ruprechtsau. *perenn.*

Tilia foemina, folio minore T. & IB. 1. 137. sive Tilia sylvestris foliis Ulmi, wilder Linden-Baum, mit kleinen Blättern, Ic. 1. Tab. hist. 1396. cum præced. perenn.

Tithymalus latifolius cataputia dictus T. floribus monopetalis campaniformibus, fructu trigono sive Esula major Rivini vel Lathyrus sive Cataputia minor IB. 3. 880 Spring- oder Treib-Körner, hin und wieder in Gärten. *ann.*

Tithymalus characias folio lanuginoso T. sive Tithymalus Clus. 11. hist. CLXXXVIII. in der Ruprechtsau, gegen dem Rhein zu. perenn.

Tithymalus sylvaticus lunato flore T. folia toto anno retinens, immer grünende Wolfs-Milch, Ic. Optim Garidel. hist. plant. Tab. 102. & IB. 3. 671: in dem Oberehenheimer Wald.

Tragopogon pratense luteum majus T. flore semi flosculofo fructu papposo, Scorzonere de prez, Ic. 1. Tab. hist. 994. gelber Bock's Bart, auf denen Matten zu Oßwald, und auf der Contrescarpe, vor dem weissen Thurn. ann.

Tragopogen pratense luteum minus Moris.
H. R. Bles. & T. Kleiner Bocks-Bart, auf denen
Wiesen, in der Ruprechtsau, ann.

Tragoselinum majus umbella candida T. si-
ve Pimpinella saxifraga major hircina IB. 3.
part. 2. 109. *umbella candida, floribus albis rosace-*
is, fructu oblongo striato. Steinbocks Pimpernell.
est Pimpinella Rivin. Ic. 1. Tab. hist. 255. *gran-*
de Boucage, zu Osward. perenn.

Tragoselinum minus T. five Saxifraga hir-
cina minima, Pimpinella crispa Tragi IB. 3.
part. 2. 113. five Pimpinella saxifraga minor,
foliis crispis albis rosaceis umbellatis, Krauß Bocks-
Peterlein, Ic. 2. Tab. hist. pag. 255. *petite bou-*
cage, auf durren Orten, in der Klamm, zu U-
chenheim, und Mittelhaufbergheim, auf der
Gansau. perenn.

Trifolium pratense luteum, capitulo Lupu-
li, seu Agrarium, T. aut Lupulinum Rivini, *flo-*
re luteo papilionaceo majore, groser gelber Feld
oder Wiesen-Alee, auf der Wiesen, zwischen
dem Canal, und Eckbolsheimer Wald. ann.

Trifolium pratense luteum, capitulo bre-
vior, foliis meliloti, *nostr.* est Trifolium pra-
tense luteum Fuchs, vel Trifolium pratense
luteum femina, flore pulchrior, seu Lupulino,
IB. 2. 381. Kleiner Wiesen oder Hopfen-Alee, ann.

Trifolium montanum purpureum majus T.
seu 11. Clus hist. CCXLV. groser Berg-Alee,
mit rothen Blumen / Ic. IB. 2. 375. & in Rivin.
auf dem Gebürg, gegen hohen Andlau, *perenn.*

Tri-

Trifolium montanum album T. sive *Trifolium majus* Clus. hist. CCXLV. est *Angustifolium* Rivin. großer Berg-Klee / mit weissen Blumen, zu Obwald in denen Hecken, auf dem Gebürg zu Barr, *perenn.*

Trifolium pratense album T. *foliis oblongis imis cordatis* Ic. 1. Tab. hist. 907. & in Rivin. gemeiner blättrichter Wiesen Klee, *Trefle des prez à fleurs blanches.* auf allen grasichten Orten und Wiesen, *perenn.*

Trifolium pratense flore albo minus, & semine glabrum T. *foliis subrotundis maculatis floribus suaveolentibus*, & IB. 2. 280. wohlriechender Wiesen-Klee, auf der Mezgerau und Schießrein. *perenn.*

Trifolium pratense album inodorum, folio subrotundo non maculato, *nostr.* Fleiner weisser Weg-Klee, ohne Geruch, und ohne gefleckte Blätter. *ibid. perenn.*

Trifolium pratense purpureum T. Ic. sive *Trifolium purpureum vulgare* IB. 2. 374. Tab. hist. 2. 908. & in Rivin. brauner Wiesen-Klee, *Trefle à fleur rouge*, *perenn.*

Trifolium spica subrotundo rubra T. sive *Lagopus maximus* IB. 2. 376. großer Hasen-Klee, *Pied de Lievre*, bey dem Gansbauer Wald. *perenn.*

Trifolium majus purpureum, foliis longioribus & angustioribus, spica longa rubicundiore, Ray. synopsis, großer Wiesen-Klee, mit langen sattrothen Blumen, *Espercette.* bey der Tack-Mühl, auf dem Schießrein.

Turritis T. flore cruciformi, fructu siliquoso, *℞. Lobel. Ic. 220. feu Turritis vulgatioꝛ*, *IB. 2. 836. ℞. Tab. hist. 849. Thurn-Kraut*, in der Ruprechtsau, in dem XV. Wöꝛt am Rhein, auf dem Gebüꝛg bey Wassenburg, hinter Oberbronn. *perenn.*

Turritis minor T. Bot. Monsp. five Barbarea muralis IB. 2. 869. Kleiner Mauer oder Berg-Kresse, auf steinichten Fleckern, unten am Hochgebüꝛg, Hochfelden, *ann.*

Turritis petræa feu Saxatilis, foliis imis hirsutis asperis ac sinuatis, per humum sparsis, flosculis cruciformibus ex pallide cœruleo albicantibus, *Stein oder Mauer Leucojen Ic. opt. vid. Tournef. Alsat. pag. 132. an der Mauer, einer verwüsten Capell, auf dem Gebüꝛg St. Ottiliæ, ingleichen auf dem alten Berg-Schloß, Wassenburg zu Oberbronn. perenn.*

Typha palustris major T. floribus apetalis exiguis, folio triangulo, grose Liesch oder Narren Kolben, Ic. Tab. hist. 558. grande Masse in allen Gräben der Stadt, perenn.

Typha palustris minor T. IB. 2. 540. Klein Narren oder Rohr-Kolben, Ic. 2. Tab. hist. 559. in dem XV. Wöꝛt, an der grossen Rheinbruck.

Typha palustris clava gracili T. feu media IB 2. 540. lange schmähle Narren oder Wasser-Kolben, neben dem Canal, bey der ersten Schliese, in der Tieffe, perenn.

Veronica Mas supina & vulgatissima T. five Veronica vulgatioꝛ folio rotundiore IB. 3. 282. est Veronica officinarum serpens, folio rotun-

rotundiore ferrato, flore monopetalo dilute cæruleo rotato fructu membranaceo, Veronique mâle Ic. 1. Tab. hist. 772. gemeiner Ehrenpreis, Männlein, in Wäldern, und andern hecchten Dertern, auf der Schlut, bey allen Rüsten, in dem Brumbter Wald. perenn.

Veronica spicata minor T. seu recta minor IB. 3. 282. vel recta minima, Clus. hist. 347. Ic. Tab. hist. 6. 773. Fleiner aufrechtstehender Ehrenpreis, auf durren Wiesen, gegen Oßwald, auf der Mezgerau. perenn.

Veronica pratensis serpillifolia T. quæ repens minima Rivini, seu Betonica Pauli serpillifolia IB. 3. 285. flore ex purpureo candido monopetalo rotato, Flein Wiesen Ehrenpreis, Fleiner Ehrenpreis Weiblein, Ic. 2. & Tab. hist. 773. perenn.

Veronica minor, foliis imis rotundioribus T. five Chamædrys, spuria minor rotundifolia latifolia IB. 3. 286. quod Teucrium pratense supinum & spurium chamædryoides Lob. Ic. 490. falsch Wiesen Gamenderlein, wilder Ehrenpreis, mit runden Blättern, vor dem Mezger Thor, auf feuchten Wiesen, am Weg, nach der Spital-Mühl, an dem Weg nach der Schleif-Mühl. perenn.

Veronica supina Teucris facie T. & Lobel. Ic. 473. five Chamædrys spuria angustifolia IB. 3. 285. wilder Ehrenpreis, mit schmahlen Blättern, Ic. 2. Tab. hist. 771. auf der Mezgerau, in der Ruprechtsau, auf der Elisabethen oder Elsbetten Wall. perenn.

Veronica major frutescens, five *Teucrium* IV. Clus. hist. 349. großer wilder Ehrenpreis, mit breiten Blättern, est *Veronica montana* Rivin. auf denen Berglein, bey Niederhauffberg, neben denen Fleckern, zwischen Brumbt und Hagenau. *perenn.*

Viburnum T. five Lantana IB. 1. 557. *flore albo monopetalo rotato, foliis crassioribus incanis parumper serratis, fructu globoso molli*, *Vierne* Ic. Tab. hist. 1. 461. Kleiner Mehl oder Schlingbaum, auf dem Haulenberg, zu Illkirch in dem Wald, zu Oßwald, *perenn.*

Vicia sativa vulgaris semine nigro T. five angustifolia Rivin. *flore purpureo papilionaceo, fructu siliquoso*, Feld oder Vogel-Wicke, Tauben-Wicke, auf denen Frucht-Fleckern, *ann.*

Vicia sativa vulgaris alba T. Vogel-Wicke, mit weissen Körnern, *ibid. ann.*

Vicia maxima dumetorum T. five Cracca major Tab. hist. Ic. 2. 892. quæ *Vicia sepium* Rivin. *Vesse sauvage*, grose Wald-Wicke, Zaun-Wicke, in allen grasichten Büschen und Orten, *ann.*

Vicia multiflora T. five perennis, cœruleo spicato flore, est *Aracus* Tab. hist. 891. feu *Cracca* Rivin. *Vogel-Wicke*, mit vielen Blumen, von satt blauer Farbe. *perenn.*

Vicia segetum cum T. singularibus siliquis glabris brevibus, *Cracca minor siliquis gemellis*, Flor. Jen. kleine Wicke, mit glatten Schoten, auf denen Feldern, bey Ober und Niederhauffbergen, *ann.* *Vicia*

Vicia segetum, cum filiquis plurimis hirsutis T. & IB. 2. 315. *flosculis ex albo purpureis semine maculato* quæ Cracca minor Rivin Ic. 3. Tab. hist. kleine Feld-Wicke, mit vielen rauchen Schotten, unter dem Getreide bey Züllich. ann. Vesseron.

Vicia segetum singularibus filiquis glabris T. Wicke, mit einzeln blauen Blümlein und Schoten, an den Pulver-Magezin, zwischen dem Steinstrasser und Cronenburger Wall, auf denen Fleckern, zwischen Lingsheim und Ensisheim, ann.

Viola martia arborescens purpurea T. *flore polypetalo anomalo*, sive lacea tricolor surrectis caulibus, arborea quibusdam dicta IB. 3. 547. blasse blaue Berg-Violen, Ic. Tab. hist. 681. & Garidel Hist. plant. Tab. 99. in dem Gebürg, bey hohen Andlau, in dem Gansbauer Wald, perenn.

Vitis Idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante molli, flore albo monopetalo campaniformi pendulo, sive *Vitis Idæa angulosa* IB. 1. 520. vel Myrtillus, Tab. hist. 1487. est Vaccinium Rivin Heidelbeer-Staude, mit schwarzer Frucht, Myrtile auf dem Barren Gebürg, perenn.

Vitis Idea foliis oblongis crenatis, fructu albo Mapp. hist. 334. weisse Heidelbeeren Staude, auf dem Gebürg gegen Wangenburg, und zu Niedeck, oberhalb dem Berg-Schloß. perenn.

Vitis Idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris, T. sive *Vitis Idæa semper virens, fructu rubro* IB. 1. 522. Vaccinia rubra Lobel.

Ic.

lc. tom. 2. 109. Steinbeer oder rothe Preiselbeeren, auf dem Ottilien Berg, auf dem Hochgebürg Hochfelden häufig, Cousines rouges. perenn.

MENSIS JUNIUS ET JULIUS.

Acetosa rotundifolia hortensis T. repens folio succulento pallide virente, floribus apetalis flammis semine triangulari Ic. 3. Tab. hist. 826. Gartens Ampfer, Ozeille ronde, perenn.

Acetosa rotundifolia alpina T. fol. asari rund blättrichter Berg Ampfer, an denen Felsen und Steinrißen, bey der schwarzen See, oberhalb Peris. perenn.

Acetosa lanceolata elatior, angustifolia Moris hist. Oxon. part. 2. 583. ubi Icon. auf dem St. Ottilien Berg, auf dem Gebürg zu Wassenburg, perenn.

Aconitum lycoctonum luteum T. flore polypetalo anomalo sive Napellus flore luteo anomalo Ic. in Rivin & in H. Eyst. gelbe Narren-Kappen, oder Eisenhütlein, Gift-Kraut, Tue Loup. ou, Aconite à fleur jaune, in dem Münster-Thal, in dessen feuchten Thälern, an dem Felsen, bey Besort.

Agaricus intybaceus T. sive Fungus fimbriatus, & pulchre cristatus edulis nostr. est Fungus intybaceus IB. 3. 839. Eich-Schwamm, Fette Henne, in dunkelen Eich-Wäldern, unten an denen Stämmen.

Agari-

p. 109.

Tab. IV.

Alcea fol.

rotund. laciniat.



J. Striedbeck sculp.

Agaricus varii coloris squamosus T. sive Fungus ceraforum imbricatum alter alteri innatus variegatus, CBp. Ic. Clus hist. gen. V. pernicios. fungor. CCLXXVII. Kirschen-Schwamm, mit mancherley Farben, an denen alten Kirschbäumen.

Agaricus fraxineus niger, durus orbicularis T. Eschen-Schwamm, an alten Esch-Stämmen, und auch Eichbäumen, in dem Zulkircher und Gansbauer-Wald.

Agrimonia officinarum T. Agrimonia seu Eupatorium IB. 2. 398. *flosculis luteis rosaceis spicatis, radice nigra, fructu hirsuto oblongo echinato, caule hirsuto, folio serrato fisso*, Odermennig, Aigremoine Ic. Tab. hist. 330. in denen Hecken, aller Orten, perenn.

Alcea majore & procerior T. ☞ Ray hist. 605. *flore monopetalo campaniformi rosaceo foliis dissectis*, hoch aufgeschossen Sigmars-Kraut, hin und wieder an denen Rändern der Wälder, in den Ganssauer Wald, am Wasser. perenn.

Alcea vulgaris major T. seu Alcea vulgaris IB. 2. 953. Sigmars-Kraut, Fellsiß, *Alcée ou Mauve sauvage* Ic. I. Tab. hist. 1155. in der Ruprechtsau, vor dem weissen Thurn, auf der Contresarpe, perenn.

Alcea foliis rotundis laciniatis T. sive Malva vulgaris erecta, foliis imis rotundioribus parum crenatis, superioribus profunde dissectis nob. quæ Alcea fruticans HEyft. Ic. vid. Tab. nostr. IV. Fellsiß, dessen unterste Blätter rund sind, in dem Zulkir-

Zulfircher Wald, und auf der Contrescarpe am weissen Thurn, *perenn.*

Alchimilla vulgaris T. *Pes Leonis* sive *Alchimilla* *IB.* 2. 598. *folio rotundo crenato, floribus subluteis apetalis hirsutis verticillatis*, *Sinau*, unser lieben Frauen Mantel, *1c. Tab. hist. pag. 249.* auf denen Wiesen, bey Osward, auf dem Hau- len Berg. *perenn.*

Alchimilla supina *gramineo folio, flore minore* T. sive *Polygonum minus* *111. Dodon.* aut *tenuifolium* *IB.* 3. 377. *Polygonum minus polycarpum*, *Tab. hist. 1c. 5. 1215.* *Johannis Blut*, mit grünen Blümlein, auf durren Aeckern häufig, zwischen der Frucht, *ann.*

Alga fontalis trichodes, vel Trichomanes aquaticum *Lugdunens. 1023.* est *Muscus longissimus aquaticus capillaceo folio* T. im Rheingiesen, in denen Quellwässerlein, *quo jure vero Tournefort hanc algam Muscis admiscuerit, pariter cum Rupp. in flora Ienensi non capimus, quem & sequutus est Do. Mappus in sua hist. pag. 203. qui tamen hanc, plantam duplici nomine insignitus est, vid. ejus pag. 12.*

Alga viridis capillaceo folio T. sive *Conser- va* *Plin. Lob. 1c. 257.* est *Alga vulgatissima & longissima* *Rupp. flor. Ien. 308.* Moß-Gras, Wasser-Gras, in allen stillstehenden Pfudeln, und andern Wasserbachen.

Alga tenuioribus filamentis & instar capillarium vasorum divisis segmentis *Rupp Flor. Ien. 408.* sive *Trichomanes aquaticum* *Dalechamp.*

in

in denen Gräben, gegen der Pulver-Mühl, hinter dem Becken-Wäldlein, wie auch in dem Rheingiesen.

Alga bombycina CBp. & Prodr. 155. seu *Conserva reticulata* Dillen 199. Kasten oder Brunnen-Moos, in stillstehenden Wasser-Bfüßen, an denen Brunnenstein.

Allium montanum angustioribus foliis, caule maculato T. *flore albo liliaceo caule maculato radice cepacea oblonga capillosa* & Hort. Eyst. 1c. *Tab. hist. 875. five Victoralis longa* Clus. 189. Allermans Harnisch, Berg oder Schlangen-Knoblauch / mit schmahlen Blättern, bey der Seegmühl, hinter Otterott, in denen Hagen, an dem Weg, oberhalb Mittelbergen. *perenn.*

Allium montanum capite rotundo T. *Allium sphærocephalum purpureum sylvestre* IB. 2. 562. *Allium seu Moly montanum* V. Clus. hist. 193. *Ail sauvage*, Berg-Knoblauch, in denen Feldern, bey Ofwald, hinter dem Bruckhof, bey dem Gartners Aeftern. *perenn.*

Alfine plantaginis fol. IB. 3. 363. & *Chabraei* 450. *floribus rosaceis albis, fructu subrotundo*, zu Baar, an denen alten Weiden-Bäumen, zu Oberbronn in feuchten Orten des Bergs.

Alfine altissima nemorum T. *seu major.* IB. 3. 362. *repens perennis floribus rosaceis amplioribus albis*, groß Vogel-Kraut, groser Wald Hünersdarm 1c. 2. *Tab. hist. 1086.* in feuchten Hecken und Büschen, an dem Eckbolsheimer Wald, am Canal. *perenn.*

Alfine

Alfine aquatica media T. five *longifolia*, uliginosis locis proveniens, quæ Fontana est *Tab. hist. Ic. 8. pag. 1089.* Brunnen Vogel-Kraut, Meyerich, zu Oberbronn, unter denen Bäumen / im Gebürg, wo das Wasser immerzu abläuft. *perenn.*

Alfine hyperici folio Vaill. Hünerdarm, mit dem St. Johannis-Kraut Blatt, auf dem Paßberg, zu Buchsweiler, und Oberbronner Gebürg. *perenn.*

Duas has species Dn. Mappus pag. 16. & Dn. Dr. Haller, pag. 385. cum Vaillantio conjunxit, cum tamen foliorum ratione, quam maxime interse differunt, quasque etiam pro diversis, speciebus Tournefort in Inst. RH. 242. & 243. recenset.

Alfine spergulæ facie minima seminibus nudis T. auf kleinen Hügeln bey Gemar.

Alfine minor multicaulis T. five *Alfine minima* *IB. 3. 364. Ic. Tab. hist. 4. pag. 1087.* Kleiner Hünerdarm, mit vielen Stengeln, auf sandigen Boden aller Orten, *ann.*

Alfine minor capitulis lini CB. & Boerhav. five *Petræa minima* *Tab. hist. Ic. 3. 1088.* Klein Stein-Vogel-Kraut, auf steinigten Fleckern, zwischen denen Steinrihten, auf der Mauer am Graben, zwischen dem Steinstrasser und Spirer Thor. *ann.*

Alfine spergulæ facie minor, five Spergula minor, flosculo sub cæruleo T. *rosaceo foliis tenuissimis, circa geniculum positis* seu *Spergula purpurea* *IB. 3. 722. Ic. Tournef. alsat. Tab. IV.* Klein Spergel-Kraut, mit blaulichten Blumen, auf der

der Insul, wo die Preusch in die Zu fällt.
ann.

Alpine saxatilis & multiflora capillaceo fol.
T. quæ *Auricula muris*, pulchro flore, folio tenuissimo *IB. 3. 360. Ic. elegans Vaill. Tab. 2. fig. 3.* zwischen denen Rissen der Felsen, des Männleins, bey dem St. Ottilien Gebürg. ann.

Alpine tenuifolia muscosa T. seu Alpine muscosa. Lugdun 1235. & *IB. 3. 365.* auf feuchten Flecken bey Illkirch, welche unter Wasser gestanden.

Alpine maxima folanifolia T. foliis cordatis, & undulatis, Wald Hünerdarm, mit breiten herzförmigen Blättern, in dem Oberehenheimer Wald, auf dem Gebürg, St. Ottiliæ, perenn.

Alpine arenaria dicta Vaill. pag 7. flosculis albis rosaceis foliis tenuissimis, est *Arenaria IB 3. 723.* auf einer feuchten Wiese, oberhalb der Schiffmatt, bey dem Eckbolsheimer Ziegelofen, an denen Gräben, auf den Flecken, nahe am Wirthshäusel, zwischen Ringelsheim und Ensisheim. ann.

Alpine palustris, folio gramineo angustiore. Dillen. vor dem Epithal-Thor, unten an dem Glacis, in der Ruprechtsau, in feuchten Gräben.

Alyssum foetidum T. flosculis cruciformibus pallide luteis, foliis glasti, pallide virentibus auriculatis, capsula orbiculata, stinckender Lein- oder Flachss, Dotter, *Ic. Tournef. Alsat. sub nomin. Myagr foetid. pag. 94.* in denen Gräben, an der Landstrasse, zwischen Ringels- und Ensisheim, bey Obwald. *Myagrum pueri,* ann.

Alyssum segetum, foliis auriculatis acutis, T. flore & semine majore, est Myagrum sylvestre Zwing. vid. Ic. p. 434. aut Myagrum 1. Tab. hist. vel Turcium IB. 2. 893. Rein oder Flachsdotter, in denen Flachsstücken. *ann.*

Alyssum serpillifolium, flosculis albis cruciformibus, capsula bipartita, radícula tenui filamentosa, gar fleiner Rein-Dotter, in denen Reben, zu Oberbronn, *ann. vid. Tab. nostr. V.*

Anblatum flore è rufo candicante T. sive Anblatum Cordi hist. 89. est Squamaria Rivin. Ic. Tab. hist. 1231. Ohnblatt, Schuppen Wurz, in dunkeln bergichten Wäldern, in dem Rhein-Wört, zwischen denen Wurzeln der Bäume, *perenn.*

Angelica pratensis altera apii folio T. quæ Angelica tenuifolia est Rivin. auf denen Wiesen, hinter dem Spithal-Garten, auf der Contrescarpe, vor dem Steinstrasser-Thor, rechter Hand. Tab. hist. est Hippomarathum 2. 161. *perenn.*

Angelica sylvestris minor, sive erratica T. vel repens IB. 3. part. 2. 145. floribus rosaceis umbellatis albis, foliis latioribus atro virentibus, semine oblongo striato, sive Herba Gerardi Tab. hist. pag. 243. est Podagraria Rivin. kleine wilde Angelica oder Geißfuß, hin und wieder in dem Säulen, *perenn.*

Anonis spinosa T. sive Resta bovis vulgaris purpurea IB. 2. 395. trifolia, flore purpu-

p. 114.

Tab. V.

Alyssum Serpillifol.



J. Striedbeck sculp.

reo simplici papilionaceo , radice longa alba fructu siliquoso brevi , Arete beuf Hauhechel , Stallkraut , 1c. Tab. hist. 913. & Rivin. aller Orten , auf durren Heyden , bey allen Lüften häufig , perenn.

Anonis spinosa flore albo T. & IB. 2. 395. Hauhechel , mit weissen Blumen , 1c. Tab. hist. 2. 913. perenn. bey der hohen Wart , zu Zulkirch , an denen Fleckern. perenn.

Anonis spinosa fruticosa erecta , flore purpureo , Vaill. sive Anonis Hort. Eyst. Tab. 263. neben dem Canal , und zu Oßwald. perenn.

Anonis spinis carens purpurea T. sive Anonis non spinosa purpureo flore IB. 2. 393. 1c. Tab. hist. 3. pag. 913. Hauhechel ohne Stacheln , an denen Rändern der Frucht-Flecker zu Zulkirch , in dem Wald , zu Oberbronn , an dem breiten Weg , in der Luß copiose , Arete beuf , sans epines. perenn.

Aparine vulgaris semine minori T. duro , flore albo cruciformi , fructu semine globulari , caule quadrangulo , fructu lævi , Kleb - Kraut , mit fleiner Frucht , 1c. Vaill. Tab. IV. fig. 3. in der Ruprechtsau , auf denen Linsen - Feldern. perenn.

Asparagus sativa T. foliis Anethi , flosculis luteis rosaceis divisis , baccis , rubris , radice squamosa alba Spargen , Asperge 1c. Tab. hist. 414. in Gärten , und Gärtners-Feldern. perenn.

Asparagus sylvestris, tenuissimo folio T. florib. rosac. seu Asparagus sylvestris, Matthioli Epit. 260. Turionibus amaris, non dulcibus, uti Mappus existimat, wilde Spargen, auf dem Glacis, *Asperge sauvage*, auf dem Glacis, vor dem Juden-Thor, zu Gllkirch, in denen Hecken, in horto medico. *perenn.*

Asplenium five Ceterach T. *foliis pulchre sinuatis*, Klein Milk-Kraut / Stein-Farren, 1c. Tab. hist. 1191. in dem Niedecker-Thal, hinter Haslach, in Rixen rauher Felsen, *perenn.*

Aster montanus luteus, salicis glabro folio T. five Bubonium luteum, Tab. hist. 2. 716. gelb Bergstern-Kraut, mit weyden ähnlichen Blättern, zu Osrowald im Ostwinckel, in denen Hecken häufig. *perenn.*

Aster omnium maximus, Helenium dictus, five Helenium vulgare, seu Enula Campana 1B. 3. 108. *flore luteo radiato, folio integro lato incano semine papposo*, Allant-Wurzel, *Aunée ou Enule* 1c. Tab. hist. 953. auf der Wiesen zu Hochfeld, und Ringendorf häufig. *perenn.*

Aster palustris luteus laciniatus T. seu altissimus fauveolens, *foliis dissectis serratis, floribus luteis radiatis*, five Conyza helenitis, foliis laciniatis, Lob. 1c. 347. Wasser Wund-Kraut, in denen Gräben um die Stadt, zwischen den Rohren. *perenn.*

Aster arvensis coeruleus acris T. five Conyza coerulea 1B. 2. 1043. scharfe kleine Dürre-Wurzel, oder Berus-Kraut, 1c. 3. Tab. hist. 1244. hin

hin und wieder an dörren Orten, in der Rupprechtsau, ann.

Astragalus luteus perennis procumbens T. sive *Glycyrrhiza sylvestris*, floribus luteo pallescentibus papilionaceis, fructu siliquoso bicapsulari, est Foenum græcum sylvestre IB. 2. 330. wilder fœnum grœcum, Stein-Wicke, Gliedweich, beym Schnackenloch, und St. Gallen, auf dem Glacis, vor dem weissen Thurn-Thor, *Fœnugréc sauvage. perenn.*

Astragalus luteus perennis, siliqua gemella rotunda, Vesicam referente, T. sive Cicer sylvestre multifolium IB. 2. 294. Tab. hist. 1c. 2. 885. est Glaux Rivin. wilde Zisser-Erbisen, auf denen Wiesen, in der Wankenau, an denen Furchen der Acker, bey Ehrstein, *Pois chiches sauvages ann.*

Astragalus flore viciæ, dilute purpurascente Moris hist. Ox. part. 2. 106. seu *Onobrychis subcæruleo flore* IB. 2. 337. quæ *Onobrychis* II. Clus. hist. CCXXXIX. wild Süß-Wolke, mit blauen Blumen, rarissimi apud nos ejus proventus est, invenitur quandoque, auf der Meßgerau beym alten Schießberg. *perenn.*

Astrantia major, corona floris purpurascente T. radice nigra, acri sive *Astrantia* Riv. 1c. Tab. 67. optim. Icon. vide, Hort. Eyst. schwarzer Sanickel, schwarze Meisterwurk, auf dem Hochgebürg Hochfelden, auf dem Haulen Berg, per me luxuriat. *perenn.*

Avena vulgaris alba T. *floribus apetalis gramineis, fructu oblongo*, weiser oder gemeiner Habern, *Avoine blanche*, Ic. Tab. hist. 642. auf denen Saamen Feldern, ann.

Avena nigra T. schwarzer Habern. *ibid.*

Ballote T. five *Marrubium nigrum foetidum* IB. 3. 318. quod *Marrubiastrum* Tab. hist. 926. & Rivin, *flore monopetalo verticillato labiato purpureo, fructu quinquepartito, semine oblongo*, stinckender schwarzer Andorn, *Marrube noir puant*, an denen Garten-Zäunen, hin und wieder vor dem Fischer-Thor.

Ballote flore albo T. weiser stinckender Andorn, *rarissime occurrit, prioris est varietas, invenitur tamen quandoque cum precedente.*

Ballamina lutea, five *Noli me tangere* T. & IB. 2. 908. *flore pendulo polypetalo patulo luteo, folio oblongo latiusculo, fructu tumido acuminato* vel *Impatiens* Rivin. Spring-Kraut, Ic. Tab. hist. 1254. in denen Wörten bey Zäkirch, zu Müßig an dem Bach.

Barba caprae floribus oblongis albis rosaceis T. *oblongo semine* five *Barba capri* IB. 3. 488. aut *Drymopogon*. Tab. hist. Ic. 1163. Weiß-Bart/ mit langen flockichten Blumen, auf einer feuchten Wiese, zwischen dem Mauerhof und Obwalden Schlut, an dem Brückel.

Belladonna majoribus foliis & floribus T. *fructu globulari molli, multis Solanum Maniacum* IB. 3. 611. *floribus monopetalis campaniformibus, fructu globoso nigricante molli*, Toll oder Wuthbeeren Kraut, wild

wild Wald Nachtschatten, *Ic. Tab. hist. 977.* auf dem Lüzelssteiner Gebürg, *perenn.*

Beta alba vel pallescens quæ Sicla officinar. *T. radice fibrosa, floribus flamineis, folio latiori costa spissa, fructu globoso, Mangold, Ic. 1. Tab. hist. 814. Poire blanche, in Gärten, und Gartens Feldern. ann.*

Beta rubra radice rapæ *T. rothe Rube oder Möhre, Betterave Ic. 3. Tab. hist. 814. ibid. ann.*

Betonica purpurea *T. flore monopetalo labiato, semine oblongo, braune Betonien, Betoine Ic. 1. Tab. hist. pag. 931. in Rivin. auf denen Wiesen, und in denen Hecken, zu Oßwald, perenn.*

Eadem flore albo ibid. sed varius.

Brassica campestris perfoliata, flore albo cruciformi *T. & Clus. hist. CXXVII. seu Perfoliata filiquosa IB. 2. 835. & Tab. hist. 2. 1140. Feldkohl, Durchwachs, mit Steckrüben Blättern, fast auf allen Kraut-Heckern.*

Brunella folio laciniato *T. flore monopetalo labiato purpureo, semine subrotundo, Brunellen, mit zerschnittenen Blättern, Ic. 2. Tab. hist. 2. 943. & in Rivin perenn. in dem Gansauer Wald häufig.*

Brunella folio laciniato flore albo *T. sine non vulgaris, 2. Clus hist. pag. XLIII. Brunellen, mit eingeschnittenen Blättern, und weissen Blumen, auf der Ringels- und Oßwalder Nachtwende häufig.*

Brunella major folio non dissecto *T. sine Brunella flore minore vulgaris IB. 3. 428. flore*

purpurascens, grose Brunellen, mit ganzen Blättern, und purpur rothen Blumen, *lc. Rivin.* an denen Zäunen, gegen dem Schnackenloch, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Brunella major folio non dissecto, flore albo T. grose Brunellen, mit weissen Blumen, *rarissimi est proventus.*

Brunella, coeruleo magno' flore T. folio integro sive Brunella, Clus. hist. XLIII. est *Brunella flore magno, folio non laciniato IB. 3. 429.* blaue grosse Brunellen, mit ganzen Blättern, *lc. 1. Tab. hist. 944.* & in *Rivin.* sub nomine *Brunella majore flore*, in dem Zulfircher Wald, nabe an denen Aeftern, auf der Obwalder Nachtwend, *perenn.*

Buglossum angustifolium majus T. seu vulgare majus IB. 3. 578. flore coeruleo monopetalo infundibuliformi, semine viperini capitis amulo, grosse wilde Ochsen Zung, mit blauen Blumen, *lc. Tab. hist. 803.* auf dem Glacis, vor dem Cronenburger Thor, in dem XV. Wört, *Buglosse sauvage perenn.*

Buglossum angustifolium majus flore albo T. sive Buglossum Italicum Hort. Eyst. grose schmalle blättrichte Ochsen-Zung, mit weissen Blumen, auf denen Matten, im Urbis Thal.

Buglossoides Echii folio hirsuto, floribus minoribus eleganter coeruleis nostr. quod Buglossum sylvestre minus CB. est Echium Fuchsi pag. 269. vel Echiodes flore coeruleo Rivin. wilde kleine Ochsen-Zung, mit Himmel blauen
Blu-

Blumen, hin und wieder neben den Aeffern, gegen Ofwald, in der Seiler-Bahn zu Hört, wie auch nahe an dem Wald, zu Sulz häufig, vor dem Thor in einer Gruben, *petite buglosse ann.*

Buglossum arvense annuum, lithospermi folio T. *radice rubra, flore albo monopetalo infundibuliformi* seu Lithospermum arvense nigrum, flore albo, semine Echii, IB. 2. 592. est Echioides, flore albo, Rivin, wilder Kleiner Meers-Hirse, kleine Ochsen-Zung, mit weissen Blumen, und röthlicher Wurzel, aller Orten, auf denen besamten Feldern.

Bupleurum montanum latifolium T. five Perfoliata longifol. Dalechamp. Lugd. pag. 1321. non bene, melior Ic. sub nomine Perfoliatæ montanæ Thalii. Hort. fig. XXXVIII. zwischen denen Steinen beym Sulzbad. *perenn.*

Butomus flore roseo T. five Iuncus floridus major paludosus, IB. 2. 524. floribus *sub purpureis, folio gramineo triangulo, semine oblongo*, Ic. 6. Tab. hist. 567. Cyper oder purpur Schwertel, in denen Gräben, vor dem Spital-Thor, an der Straß. *ann.*

Cacalia foliis crassis hirsutis T. five Cacalia quibusdam IB. 3. 569. *flosculis flosculosis purpurascens*, semine papposo, five Cacalia incano folio, Clus. hist. CXV. Wald Rosshub, mit dicken haarichten Blättern, in dem Gebürg, hinter dem klingen Thal, bey der Eisenhütte. *perenn.*

Cacalia tomentosa T. *foliis magnis subrotundis, floribus subpurpureis flosculosis*, groſe Wald Roſhub, mit wollichten weiß grauen Blättern, *Pied de Cheval* in dem Oberehenheimer und Barrer Gebürg. *perenn.*

Calceolus Marianus T. *flore luteo polypetalo anomalo, folio latiore nervoso fructu fenestrato*, rothe Marien = Schüblein, Endlein, Meyen = Schellen, *Sabot ou Soulier de nostre Dame* Ic. Hort. Eyst. & *Garidel*, Tab. 17. est *Damasonii* species sive *Calceolus divæ Mariæ* B. 3. 5 18. zwischen Dorlisheim und Muzig, auf kleinen Berglein häufig. *perenn.*

Campanula arvensis erecta T. *Viola Pentagonia*, Tab. hist. Ic. 683. *flore cæruleo moncpetalo, campaniformi*, *Doucette*, Frauen = Spiegel, mit schönen Viol blauen Blumen, in denen Frucht = Feldern in der Ruprechtsau, neben dem Jesuiter Garten, ingleichen um Hohnheim, *ann.*

Campanula arvensis erecta flore albo T. Frauen = Spiegel, mit weißen Blumen, in der Frucht gegen Haufbergen, *ann.*

Campanula nemorosa angustifolia, *magno flore major*, T. sive *Rapunculus nemorosus* Tab. hist. Ic. 6. 795. Wald Rapunkel, mit groſen Glocken, gegen Oßwald, unter den Wachholder Stauden, auf dem Gebürg gegen Muzig. *perenn.*

Campanula nemorosa angustifolia, *magno flore minor* T. feu *Rapunculus nemorosus parvo flore* Ic. 7. Tab. hist. 794. kleine Waldglöcklein, mit sehr schmahlen Blättern, vor dem Ganssauer Wald. *perenn.* Cam-

Campanula nemorosa angustifolia, parvo flore major T. five *Ranunculus nemorosus angustifolius*, parvo flore 3. *Tab. hist.* 794. kleine Waldglöcklein, mit sehr schmahlen Blättern, vor dem Gansauer Wald. *perenn.*

Campanula persicæ folio T. seu *Campanula angustifolia coerulea* IB. 2. 803. *lc. Clus. hist. CLXXI. flore magno coeruleo, folio angusto atque oblongo parum crenato, radice lactescente. lc. Tab. hist. 2. pag. 699.* Waldglöcklein, mit grossen blauen Blumen, und Pfersich ähnlichen Blättern, hinter Barr, auf denen Bergmatten, auf dem Gebürg, bey Wassenburg, und auf dem Haulenberg. *perenn.*

Campanula persicæ folio flore albo T. seu *Campanula angustifolia alba* IB. 2. 803. Waldglöcklein, mit weissen Blumen, im Reichstätter Wald, auf dem Haulenberg. *perenn.*

Campanula hortensis rapunculi radice T. *repente, flore minore coerulea, lc. IB. 2. 806.* wilde Milchglöcklein, auf Wiesen, zwischen Ringelsheim und Oßwald. *perenn.*

Campanula minor vulgaris rotundifolia T. five *Campanula minor, rotundioribus imis foliis* Clus. *hist. CLXXIII. blaue Wiesen, oder Muschglöcklein, lc. 2. Tab. hist. 794.* überall an abhangenden grasichten Orten, und auf denen Wällen der Stadt, *perenn.*

Caryophyllata alpina lutea T. seu *Caryophyllata montana, flore luteo magno, fructu globoso, semine caudato, lc. IB. 2. 398.* Benedicten
Wurze

Wurzel, mit großen gelben Blumen, auf Berg Wiesen, hinter Kappolsweiler. *perenn.*

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius T. *fructu cylindraceo flore, caryophyllæo rubro simplici* seu *Vulgatissimus* IB. 3. 334. five *Caryophyllus montanus* I. *Tab. hist. Ic. 12. 668. Oillet rouge sauvage*, rothe Feld-Megelein, wilde Gras-Blümlein, auf denen Wiesen, bey dem Canal, und sonst andern grasichten Orten, *perenn.*

Caryophyllus sylvestris prolifer T. *strobilus fasciculatis*, five *Armeria prolifera*, seu *Betonica coronaria squamosa sylvestris*, IB. 3. 335. allerwegen, auf durren grasichten Orten, auf der Wiese, bey der grünen Wart. *perenn.*

Caryophyllus sylvestris vulgaris angustifolius T. five *Caryophyllus montanus albus* II. *Tab. hist. 668. Donner-Mägelein*, mit weissen Blumen / zu Müzig auf Hügeln, rarissime occurrit.

Caryophyllus sylvestris humilis, *flore unico* T. *rubello, radice longa tenui fibrosa*, five *Betonica coronaria*, aut *Caryophyllæa repens rubra*, IB. 3. 328. est *Caryophyllus sylvestris* I. *Clus. hist. pag. 282. Donner-Mägelein*, mit einzeln Blumen, auf der Contrescarpe, linker Hand, am weissen Thurn, vor dem Gansbauer Wald, auf durren sandigen Boden. *perenn.*

Caryophyllus flore tenuissime dissecto T. five *Superba alba*, medio corolla purpureo violacea obsoleta cincta, *Lobel. Ic. 450. five Caryophyllæa superba elatior vulgaris* IB. 3.

330. *Mignardise*, wilde Feld = Mägelein, Muth² willen, in dem Gansauer Wald, auf Wiesen, wo die Preusch in die Zill fällt.

Caryophyllus sylvestris, floribus lanuginosis hirsutis candidis T. *sine corniculis*, seu *Be-tonica minus ramosa coronaria* IB. 3. 332. auf Brach = Aeffern bey Ehrstein. ann.

Caryophyllus barbatus sylvestris T. seu *Viola barbata angustifolia* Dalechamp. IB. 3. 335. unter den Bäumen, auf der Lingelsheimer Nachtwend, auf Matten, bey Oßwald. perenn.

Cataria major vulgaris T. sive *Nepeta officinarum* Mentha *Cataria* IB. 3. part. 2. 225. est *Nepe-ta major Rivini*, flore monopetalo labiato, foliis canescentibus, odore acri aromatico semine, subrotundo, Katzen = Nept, Katzen = Münz / Herbe aux chats. bey dem Wicthäusel, in des Zollers Garten, an denen Zäunen. perenn.

Centaureum luteum perfoliatum T. & IB. 3. 353. flore monopetalo, infundibuliformi luteo, radice alba fibrosa, fructu cylindraco, gelb tausend gulden Blum, *Centauree jaune* Ic. Tab. hist. 4. 1166. bey dem Engelländischen Hof, und zu Oßwald häufig.

Cepa fissilis T. flore albo liliaceo, fructu subrotundo, Schleiß = Zwiebel, Ciboule, Ic. Matthiol. epit. pag. 326. auf denen Gartnes Feldern, ann.

Cepa sectilis juncifolia T. sive *Porrum sectivum juncifolium* Moris Hist. Ic. Tab. hist. 873. Schnittlauch, in allen Gärten.

Cepa sectilis, caule, floribus & semine vulgaris

garis Cepæ similibus, ut & Bulbulis oblongis, minime capitatis, nostr. Schnitt oder St. Jacobs Zwiebeln, Oignon de St. Jacques Ic. Matth. epit. 325. in Gärten und Gartners-Feldern, perenn.

Cepa vulgaris T. rotunda, floribus & tunicis purpurascens liliaceis, foliis fistulosis, gemeine Zibeln, Oignon Ic. Tab. hist. 2. 870. in Gärten und Gartners-Feldern, ann.

Cepa vulgaris, floribus & tunicis candidis T. five Cepa alba rotunda. Tab. hist. 1. 870. weisse Zibeln.

Cepa vulgaris oblonga T. & IB. 2. 547. Winter Zibeln, ibid.

Cepa ascalonica T. five sterilis vel fissilis IB. Schalotten, Ic. Matth. Epit. cap. 327. perenn. in Gärten.

Cepa juncifolia minor purpurascens T. five Porrum sylvestre latifolium purpurascens majus, wilder oder Zauber-Knoblauch, Ic. Tab. hist. 872. Porreau sauvage, auf denen Brach-Fleckern, bey Züllich. perenn.

Cepa tenuifolia, sphærocephalos purpurascens T. five Porrum sylvestre 11. Tab. hist. 872. wilder Knoblauch, Bräulauch, mit Binsen förmigen Blättern, auf denen Fleckern und Wiesen, bey Mauerhof. perenn.

Chamædrys palustris canescens T. IB. 2. 292. five Scordium officinarum, flore purpureo monopetalo labiato, folio villosa allium redolente, semine subrotundo, Lachen Knoblauch, Ic. 1. Tab. hist. 1144. & H. E. atque Rivin. Germandrée d'Eau

ou *Scordium*, auf wässerichten Wiesen, bey
Mauerhof, und Obwald, in *hortum medic.* per
me *transpositum*, *luxuriose viget. perenn.*

Chamædrys major repens T. *flore purpureo
monopetalo labiato, seu vera existimata*, IB. 3. 288.
E Tab. hist. Ic. 1. 769. E in Rivin. Edel oder
groß Gamanderlein, Bathengel, bey der ho-
hen Wart, auf rauhem sandigem Boden, in
der Ruprechtsau. *perenn.*

Chamædrys minor repens T. *sive Chamæ-
drys vulgaris vel. 2.* Clus. hist. 351. gemein Ga-
manderlein, auf allen rauhen ungebauten Or-
ten, *perenn.*

Chamædrys minor repens flore niveo T. *si-
ve Chamædrys albo flore*, Clus. hist. 351. Gamau-
derlein, mit weissen Blumen, unter den andern
sed *rarius*, auf der Meßgerau. *perenn.*

Chamæmælum inodorum T. *sive Cotula non
foetida* IB. 3. 120. est *Cotula* Tab. hist. 70. Krotten
Chamillen, Chamillen ohne Geruch, fast neben
allen Aefern, male dicitur *inodorum*, dum
non *omnis odoris expers est.*

Chamæmælum foetidum T. *flore radiato, fo-
lio amaro*, *sive Cotula foetida*, IB. 3. 120. Ic. 1.
Tab. hist. 60. Hunds-Chamillen, Krotten Dill,
Camomille puant, aller Orten, auf denen Fels-
dern, an dem Weg gegen Eckbolsheim. *ann.*

Chamæpythis lutea vulgaris T. *seu odorata,
flore luteo, monopetalo unilabiato, folio trifido
oblongo*, Erdpin, Feld Cypresse, Schlangens-
Kräutlein, Ic. Tab. hist. pag. 776, E in Rivin.

Ivet.

Ivette ou Ive musquée, auf denen eingeerndten Feldern, bey Züllich, Obwald, und anderen Orten. *perenn.*

Chamæspartium IB. five *Genistella herbacea* T. *humilis* & *sagittalis*, *flore luteo papilionaceo*, quæ *Chamægenista* 11. *Clus. hist.* 104. niedrige Erdsfrümmen, 1c. *Tab. hist.* 12. 1512. zu Eingselsheim, auf grasichten Reinen, zwischen denen Aeffern, an der Landstraß, oberhalb Eingselsheim, *perenn.*

Chærophyllo sylvestre, *feminibus brevibus hirsutis* T. *striatis*, *flosculis albis rosaceis umbellatis*, feu *Caucalis foliis chærefol.* *Rivin.* & *Tab. hist.* 285. *Persil d'asne*, Esels = Körfel, Esels = Peterlein, an dem Weg gegen Züllich, neben den Hecken, *ann.*

Chærophyllo sylvestre alterum, *geniculis tumentibus*, *HRP.* five *Myrrhis annua nodosa*, *semine aspero*, *Moris, H. R. Bles, radice alba fibrosa*, um den Schießrein, an denen Zäunen, nahe der Lohmühl, vor dem weissen Thurn an Weg, nahe bey der grünen Wart. *ann.*

Chondrilla juncea viscosa arvensis, quæ *prima Dioscorid. T. semine papposo*, vel *Chondrilla viminea*. IB. 2. 1021. *Tab. hist.* 7. 487. Fleb = richte Aeffen = Chondrillen, an denen Aeffern, in dem XV. Wört gegen dem Rhein. *perenn.*

Cichorium sylvestre seu officinarum T. IB. 2. 1007. *flore cœruleo composito semiflosculoso*, *radice alba amara*, *semine angulato*, wilde Wegwart oder Wegweiß, mit blauen Blumen, *Cichorée*

chorée sauvage Ic. Tab. hist. 1. 467. aller Orten, neben den Landstrassen, perenn.

Idem flore albo T. wilde Wegwart, mit weissen Blumen, an der Landstrass, nahe dem Reibberg bey Ittenheim, perenn.

Cichorium angustifolium T. sive *Endivia sativa*, *angustifolia vulgaris*, Endivien, mit schmahlen Blättern, Ic. 3. Tab. hist. 477. Scariole, ou Endive, in Gärten, und Gartners Felderen. perenn.

Cichorium crispum T. sive *Endivia foliis crispis*, krause Endivien, Ic. 2. Tab. hist. pag. 477. Endive crespée ibid. perenn.

Cichorium latifolium, sive *Endivia vulgaris* T. gemeine breitblättrichte Endivien, Tab. hist. 1. 476. Endive à feuilles larges. ibid.

Cichorium sativum T. flore caeruleo, zahme oder Garten-Wegwart, Cichorien, mit blauen Blumen, Ic. 2. Tab. hist. 467. ann.

Idem flore albo T. zahme Wegwart, mit weissen Blumen. ibid.

Cicuta major T. floribus albis rosaceis umbellatis gravissimi odoris, caule maculoso fistuloso, fructu globoso, Ic. Tab. hist. 1170. & in Rivin. Schirling, Dollförsel, aller Orten in denen Hecken, an denen Aeffern, vor dem Spithal-Thor. ann.

Cicutaria latifolia foetida T. sive *Cicutaria quorundam* IB. 3. part. 2. 184. caule geniculato, foliis Myrrhidis latioribus & nigrioribus, floribus albis umbellatis, semine longo striato, stinckender Schirling, Ic. 2. Tab. hist. 1170. Cique puant, in feuch-

ten schattichten Orten, vor dem Metzger-Thor, an dem Gatter.

Cicuta minor petroselinio similis T. *floribus albis cordatis, fructu globoso*, sive *Cicutaria fatua*, Lob. Ic. 280. aut *Cicutaria Apii folio* IB. 3. part. 2. 179. Ic. Tab. hist. 273 *Cynapium Rivin.* Hundspeterlein, Kleiner Schirling, in allen Gärten und Gärtners Feldern. ann.

Convolvulus major albus T. & H. Eyst. sive *Convolvulus major* IB. 2. 154. *flore campaniformi fructu subrotundo*, weisse Winde, oder Zaunglocken, Ic. 1. Tab. hist. 1. 263. aller Orten, in denen Zäunen. perenn.

Convolvulus minor arvensis, flore roseo T. sive *Helxine cissampelos* Fuchs. 258. vel *Convolvulus minor* IB. 2. 157. Kleine Kornwinde, mit röthlichen Blumen, Ic. 2. Tab. hist. 1263. *petit Liseron*, auf denen Frucht-Feldern zu Obwald, perenn.

Convolvulus minor arvensis, flore purpureo, radiis albis picto T. Kleine Kornwinde, mit röthlichten u. weiß gestrieten Blumen. ibid. perenn.

Convolvulus minor arvensis flore candido T. Kleine Kornwind, mit ganz weissen Blumen, auf denen Aeckern, bey Hausbergen und zu Illkirch. perenn.

Convolvulus minor arvensis flore albo, cum umbilico purpureo T. weisse Kornwind, mit rothem Boden, auf den Aeckern, bey Oberhausbergheim. perenn.

Convolvulus angustissimo folio nostras cum auri-

auriculis Pluck. Phytogr. Tab. 24. fig. 3. kleine Kornwind, mit sehr schmahlen Blättern, und gehörten Blümlein, in Ostwinckel zu Schwald perenn.

Conyza linariæ folio T. sive *Helichrysos Tragi*, vel *Linaria* III. 18. 3. 151. *capitulo luteo, flosculis flosculosis, semine papposo*, quæ *Linaria aurea*, H. Eyst. seu *Linaria aurea major*, Tab. hist. 1209. gulden Lein-Kraut, bey Gemar, auf sandigem Boden. *perenn.*

Corallina fœniculi folio brevior T. sive *Fucus ferulaceus* Lob. Ic. 255. *flore ranunculi* & *capitulo* est *Peucedanum aquaticum* Tab. hist. Ic. 6. pag. 187. existimat Dn. Mappus quod *Potamogeton* sit ingens *gramineo fol.* vid. hist. ejus pag. 251. quod etiam nos confirmamus cum Vail. Tab. 32. f. 5.

Coriandrum majus T. seu *sativum*, *flore albo rasaceo, umbellato foliis inferioribus latioribus, superioribus tenuius dissectis, fructu globulari* Ic. Tab. hist. 176. & in Rivin, Coriander, auf denen Gärtners-Feldern, ann.

Coronopus sativus seu *hortensis* T. *flore monopetalo albo cruciformi, fructu ovato, zahmer* oder Garten Krähen-Fuß, *Corne de cerf*. Ic. 1. Tab. hist. 302. in Gärten, ann.

Cruciata palustris alba T. *flosculis albis campaniformibus, fructu gemello*, sive *Gallium album* Tab. hist. Ic. 2. 433. weiß sumpfsicht Wald-Stroh, in sumpfsichten Orten, gegen Schwald, und zu Lingelsheim, *perenn.*

Cruciata minima T. Klein sumpfsicht Waldstrob, in dem XV. Wört, in der Ruprechtsau, in feuchten Gräben.

Coronilla herbacea flore vario T. sive *Melilotus Tragi*, IB. 2. 349, *monopetalo papilionaceo fructu siliquoso*, Ic. in Rivin. & Garidel. hist. plant. Sainfoin gemahlte Vogelwicke, bey Achenheim in der Klamm, hin und wieder auf dem Glacis, vor denen Thoren. *perenn.*

Cyperoides vesicarium glabrum, spica pendula longiore T. & angustiore, e spicis viridantibus vel subfuscis, blasenförmiges glattes Cypern-Gras, mit hangender Blüthe, in sumpfsichten Orten, bey Zülkirch, *perenn.*

Cyperoides vesicarium humile, locustis rarioribus T. unter dem Gras, in sumpfsichten Orten, in der Ruprechtsau.

Cyperoides spica pendula brevior T. sive *Pseudo cyperus Lobel.* spicis vel paniculis pendentibus, ex longis pediculis, IB. 2. 496. in morastichen Orten, in der Ruprechtsau, gegen dem Rhein.

Cyperus rotundus inodorus germanicus T. feu *Cyperus aquaticus septentrionalis* Lob. Ic. 77. & IB. 2. 503. runder wilder Galgant, nahe an der Brensch, bey der grünen Wart. *perenn.*

Cyperus vulgati panicula sparsa T sive *Gramen cyperoides aquaticum vulgati* Lob. Ic. 20. & Scheuchz. Agrostaph. 398. & 400. Tab. IX. fig. 7. & 8. item *Tabern. hist.* 6. pag. 533. groß Cypern-Gras, mit flatterlichem Strauß, in denen Gräben um die Stadt, an der Zu, an Herrn

Herrn Prætoris Schloß, Garten, zu Jüllich.
perenn.

Cyperus maritimus capitulis glomeratis T. five luncus acutus maritimus, caule triangulo CBprodr. 22. in dem Rheingiesen häufig, auf der grünen Wart, auf feuchten Matten, perenn.

Cyperus gramineus T. & IB. 2. 504. est Cyperus graminea five miliacea Lob. 1c. 79. Cypern-Gras / mit flatterichem Hirse Strauß, an denen Gräben der Wasser, bey dem Schiefrein, an der Bruck, oberhalb der Lohmühl, am Wickhäusel, und an der Zll. perenn.

Cyperus minimus, panicula sparsa nigricante T. feu Gramen parvum pulchrum, panicula compressa nigricante IB. 2. 471. & Tab. hist. 4. 533. Klein Ried-Gras, auf der Insel, wo die Breusch in die Zll fällt, in allen wässerichten Gräben. perenn.

Cyperus minimus panicula sparsa subflavescente T. feu Gramen pulchrum parvum, panicula lata compressa, IB. 2. 470. & Scheuchz. agrost. Tab. VIII. fig. 13. Klein Ried-Gras, mit gelben Köblein, auf feuchten Wiesen, bey dem Schnackenloch, und in der Ruprechtsau. perenn.

Daucus officinarum T. five Daucus vulgaris Clus. hist. CXCVIII. 1c. Tab. hist. 195. vel Pastinaca sylvestris aut Staphylinus Græcorum, IB. 3. part. 262. est Staphylinus Rivin. flosculis albis rosaceis umbellatis, in medio puncta rubra, fructu subrotundo, Vogels-Nest, wilde Möhren, gelbe Pest-Nägel, Carotte sauvage, auf allen Wiesen.

Daucus sativus radice lutea T. *lc. Tab. hist. pag. 192.* gelbe Möhre oder Rube, Carotte jaune, auf allen Gärtners-Feldern, *perenn.*

Daucus sativus radice alba T. weisse Möhre oder Pest-Mägel, *Carotte blanche ibid. ann.*

Daucus sativus radice atro rubente T. rothe Möhre oder Rube, nostratibus rothe Nanen, *Carotte rouge lc. 2. Tab. hist. 192. ibid. ann.*

Delphinium segetum flore coeruleo T. *sive Consolida regalis arvensis, flore minore lb. 3. 210. coeruleo polypetalo anomalo, foliis tenuissime incis, semine angulatos,* Korn oder Feld-Kitter-Sporn, in denen Korn-Feldern, *lc. 2, Tab. hist. 131. & in Rivin. Pied d'alouette ann.*

Digitalis minima Gratiola dicta T. *sive Gratiola lb. 3. 443. floribus monopetalis anomalis tubulatis, dilute purpurascens, fructu rotundo acuminato,* Gottes Genad, Purgier-Kraut, *lc. Tab. hist. 754. & in Rivin. Herbe à pauvre homme,* an dem Rand der wässerichten Wiese, vor der grünen Wart, und bey dem Mauerhof. *perenn.*

Eadem flore albo. T. *quæ Gratia Dei Hort. Eystett. wilder Aurin,* mit weissen Blumen, zu Dorlisheim, auf feuchten Wiesen.

Doronicum plantaginis folio alterum T. *villosa ex adverso posita, flore aureo radiato, semine paposo, sive Doronicum Germanicum, lb. 3. 19. vel Arnica Schroed. & officin. est Damasonium Dioscorid primum, Tab. hist. pag. 1116. groß Lucians-Kraut, Wolferley. Doronic à feuilles larges ou de plantain,* auf dem Hochgebürg Hochfeld

feld auf denen bergichten Wiesen, zu Buchsweyler auf dem Paßberg. *perenn.*

Echium vulgare T. & IB. 3. 586. *flore caeruleo monopetalo infundibuliformi, semine viperino*, wilde Ochsen Zung, mit blauen Blumen, Herbe aus *Vipere* Ic. Rivin. bey Oßwald, auf dem Glacis, vor dem Fischer Thor. *perenn.*

Echium majus & asperius flore albo monopetalo infundibuliformi semine, viperino T. seu *Echium flore albo majus* IB. 3. 588. wilde Ochsen Zung, mit weissen Blumen, in dem Ostwinckel, auf dem St. Ottilien Berg, zwischen Eckboisheim und Ittenheim an der Werb. *perenn.*

Echium majus & asperius, flore dilute rubente T. wilde Ochsen-Zung, mit rothen Blumen, hinter St. Arbogast, rarissimi est proventus. *perenn.*

Emerus Cæsalpini T. qui *Coronilla major* Rivin sive *Colutea scorpioides* i. *elator*, Clus. hist. 97. & Tab. hist. 1. 1503. Schaf-Linsen, mit Scorpions-Kraut Schoten, zu Jülenheim, an der Maur im Wirthshaus, zu Blinschweyler bey dem Schloß häufig, *perenn.*

Emerus minor T. sive *colutea filiquosa minor*, est *Scorpioides* Clus. hist. pag. 97. Tab. hist. 2. 1503. auf durren Aeckern bey Rügelsburg, auf dem Falckensteiner Hochgebürg. *perenn.*

Epilobium ramosum & filiquosum foliis angustis, flore purpureo cruciformi nobis. sive *Lysimachia filiquosa speciosa angustifolia* IB. 2. 907. Est *Epilobium spicatum*

foliis integerrimis, linearibus fasciculatis Haller 458.

Epimedium Dod. pempt. 539. seu Epimedium quorundam IB. 2. 395. floribus cruciformibus luteis, limbo purpureo cinctis, siliqua uniloculari, radice repente, fructu siliquoso uniloculari, auf dem Haulen Berg, per me transplant. ubi nunc luxuriat. vid. Tab. nostr. VI.

Equisetum palustre brevioribus setis T. five Equisetum palustre Lob. Ic. 795. sumpsichter Rosschwanz, mit kurzen Bürsten, auf sumpsichten Wiesen, vor dem Fischer und Spithals Thor, perenn.

Equisetum foliis nudum ramosum T. five Junceum ramosum Ic. Tab. hist. 568. Schaft Heu, mit neben Zweig, Queue de Cheval, avec la branche, in allen Stadtgräben. perenn.

Equisetum foliis nudum non ramosum five junceum T. seu Equisetum nudum Tab. hist. 568. Schaft Heu, ohne neben Zweig, Queue de cheval. sans branche. perenn.

Equisetum foliis nudum minus variegatum Basileum T. radice nigra,culo brevissimo, zu Oswald auf feuchten Wiesen, in dem XV. Wört am Rhein. perenn.

Equisetum palustre longioribus setis T. five Hippuris Lob. 793. & Tab. hist. Ic. 2. 565. vel Equisetum majus aquaticum IB. 3. 728. groß Wasser Ross-Schwanz, in der Ruprechtsau, bey dem Jäger-Hof, auf dem Schießrein, am Wasser. perenn.

Equi-

p. 136.

Epimedium. T.

Tab. VI



J. Striedbeck sculp.

Equisetum sylvaticum tenuissimis setis T. in feuchten Wäldern, in dem Zülkircher Wald, bey dem Gasanen-Garten. *perenn.*

Erica vulgaris glabra T. five *Erica humilis vulgaris* semper virens, flore purpureo *IB.* 1. 354. *monopetalo, foliis sabinæ similibus, fructu subrotundo*, Heyde, mit rothen Blumen, *1c. Tab. hist. 1. & 2. 1517.* *Bruyere*, bey allen Lüsten, bey der Schlut, *perenn.*

Erica vulgaris glabra, flore albo T. feu *Erica alba* *Tab. hist. 3. 1517.* Heyde, mit weissen Blumen, in dem Esbolsheimer Wald, *sed rarius occurrit. perenn.*

Eruca sylvestris major lutea, caule aspero T. *floribus cruciformibus flavescens, fructu siliquoso*, wilde Raucke, *1c. 3. Tab. hist. 837.* *Roquette sauvage*, in der Ruprechtsau, in den Rhein-Wörten, vor der Citadell, gegen Kehl. *perenn.*

Eruca tenuifolia perennis, floribus luteis T. & *IB.* 2. 861. Kleine wilde Raucke, bey dem Ziegel Ofen, gegen dem Rhein, neben wässerichten Gruben, bey Ohwald und Lingelsheim. *perenn.*

Eryngium vulgare T. & *IB.* 3. 85. *flosculis albis rosaceis umbellatis, semine ovato*. Manstreu, Bracken-Distel, *1c. Tab. hist. pag. 1072.* *Chardon Roland, ou à cent têtes*, bey allen Lüsten, und andern grasichten dürren Orten. *perenn.*

Erysimum alterum, siliquis Erucae T. *fructu siliquoso* five 2. *Tab. hist. 840.* an dem
15 Weg

Weg nach der Rheinbrück , an dem Canal,
perenn.

Eupatorium Cannabinum T. *flore flosculofo, semine papposo*, five Eupatorium adulterinum IB. 2. 1065. Wasser Dosten, Kunigunden-Kraut, *Eupatoire* Ic. Tab. hist. 336. an dem Canal, bey Eckbolsheim, in dem Stadt-Graben, vor dem weissen Thurn, perenn.

Filago vel Impia T. five Gnaphalium vulgare majus, *floribus flosculosis coagmentatis, semine papposo*, grose Feld-Kaizen, Ruhr-Kraut, Ic. 2. Tab. hist. 781. *Herbe à Cotton*, in der Ruprechtsau, auf ungebauten und sandigen Feldern, zu Oßwald. ann.

Filago seu Impia altera T. five Gnaphalium majus, angusto oblongo fol, CBp. schmah Blättrig Ruhr-Kraut, auf dem Schießrein, in steinichten Gruben. ann.

Filago vulgaris tenuissimo folio erecta T. five Gnaphalium vulgare tenuifolium IB. 3. 159. auf durren trockenen Aekern zu Oßwald. ann.

Filago incana, capitulis in summis caulibus & ramulis dispositis Dillen append. Catal. plant. Giff. Klein Ruhr Kraut, mit schwarzen Köpfen, auf der Insel wo die Breusch in die Elb fällt, und andern feuchten Orten mehr. ann.

Filicula, quæ Adiantum nigrum officinarum T. pinnulis obtusioribus, five Adiantum nigrum officin. seu vulgare IB. 3. 742. foliis longioribus pulverulentis, pedicula nigro, gemein
Farnen-

FrauenHaar, Ic. 5. Tab. hist. 1185. Capillaire noir ou ordinaire, zu Baar, und Oberbronn, zwischen denen Steinfugen, perenn.

Filicula fontana major, five Adiantum album Filicis folio T. IB. 3. 741. Brunnen Farren-Kraut, bey dem Ottilien Brunnen, an denen Felsen, neben denen Quellwässerlein zu Heiligenstein, perenn.

Filicula fontana minor T. five Filicula fontana Tab. hist. Ic. 3. 1181. Klein Brunnen Farren-Kraut, bey dem Quellwässerlein, auf dem Gebürg St. Ottilien, an denen Felsen. perenn.

Filicula saxatilis corniculata T. five Holostium petræum Tab. hist. Ic. 3. 1113. Schlangen-Zwang, auf dem St. Ottilien Berg, zwischen denen Felsen. perenn.

Filipendula vulgaris T. flore albo rosaceo, radice fibrosa, rother Steinbrech, Filipendule. Ic. IB. 2. 189. auf der Schwalder Nachtweyd. perenn.

Filix non ramosa dentata T. vel Filix Mas five non ramosa IB. 3. 737. Filix five Mas officinarum, Fougere Male, Wald Farn, gemeine Farren ohne Zweig, aller Orten in Wälderen, im Brumbter und Hördter Wald, Ic. 1. Tab. hist. 1181. perenn.

Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis T. est Filix major & prior Tragi, five ramosa repens IB. 3. 735. vel Foemina, Fougere femelle Ic. 2. Tab. hist. 1181. groß Farn-Kraut, Weiblein, mit zweigen, perenn.

Filix ramosa minor pinnulis dentatis T. five
Filix

Filix ramosa minor IB. 3. 741. vel Filix querna vel arborea Ic. 7. *Tab. hist.* 1182. Baum oder Eich Farren, auf allen zerfallenen Bäumen, in den Wäldern, auf dem Gebürg zu Barr. *perenn.*

Filix non ramosa petiolis tenuissimis & tenuissime dentatis T. sive Filicula lutea fæmina Ic. 7. *Tab. hist.* 1182. in dem Hochgebürg, gegen Hochfeld, est Filix dentata Munting 288.

Filix minor non ramosa T. sive palustris minor, quæ Filix querna Lobel. seu Dryopteris Ic. 815. aut Petræa fæmina *Tab. hist.* Ic. 2. 1182. Sumpf-Farren, an dem Bach beym Kloster Peris, bey grossen feuchten Steinen, oberhalb Keyfersberg. *perenn.*

Filix Rhætica tenuissime dentata T. & IB. 3. 740. sive Filix dentata T. est Filix dentata, Munting. fig. 84. pag. 288. oberhalb Ottrott, gegen Lüzelburg auf dem Gebürg. *perenn.*

Filix ramosa dentata, ramulis & pinnulis longius, ab invicem distantibus Mapp. hist. Ic. VIII. pag. 106. in dem Haslacher Thal, unter denen Thannen-Bäumen. *perenn.*

Filix non ramosa latifolia dentata, profundius pinnulis maximis Boerh. Ind. plant. pag. 26. unter den kleinen Thannen, hinter St. Ottilien Berg. *perenn.*

Filix mollis sive glabra vulgari mari non ramosa accedens IB. 3. 738. & Vaill. 53. *Tab.* 9. fig. 4. Farren-Kraut, mit weichen zarten Blättern, auf dem St. Ottilien Berg, bey dem Brunnen. *perenn.*

Filix

Filix ramosa major , pinnulis acutissimis non dentatis CBp. in dem Haglacher und Wimmerauer Gebürg. *perenn.*

Filix tenuissime secta ex monte Ballon. IB. 3. 739. Farren-Kraut , mit gar zarten eingeschnittenen Blättern , auf dem Gebürg zu Niedeck , in dem Wald hinter hohen Andlau. Ic. *Vaill. Tab. IX. f. 3. perenn.*

Foenum græcum sativum T. flore albo papilionaceo, foliolo ex uno pediculo terno, fructu siliquoso. Bockshorn, Fönugröck , Ic. IB. 2. 363. ♂ in Rivin. auf denen Gartners-Feldern. *ann.*

Fungoides infundibuliformâ semine foetum T. in denen Waldungen , am faulen Holz , Ic. *Vaill. Tab. XI. fig. 67.*

Fungus betulaceus orbiculatus albus T. Ic. *Clus. hist. CCLXXVIII. noxior. genus Fung. ♂ IB. 3. 841.* weisser Bircken-Schwamm , in allen Waldungen, an abgehauenen alten Bircken-Stämmen, in dem Ganssauer Wald.

Fungus pileolo lato-orbiculari flavescente T. *esculento* five Capreolini *Tab. hist. 1520.* est Fungus pallidus IB. 3. 832. gelbe Pfifferlinge, auf dürrer Erdreich , vor dem Ganssauer Wald.

Gallium album vulgare T. & IB. 3. 721. *latifolium, flore albo simplici campaniformi, fructu gemello, groß Stern Meger-Kraut, Ic. 1. Tab. hist. 434. ♂ IB. 3. 721. perenn.*

Gallium album supinum multicaule Flor. Ien. 4. & Dillen. *append. 3.* klein niedrig stehend Meger-Kraut , in dem XV. Wört , und andern

andern Orten , in feuchten Gräblein. *perenn.*

Gallium luteum T. seu *Verum* IB. 3. 720.
unser Frauen Bett-Stroh , *Caille laid* Ic. 1.
Tab. hist. 432. auf allen Glacis , vor der Stadt,
aller Orten an den Heinen der Aecker , *perenn.*

Gallium flore pallido, seu *flavescente* T.
Wald-Stroh , mit bleich gelben Blumen. Ic.
IB. 3. 721. neben dem Canal , in Gruben , auf
feuchten Wiesen , zu Obwald. *perenn.*

Gallium arvense flore coeruleo T. five *Ru-*
bia coerulea erectior elatiorve IB. 3. 719. &
Chabræi pag. 547. blau Aecker Meger-Kraut,
auf Berg-Ackern , gegen Haslach und Nideck.
ann.

Gallium montanum latifolium ramosum T.
five *Rubia sylvatica lævis* IB. 3. *Caille laid de*
montaigne , Bergstern-Kraut , groser Waldmeister,
Ic. *Tab. hist.* 434. *perenn.*

Genista tinctoria germanica T. five *Tinctori-*
us flos, IB. 1. 391. *flore lutes papilionaceo, fructu siliquo-*
so, kleine Aecker Bfrimmen, Genster, *Petit. Genet ou*
Fleur à teindre Ic. 6. *Tab. hist.* 1510. hinter der Cita-
del, neben den Aeckern in der Wankenau, auf denen
Matten / *perenn.*

Genista tinctoria germanica foliis angustio-
ribus T. (Genster , mit schmahlen Blättern , est
Genistella Rivini. auf durren Wiesen , zu Ob-
wald. *perenn.*

Genista spartium majus, *brevioribus & lon-*
gioribus aculeis T. five *Genistellæ spinosæ af-*
finis, *Nepa quibusdam* IB. 1. 400. five *Scorpi-*

us 1. Clus. hist. 106. Hag o'er Zaun-Genster, grose stechende Pfrimmen, est Genista spinosa Rivin. in dem Schloß-Garten zu Brumbt. perenn.

Genista spartium minus germanicum T. sive Genista aculeata, foliosa IB. 1. 399. kleine stechende Pfrimmen, Petit genet piquant est Genistella spinosa Rivini, in dem Esbolsheimer Wald. perenn.

Genista ramosa, foliis hyperici T. sive Genistella pilosa IB. 1. 393. est Genista minima Dalech. 173. folia ejus inferius lanuginosa, superius glabra sunt. auf dem Gebürg hinter hohen Andlau. perenn.

Genistella herbacea sive Chamæspartium IB. 1. 393. sive Chamægenista 11. Clus. hist. 104. Genistella articulata & Sagittata nobis niedrige Erd-Pfrimmen, an der Landstrasse, nach Ensisheim, und an den Reinen der Aecker, zu Eingselsheim. perenn.

Gentiana alpina punila verna major T. sive Gentianula quæ Hippion. IB. 3. 527. flore elegantissime cœruleo monopetalo campaniformi, sive Gentiana VI. Gentianella minor verna Clus. hist. 315. Himmels-Stengel, blaue Rof-Violen, in dem Zülkircher Wald, und bey Obwald vor dem Wald, perenn.

Geranium columbinum dissectis foliis, pediculis, florum longissimis T. Storcken-Schnabel, oder Tauben-Fuß, mit gespaltenen tief eingeschnittenen Blättern, in

in denen Hecken, an der hohen Wart an Obwald, ann.

Geranium sanguineum maximo flore T. rosso, radice crassa IB. 3. 478. Ic. 13. Tab. hist. 126. est *Geranium hæmatodes* VII. Clus hist. CII. Sanguinaire, Berg Storchens-Schnabel, mit großen rothen Blumen, an denen Keinen der Neben zu Oberbronn. perenn.

Geranium phæum seu fuscum, petalis reflexis T. Ic. Hort. Eyst. & IB. 3. 477. braunschwarzer Berg Storchens Schnabel, mit gebogenen Blumen, auf Berg-Wiesen zu Barr, auf dem Haulen Berg / per me satum. perenn.

Geranium phæum petalis rectis seu planis, Moris hist. oxon, five *Geranium phæum*, pullo flore Clus, IB. 3. 477. utrumque maculatum aut non maculatum est. Storchens-Schnabel, mit aufrecht stehenden Blumen zu Barr, auf denen Berg-Matten. perenn.

Geranium Batrachioides, collum gruis germanorum live *Grainalis* Lugd. 278. Storchens-Schnabel, mit langen Schnäbeln, auf Hügeln bey Sels, auf brachliegenden trockenen Hecken, zu Cron Weissenburg. perenn.

Geranium batrachioides, Gratia Dei German. T. & IB. 3. 475. Ic. 6. Tab. hist. 124. großer blauer Storchens-Schnabel, auf dem Gebürg, gegen dem Steinthal, und Hochfelden, perenn.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium T. five *Arundinaceum paniculatum* Tab. hist. Ic. 2.

525. est *Gramen majus aquaticum* Lob. & IB. 2. 481. groß Nied = Graß, an dem Ufer der Zu, und Breusch, in allen Stadt = Gräben außer denen Thoren. *perenn.*

Gramen aquaticum spicatum, *spica cylindracea brevi* T. sive *Gramen fluviatile album* Tab. hist. Ic. 2. 530. weiß Fluth oder Fluß = Graß, in denen Gräblein, neben den Gartners = Feldern, unterhalb dem Wickhäusel, in stehenden Wasser Gruben am Canal, *perenn.*

Gramen aquaticum paniculatum fluitans T. *panicula longissima*, sive *Gramen fluviatile* Tab. hist. Ic. 1. 530. Endten oder schwimmend Graß, in denen meisten Wasser = Gruben, vor dem Fischer und Spithal Thor. *perenn.*

Gramen paniculatum spicis crassioribus & brevioribus T. *folio aspero, floribus pallide luteis, aut etiam subrubris* Scheuchz. Agrost. pag. 300. seu *Gramen asperum* IB. 2. 467. quod *spicatum* Dalechamp. 427. Strauß Graß, mit rauhen Blättern, auf denen Wällen um die Stadt. *perenn.*

Gramen paniculatum latifolium, *radice repente crassiori* T. sive *Gramen canarinum longius radicatum* IB. 2. 457. groß Quecken = Graß, in dem Ochsen Wört. *perenn.*

Gramen aquaticum paniculatum miliaceum T. Ic. Vaill. Tab. XVII. fig. 7. Wasser Graß, mit einem Hirse Strauß, zu Oßwald und Gravens staden an Gräben, *perenn.*

Gramen paniculis elegantissimis, sive *Eragrostis majus* T. sive *Gramen paniculatum sati-*

vum, *Heragrostis* Tab. hist. Ic. 11. 518. hinter der hohen Wart, neben denen Hecken, *perenn.*

Gramen panicula fere arundinacea, locustis brevissimis T. five *Gramen pratense vulgare* spica fere arundinacea IB. 2. 461. an dem Canal, auf denen Matten bey Eckbolsheim. *perenn.*

Gramen paniculatum arundinaceum, panicula densa spadicea T. five *Calamagrostis quorundam* Lob. Ic. 6. Wasser Feder-Gras, auf feuchten Wiesen zu Oßwald, bey'm Mauer Hof, an dem Canal, in denen Hecken, *perenn.*

Gramen paniculatum proliferum T. five *Gramen cum panicula molli rubente* IB. 2. 464. hin und wieder auf versallenen Mauern der Dörfer, auf steinichten dürren Wiesen, neben dem Rhein-Giessen. *perenn.*

Gramen avenaceum, panicula purpureo argentea splendente Ray hist. 1909. auf trocknen Wiesen, in der Meßgerau, auf dem Glacis, vor dem Juden Thor, *perenn.*

Gramen avenaceum locustis glabris purpurascentibus & aristatis T. seu *Gramen murorum* Dalechamp. 428. in denen Korn-Feldern bey Drusenheim. *perenn.*

Gramen avenaceum spica simplici, locustis candicantibus splendentibus & rarioribus T. in dem Gansauer Wald, unter denen Hecken. *perenn.*

Gramen avenaceum locustis villosis crassioribus, T. five Festuca graminea glumis hirsutis, Treßl oder Twalch, Ic. 2. Tab. hist. 544. auf den Wällen

Wällen und Wecfern um die Stadt, in dem Ruprechtsauer Wald. *perenn.*

Gramen avenaceum montanum lanuginosum T. sive Gramen avenaceum Tab. hist. 15. 579. locustis parvis candidis pilosis, Haber-Gras, mit haarichten Köpfen, auf dem Gebürg zu Oberbronn. *perenn.*

Gramen avenaceum panicula sparsa, locustis minoribus & aristatis T. sive Festuca altera Lob. Ic. 33. quod Bromos est Tab. hist. Ic. 1. 544. an denen Wegen und Aeffern bey Oßwald, zu Eckbolsheim unter der Frucht am Weg, bey der Carthaus. *perenn.*

Gramen avenaceum locustis villosis angustis candicantibus & aristatis T. sive Gramen murorum spicis pendulis angustioribus Dillen Catal. plant. Giss. 71. hin und wieder auf den Mauern, auf dürren Wiesen und Aeffern zu Oßwald. *perenn.*

Gramen avenaceum utriculis lanugine flavescentibus T. sive Avena pilosa IB. 2. 433. wild Haber-Gras, unter dem Habern, auch unter der Gerst. *perenn.*

Gramen avenaceum panicula sparsa, locustis majoribus & aristatis T. sive Avena fatua Tab. hist. Ic. 1. 544. Gauch Habern, unter der Frucht, und an denen Wegen. *perenn.*

Gramen avenaceum montanum locustis rubris T. seu Gramen locustis rubris IB. 2. 434. in der Ruprechtsau gegen dem Rhein, neben den Aeffern. *perenn.*

Gramen antoxanthum spicatum T. Ic. Lugd. 426. spica flavescente, Wiesen-Gras mit gelblichten Aehren, zu Osward, auf trocknen Wiesen. *perenn.*

Gramen capillatum paniculis rubentibus IB. five *Gramen segetum panicula sparsa latiore* Lob. Ic. 2. pag. Acker - Gras / mit einem rothen Strauß, unter der Frucht um die Stadt. *perenn.*

Gramen capillatum, paniculis viridantibus IB. five *Gramen agrorum* Lob. IB. 2. 461. Tab. hist. 4. 526. *perenn.*

Gramen loliaceum radice repente five *Gramen officinar.* T. foliis viridibus spica triticea compacta, Quecken oder Hunds - Gras, Chien dent. Ic. 5. Tab. hist. 516. an denen Wegen, und auf denen feuchten Aekern. *perenn.*

Gramen loliaceum majus, spicis longius distantibus T. auf denen Wiesen, und an dem Weg, bey Osward. *perenn.*

Gramen loliaceum, panicula multiplici spicata T. an dem Gräblein bey Gutleuthen, und an der Landstraß gegen Schiltigheim an denen Wegen in der Ruprechtsau. *perenn.*

Gramen loliaceum spicis brevioribus & latioribus compressis. Moris hist. Ox. auf ausgetretenen Fußpfaden gegen Osward. *perenn.*

Gramen loliaceum spica simplici & densa T. five *Gramen angustifolium spicae tritici muricæ simili* CB prodrom. 17. ubi Icon. auf den Wiesen, zwischen dem Canal - Schliesen und Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Gra.

Gramen loliaceum corniculatum, spicis vil-
lofis T. five *Gramen avenaceum dumetorum spi-
catum* Dillen. Append. Catal. plant. Giff.
pag. 170. ubi Ic. an denen Hecken Eckbolshei-
mer Walds, wie auch zu Gravenstaden und
Schwald perenn.

Gramen loliaceum angustiore folio & spica
T. five *Phoenix lolio similis* IB. 2. 436. Mause
Gersten, Ic. Tab. hist. 546. perenn.

Gramen loliaceum repente radice five *Gra-
men aristis longioribus donatum* T. Ic. Vaill.
Tab. XVII. fig. 2. neben denen Aeffern zu Zu-
firch. perenn.

Gramen loliaceum spica longiore aristas ha-
bens T. Lulch oder Schwindel-Korn, Ic. 1. Tab.
hist. 550. auf denen Weizen und Korn-Feldern,
perenn.

Gramen loliaceum spica longiore sine aristis
T. an der Landstrass, und neben denen Frucht-
Feldern, zu Eckbolsheim. perenn.

Gramen loliaceum corniculatum spicis gla-
bris T. in trocknen Gräblein / bey Schiltigheim
und auf dem Heiligensteiner Gebürg. perenn.

Gramen loliaceum minimum, foliis juncis,
panicula unam partem spectante T. five *Gra-
men spartum nostras parvum* Lob. Ic. oberhalb
hohen Andlau und Hochfeld. perenn.

Gramen loliaceum altissimum, spica *Brizæ*
per longa, aristis brevioribus donata T. est
Gramen spica Brizæ majus CB. prodr. ubi Icon. auf de-

nen Matten, zu Druttenhausen häufig, in dem XV Wört am Rhein.

Gramen loliaceum minus capillaceo folio, spica Brizæ longissima T. five *Gramen tenuifolium glabrum* IB. 2. 462. radice nigra, auf denen dürren Wiesen zu Müßig. *perenn.*

Gramen nodosum avenacea panicula CBp. five *Gramen bulbosum nodosum* Lob. Ic. 23. & Scheuchz. Agrost. Tab. 4. fig. 27. Knoten Gras, auf feuchten Fleckern. *perenn.*

Gramen pratense paniculatum majus latiore folio T. spica fere arundinacea, Heu-Gras, Ic. 2. Tab. hist. 575. *perenn.*

Gramen paniculatum minus radice repente panicula duriore T. auf denen Mauern, des alten Stadtgrabens.

Gramen pratense paniculatum minus rubrum T. roth Straßen-Gras, Ic. Tab. hist. 16. 519. an allen Wegen.

Gramen pratense paniculatum minus album T. Ic. 15. Tab. hist. 519. weiß Straßen-Gras, aller Orten an dem Wegen.

Gramen paniculatum medium T. est *Gramen pratense minus* IB. 1. pag. 542. auf allen mageren Wiesen.

Gramen paniculatum majus locustis magnis candicantibus tremulis T. five *Gramen tremulum majus*, Zitter-Gras, Hasen Brodt, Amourettes tremblentes Ic. Tab. hist. 541. auf Wiesen zu Oßwaldt.

Gramen paniculatum minus, locustis parvis

vis tremulis, T. & IB. 2. 470. five Gramen tremulum minus, panicula parva, radice rufescente repente, Klein Zitter-Gras, oder Hasen-Brod, auf durren Wiesen zu Obwald. 1c. CB. prodr. pag. 4. perenn.

Gramen paniculatum majus, locustis magnis phoeniceis tremulis T. five Gramen tremulum majus, panicula spadicea CBp. groß Zitter-Gras, mit braun rothen Hülsen, ibid. und auf denen Wiesen, bey Reichshofen häufig. perenn.

Gramen pratense, panicula duriore, laxa, unam præcipue partem spectante, Ray synopsis. 257. auf Wiesen, gegen der Gansau. perenn.

Gramen pratense paniculatum molle CBpr. pag. 5. feu Gramen lanatum Dalechamp Lugd. 425. & IB. 2. 466. auf durren Wiesen, in der Rupprechtsau. perenn.

Gramen minus vulgare, panicula rigida T. five Gramen duriusculum Tab. hist. 18. 520. Klein hart Gras, vor dem Spithal Thor, bey der Seiler-Bahn. perenn.

Gramen paniculatum aquaticum, Phalaridis semine T. Klein Ried-Gras, an dem Wasser der Zül, und der Breusch. perenn.

Gramen paniculatum arundinaceum, spica multiplici T. five Gramen Calamagrottis Lobel. IB. 480. Rohr oder Ried-Gras, auf der Gansau, an dem Rhein, vor dem weissen Thurn Thor, in denen sumpfigten Orten. perenn.

Gramen nemorosum, panicula rufescente

molli T. five Sylvaticum *1c. Tab. hist. pag. 537.*
Wald = Graß, in dem Eßbolsheimer Wald.
perenn.

Gramen sylvaticum, panicula miliacea
sparsa T. five Gramen miliaceum *Lob. 1c.*
3. 3. Tab. hist. 1c. 13. 518. Wald Hirse Graß,
an dem Canal, und Eßbolsheimer Wald. *pe-*
renn.

Gramen pratense paniculatum altissimum,
locustis parvis splendentibus non aristatis T.
auf dem Spithal Wall, auf denen Fleckern bey
Zürich. *perenn.*

Gramen spicatum vulgare secalinum T. five
Holcus Plin. Anguillaræ *Lob. 1c. 30.* est Hor-
deum murinum *1B. 2. 431.* Gersten = Graß,
Zwack, an allen Fuß-Pfaden, und Wegen.
perenn.

Gramen spicatum secalinum minus T.
1c. Vaill. Tab. VII. fig. 4. Mauß = Gersten, taub
Korn = Graß, an allen Fuß-Pfaden, an denen
Mauren alter Stadt-Gräben. *perenn.*

Gramen spicatum spica cylindracea longis-
sima T. five Gramen cum cauda muris mayo-
ris longa, majus *1B. 2. 472.* *perenn.*

Gramen spicatum, spica cylindracea brevi,
radice nodosa T. est Gramen nodo sum tertium *CB.*
rodubi 1con. auf dem St. Ottilien Berg.

Gramen spicatum, spica cylindracea molli
& densa T. five Gramen alopecuroidi acce-
dens & Phalaridi, spica longiuscula, folio
longi-

longiusculo IB. 2. 474. Fuchs = Schwanz,
oder Kolben = Gras, auf allen Wiesen und
Glacis.

Gramen secalinum spicatum altissimum T.
gar groß Gersten = Gras, auf dem Wall, zwi-
schen dem Juden und Steinstrasser Thor, in
den Ruprechtsauer = Wald, an denen Hecken.
perenn.

*Helleborine montana angustifolia flore pur-
purascente* T. *polypetalo anomalo fructu fenestrato.*
sive *Damasonium purpureum dilutum* aut
Elleborine IV. *Clus.* IB. 3. 516. wild schmahl
blättricht Nießwurz, *lc. Tab. hist.* 3. 1100. auf
dem Haulenberg, bey Mundolsheim. *perenn.*

Helleborine altera flore rubente T. sive *El-
leborine botryoides* seu *Alisma racemosum*
IB. Nießwurz, mit ganz rothen Blumen, hin-
ter Rappolsmeyer, auf dem Hochgebürg, in
dem Granwört neben den Aeffern, am Was-
ser gegen der Citadell. *perenn.*

Helleborine flore albo T. seu *floribus albis* IB.
3. 516. *lc. Tab. hist.* 2. 1100. breite Berg-Nieß-
wurz, mit weissen Blumen, hinter dem Berg
St. Ottilia häufig. *perenn.*

Helleborine montana latifolia T. sive *Ellebo-
rine* Dodon. IB. 3. 516. *lc. i. Tab. hist.* 1100. est
Helleborine Rivin. bey dem Jäger = Hof und Jüfir-
cher Wald, an dunklen Orten, *perenn.*

Helleborine angustifolia palustris sive *pra-
tensis* T. *flore herbaceo intus nonnihil candicante*

IB. 3.

IB. 3. 517. wilde Nießwurk, auf feuchten Wiesen, in dem Ostwinckel, und in dem Graben, vor dem Cronenburger Thor. *perenn.*

Heliotropium majus Diosc T. five *Heliotropium majus* *Clus. hist. XLVII. flore albo monopetalo semine angulato & gibbo infundibuliformi*, Krebs-Blumen, auf denen Fleckern, zu Chrstein auf dem Haulenberg. *ann.*

Hieracium alpinum, *latifolium villosum*, *magno flore* T. *semistofculoso*, *semine papposo* five *Hieracium Alpinum hirsuto folio*, 5 *Clus. CXLI.* breit berg Habich-Kraut, mit haarichten Blättern, oberhalb Niedeck und gegen Dachsburg.

Hieracium asperum majori flore T. & IB. 2. 1029. *luteo semistofculoso* five *Hieracium intybaceum alperum* *Tab. hist. Ic. 6. 492.* rauh schmal blättricht Berg Habich-Kraut, mit grossen Blumen, auf dem Glacis, vor dem Fischer Thor, und an denen Keinen der Flecker. *ann.*

Hieracium dentis leonis folio bulbosum T. five *Intybaceum* *Tab. hist. Ic. 6. 492.* est *Hieracium dentis leonis folio monoclonon sub asperum* CBp. 121. & *sic bis in pinace occurrit quod in prodr. 62. describitur & cum Jeon. Tabern. exacte convenit.* auf dem Gansau, gegen dem Jäger-Hof.

Hieracium pratense latifolium non sinuatum majus Haller. *caule aphylo striato*, breit blättricht Wiesen Habich-Kraut, zwischen Hördt und Brumbt auf denen Wiesen. *vid. Tab. nostr. VII.*

Hiera-

Hieracium
latisol non

pratense
Sinuat. Haller.



J. Striedbeck. sculp.

Hieracium dentis leonis folio obtuso majus T. sive Hieracium longius radiculatum Tab. hist. 1c. 7. 492. Habicht-Kraut, mit Pfaffen-Röhrelein Blättern, und langen Wurkeln, auf denen Wiesen bey Oßwald, an denen Neben bey Baar. *perenn.*

Hieracium minus glabrum, foliis eleganter virentibus T. & CB. prodr. 63. auf denen Aeffern bey Ehrstein *perenn.*

Hieracium murorum folio pilosissimo T. sive Pulmonaria gallica vel aurea 1c. Tab. hist. 1. 504. est Pulmonaria flore luteo 1B. 2. 1033. haaricht Habicht-Kraut, auf alten Mauern und Zächern, in Waldungen. *perenn.*

Horminum sylvestre latifolium verticillatum T. sive Horminum sylvestre Clus. hist. XXIX. flore monopetalo labiato caeruleo, est Horminum spurium Rivin. an denen Landstrassen, und an denen Aeffern, gegen Siegelshelm. *perenn.*

Hydroceratophyllum, folio lævi, octo cornubus armato Vaill. & plus diviso, gehörntes glattes Wasser Garben-Kraut zu Zulfirch, zwischen denen Wörten. *perenn.*

Hyoscyamus vulgaris & niger T. caule folioque piloso, flosculis monopetalis infundibuliformibus luteis striatis, radice alba, fructu campaniformi operculato, Bilsam-Kraut, Jusquiame noir, 1c. Tab. hist. 68. ♂ in Rivin. an denen Landstrassen, in der Ruprechtsau an denen Gärten: Zäunen. *perenn.*

Hype-

Hypericum vulgare T. *floribus luteis rosaceis, foliis glabris conjugatis caule rotundo, fructu tricapsulari* sive *Perforata* IB. 3. 387. *Millepertuis* St. Johannis Kraut, 1c. *Tab. hist.* 1. 1249. *perenn.*

Hypericum ascyrum dictum *caule quadrangulo* T. & IB. 3. 382. sive *Hypericum glabrum non perforatum, caule quadrato sub rubro, flosculis luteis minoribus.* hart Heu, oder St. Johannis Kraut, mit 4. eckichten Stenglen, 1c. *Tab. hist.* 4. 1250. & *Hort. Eyst. Tab.* 247. in denen Wörten bey Zülkirch, in groser Meng, *perenn.*

Hypericum minus erectum T. seu *pulchrum* Tragi IB. 3. 353. Klein aufrecht stehend Johannis Kraut, an dem Weg nach Blobsheim, in dem Brumbter Wald. *perenn.*

Hypericum minus supinum glabrum T. & *repens* sive *Hypericum supinum tertium minimum* Clus. *hist.* CCCXXXI. Klein niedrig kriechend St. Johann Kraut, auf Brach-Weckern, bey Oswald und Zülkirch, *perenn.*

Hypericum elegantissimum non ramosum folio lato T. & IB. 3. 383. hart Heu, ohne Zweig und breiten Blättern, in dem Eckbolsheimer Wald, bey dem Canal, in denen Hecken, auf der Gansau. *perenn.*

Hypericum villosum erectum caule rotundo T. sive *Hypericum Androsænum dictum* IB. 3. 382. Conrads-Kraut, auf dem Paßberg neben denen Hecken, in groser Menge, auf dem St. Ottilien Berg. *perenn.*

Hyssopus officinarum coerulea seu *spicata* T.
 Hyssop

Isop flore monopetalo labiato semine oblongo, Kirch-
Isop, mit blauen Blumen, Ic. 1. Tab. hist. pag.
651. in Gärten, und auf denen Kirch-Höfen.
perenn.

Eadem flore rubro ♂ *albo* T. *ibid.*

Iacea pumila supina purpurea Vaik. pag. 203.
foliis latis integris radice repente, est *Cyanus latifo-*
lius repens CBp. 274. fast auf allen durren gras-
sichten Orten und Wiesen. perenn.

Iacobæa vulgaris laciniata T. & IB. 1057. *flo-*
re luteo radiato semine papposo, St. Jacobs-Blum,
Fleur de St. Jacques Ic. Tab. hist. 485. hin und wie-
der an denen Strassen, perenn.

Iacobæa vulgaris foliis instar Erucae lacinia-
tis T. five *Jacobæa vulgaris altissima*, *foliis ar-*
temesiæ æmulis, St. Jacobs-Blum, mit Bess-
fuß Blättern, an dem Eckbolsheimer Canal,
Schliesse, in dem Gebüsch. perenn.

Iacobæa montana lanuginosa angustifolia
non laciniata T. five *Pannonica*, *folio non laciniato*
IB. 2. 1058. quæ *Iacobæa* 11. Clus. hist. XXII.
gegen Hochfeld, in dem Hohenwald, perenn.

Imperatoria major T. *flore albo rosaceo umbellato*
flore latiore diviso, *radice alba crassa odorata*, *semine*
ovato striato, Meister-Wurzel, Ic. 1. Tab. hist.
238. ♂ in Rivin. Imperatorie, in vielen Gärten.
perenn.

Juncago palustris & vulgaris T. *flore roseo*
five Gramen junceum ♂ *spicatum* sem *Triglochin* IB.
2. 508. gehört lang gespiktes Binsen-Gras in
der Ruprechtsau auf der Schiffmatt. perenn.

Jun-

Juncus nemorosus folio articulofo T. five *Gramen junceum sylvaticum* Tab. hist. 535. est *Gramen rore lucidum nemorense* five *Luzula* 2. 492. Wald Bingen-Gras, in dem Esch-
holzheimer Wald, in denen Gruben, bey der
Ziegel-Hütten, in dem Gansauer Wald. *perenn.*

Juncus palustris humilior repens erectus T. five *Holosticum Matthiol. junceum* IB. 2. 510. quod *Gramen junceum* Tab. hist. Ic. VI. 536. Krotten-
Gras, Crapaudine in allen sumpfsichten Orten.
perenn.

Juncus foliatus minimus IB. 2. 523. gar klein
Binsen-Gras / in sandigen Gruben, neben dem
Canal, häufig. *perenn.*

Juncus lævis panicula non sparsa T. five *Juncus* Matthioli IB. 2. 520. ♂ *fragilis*, glatte Bins-
en, mit gedrungenem Strauß, Wiesen-Bins-
en, Ic. Tab. hist. 565. aller Orten auf feuchten
Wiesen. *perenn.*

Juncus lævis panicula sparsa major T. five
Juncus foliaceus IB. 2. 521. vel *Juncus lævis*
Tab. hist. Ic. 4. 566. gemeine Binsen, in allen
Wasser-Gräben in Sumpfen.

Juniperus vulgaris arbor T. *flore viridi amen-
taceo, radice resinosa, fructu globulari*, Wachholder
Baum, Ic. 2. Tab. hist. 1538. Grand Genevrier,
hin und wieder, in denen Bauren-Höfen, und
Gärten. *perenn.*

Juniperus vulgaris fruticosa T. five *Junipe-
rus vulgaris, baccis parvis purpureis* IB. 1. 293.
*foliis angustis acuminatis pungentibus, baccis nigrican-
tibus*

sibus Ic. 1. *Tab. hist.* 1557. Wachholder Staude, *Genevrier*, vor dem Mauerhof, gegen Oßwald. *perenn.*

Lactuca crispa T. vel 11. *Tabern. hist.* 506. *aut tenuiter dissecta* IB. 2. 2. 999. Endivien-Lattich, *ann. ibid.*

Lactuca romana longa dulcis T. & IB. 2. 998. *folio obscurius virente, semine nigro*, brauner Sommer-Endivien, Florentiner-Salat. *Laitue Romaine ann. ibid.*

Lactuca foliis Endiviæ T. seu *Intybacea* *Tab. hist.* Ic. 4. 806. weiser Sommer-Endivien, *ann. ibid.*

Lactuca folio oblongo, acuto T. *Lactuca longo & angusto fol.* IB. 2. 999. spitziger Lattich, *ann. ibid.*

Lactuca Italica laciniata CBp. pag. 60. *Laitue Royale.* zarter Endivien-Lattich. *ibid. ann.*

Lampfana Dodon. T. *floribus luteis semiflosculis*, five *Sonchus sylvaticus*. *Tab. hist.* Ic. 8. 500. Wald-Sonchen-Kraut, auf Kraut-Alecken, in gleichen an denen Zäunen. *ann.*

Lapathum folio acuto crispo T. *semine triangulari, floribus apetalis* five *Lapathum acutum crispum* IB. 2. 988. Grind-Wurzel, Frause Mengel Wurzel, Ic. 3. *Tab. hist.* 823. & Munting *hist.* pag. 690. *Patience frisée*, *perenn.* an denen Wassers-Gräben, vor dem Spital Thor.

Lapathum folio acuto plano T. five *Lapathum planum paludosum* Munt. *Herb. Britann.* pag. 120. & *Tab. hist.* 822. gemeine Grind-Wurzel, bey

bey vorherstehenden und an dem Rhein Ziegels Ofen, perenn.

Lapathum folio acuto rubente T. five *Lapathum sanguineum*, *Munting. hist.* 691. ☞ *IB.* 2. 988. *alias Sanguis draconis herba.* Drachen Umsper, roth Mengel-Wurzel, *Sang de dragon ou Patience rouge* *IC. Tab. hist.* 824. hin und wieder auf denen Fleckern, in Feldern und Gärten. perenn.

Lapathum folio minus acuto *Lob. IC.* 285. *feu vulgare folio obtuso.* *IB.* 2. 984. auf dem Schießrein und Zülkirch, an dem Wasser. perenn.

Lapathum pulchrum Bononiense sinuatum T. & *IB.* 2. 988. in denen Wörten bey Zülkirch, perenn.

Lathyrus sylvestris major T. *feu dumetorum* *IB.* 2. 302. *flore suave rubente papilionaceo, fructu siliquoso,* *IC. 4. Tab. hist.* 885. la Gesse & H. Eyst. & in Rivin. Waldwicke, in denen Hecken bey Oßwald, perenn.

Lathyrus angustifolius siliqua hirsuta T. five *Lathyrus siliqua hirsuta* *IB.* 2. 305. *est Lathyrus sylvaticus siliqua hirsuta Rivin.* Wicke mit schmableu Blättern, und haarichter Schote, hin und wieder in denen Frucht-Feldern, zu Gravenstaden häufig. ann.

Lenticula palustris quadrifolia CBp. five *Lens palustris quadrifolia* *IB.* 3. 785. *radice repente, vier blättrichter Wasser-Klee.* *Lentille à quatre fenilles* *IC. elegans Mapp. hist. alsat.* 166. ☞ *Tab. hist.* 2. pag.

890. in sumpfsichten Orten , vor dem Fischer und Epithal-Thor. *perenn.*

Lenticula aquatica trifulca CBp. five *Hederula aquatica*. Lobel. *lc.* 2. pag. 36. est *Hederula palustris* Tab. *hist.* 1281. flore dipetalo, Wasser-Linsen, Wasser-Epheu, mit 3. spizigen Blättern, in denen Gräblein am Suren-Graben, wie auch in Gräben, neben der Aubruck. *perenn.*

Lenticula palustris vulgaris CBp. five *Lens palustris* IB. 3. 784. *lc.* Tab. *hist.* 890. ubi *lc.* sed minus accurata. & Vaill. Tab. XX. fig. 2. Wasser- oder Endten-Linsen, in allen stillstehenden Wasser-Gräben. *Lentille d'eau, ou de marais, ann.*

Lenticula palustris superne virens, inferne nigricans, IB. 3. 784. seu potius *Lenticula palustris, foliis majoribus, subtus rubentibus*, Flor Altorf. *lc.* Vaill. Tab. XX. fig. 2. grose Wasser-Linsen, in denen Gräben, bey der Schiffmatt, bey denen Eckbolsheimer Ziegel Ofen. *ann.*

Leucanthemum vulgare T. *caule folioso, flore radiato*; five *Bellis major* IB. 3. 114. Gänse Blumen, grose weise Maßlieben. *lc.* 1. Tab. *hist.* 710. aller Orten auf den Wiesen. *perenn.*

Lichen arboreus five *Pulmonaria arborea* T & IB. 3. 759. *Pulmonaire de Chene, Lichen arborum* *lc.* Tab. *hist.* 1. 1199. Lungen-Moos, Baum Lungen-Kraut, in allen Waldungen, an alten Eich- und Buch-Bäumen. *perenn.*

Lichen pulmonarius saxatilis maximus cinereus. T. Stein oder Felsen Lungen-Kraut, auf dem Ottilien Berg, an denen Felsen. *perenn.*

Lichen cinereus arboreus, marginibus fimbriatis T. an alten Stämmen, der Weyden-Bäumen, in dem Ruprechtsauer Wald. *perenn.*

Lichen pyzidatus, acetabulorum oris coccineis & tumentibus T. an Stämmen, abgefauter Bäume, in dem Gansbauer Wald, und an denen Steinen, St. Ottilien Gebürgs. *ann.*

Lichen cinereus vulgaris capillaceo folio minor T. five Muscus arboreus cum & sine orbiculis, Baum-Moos, blühend ästiges Baum-Moos. *lc. 2. & 3. Tab. hist. 1195. in Wäldungen, zwischen denen Nestern, erwachsener Eich-Bäume, perenn.*

Lichen cinereus latifolius ramosus T. five Muscus arboreus coralloides CBp. *lc. Vaill. Tab. XX. fig. 6. Baum-Moos mit Zweigen, an denen Eich-Bäumen, in dem Wald, zu Schweighausen. perenn.*

Lichen capillaceus longissimus, ex fago & abiete pendens T. coroll. an Muscus arborcus barbatus IB. 3. 764. groß hangend Baum-Moos, an alten Eich und Birken-Bäumen, zu Schweighausen. *perenn.*

Lichen fruticosus pendulus candicans, extremitatibus cauliculorum umbilicatis coccineis! Mapp. *hist. alf. 170. in den XV. Wört, in einem quellenden Wasser-Loch.*

Lichen petræus latifolius, five Hepatica fontana CBp. & IB. 3. 758. est Lichen Fuchs. *ubi lc. elegans 476. Brunnen oder Steinleber-Kraut, in denen unsaubern Brunnen-Bütten. perenn.*

Li-

Lichen petræus stellatus aut Lichen. 2. Lob. Ic. 246. est Hepatica secunda Tab. hist. Ic. 2. pag. 1200. Stein Leber-Kraut, in wässerichten und schattichten Gärten.

Lichen petræus umbellatus five 3. Lob. Ic. 246. vel Hepatica III. Tab. hist. pag. 1200. bey Quellen und Bächlein, in dem Urbis-Thal, auch in feuchten Gärten.

Lichen minimus foliolis laciniatis. Ray. hist. 126. bey dem St. Ottilien Brunnen, an denen Felsen, neben der Quelle.

Lilium montanum floribus reflexis rubentibus T. radice flava squamata, fructu oblongo, five Lilium flore rubente ferrugineo majus & minus IB. 2. 692. est Martagon vulgare Tab. hist. 4. 1029. & Garidel hist. plant. Tab. 63. wilder türckischer Bund, oder Gold-Wurzel, Heyden-Lilien, auf denen Gebürgen gegen Hochfeld. perenn.

Lilium montanum floribus reflexis albis non punctatis T. Gold-Wurzel, mit ganz weißen Blumen, auf dem Hochfeld, und eine Stund hinter Hochfeld. perenn.

Lilium floribus reflexis montanum, flore maculis rubris inordinatis adperso T. five Lilium montanum flore purpurascence punctato HEyft. Gold-Wurzel, mit punctirten Blumen, auf dem Gebürg, bey Girrbaden, perenn.

Lilium floribus reflexis alterum lanuginosum hirsutum T. five Lilium montanum, vel sylvestre 1. majus Clus. hist. 134. Berg-Lilien, bey

Mollkirch, auf dem Gebürg, bey den 3. Aehren *perenn.*

Lilium purpureo croceum majus T. Feuer oder Gold-Lilien, five *Lilium rubens majus* IB. 2. 688. auf dem Hochgebürg, hinter Kapolsweyer, in groser Menge. *perenn.*

Linaria pumila arvensis vulgatio T. seu *Antirrhinum minus arvense*, floribus *monopetalis personatis*, fructu *subrotundo* Ic. Tab. hist. 4. 1236. & in Rivin. est *Antirrhinum minimum* IB. 3. 465. wild Löwen-Maul, Klein Feld-Orant, hin und wieder auf denen Fleckern *ann.*

Linaria flore pallido rictu aureo T. five *Linaria Pannonica* r. Clus. hist. 322. Lein oder Flachskraut, mit bleich gelben Blumen, auf aufgeworrenen Gräben, und an denen Strassen. Ic. Tab. hist. 1. 1208. *perenn.*

Linaria vulgaris lutea, flore *maiore* T. & IB. 3. 456. *Lin sauvage*, Lein-Kraut, mit schönen großen gelben Blumen, Ic. Tab. hist. T. 1210. bey allen Lüften, bey denen Sand-Gruben, an der Landstraß gegen Molkheim. *perenn.*

Linaria vulgaris lutea flore minore T. an dem Zaun des Schliessenmeisters Garten, am Canal, auf dürren Wiesen bey Oßwald.

Linaria vulgaris flore majore alba T. *rictu aureo* Lein-Kraut, mit weissen Blumen, auf einem kleinen Hügel, vor dem Bad zu Gulk, an denen Zäunen bey der Eckbolsheimer Ziegel-Hütte, bey der ersten Bleich, unterhalb dem Wasser Zoll. *perenn.*

Linaria

Linaria segetum nummulariæ folio villoso T. *ex albido flavescente*, sive *Elatine folio subrotundo* IB. 3. 372. niedrig Acker Lein-Kraut, mit bleich gelben Blumen und Epheu-Blättern, Ic. I. Tab. 1091. In Rivin. auf denen Fincht-Aeckern nach vollendter Erndte, zu Züllich und Obwald ann.

Linaria segetum nummulariæ folio auriculato villoso, flore luteo T. sive *Elatine fæmina folio anguloso* IB. 3. 372. niedrig Klein Acker Lein-Kraut, mit rauhen Blättern, Ic. Tab. hist. 2. pag. 1091. zu Barr, in denen Gruben am Weg, wenn man auf hohen Landspurger Schloß gehen will. ann.

Linum arvense T. flore *caryophyllæo cœruleo fructu globoso*, wilder Flachs, auf den Aeckern bey Zulenheim, unter dem Habern, auf dem Glacis, bey dem Rheingiesen, ann.

Linum sativum T. seu vulgare *cœruleum* zahmer oder Weiber-Flachs, Spinn-Flachs: Ic. Tab. hist. 1205. auf denen Aeckern. ann.

Linum sylvestre angustifolium, floribus dilute purpurascens, vel carneis T. sive *Linum sylvestre* VI. *angustifolium* Clus. hist. 318. est *Linum* III. Tab. hist. pag. 1207. wilder Lein oder Flachs-Kraut, mit rothlichten Blumen, und schmahlen Blättern, zwischen Obwald und Graubünden, auf dem Steinbruch, bey dem Sulzbach häufig. perenn.

Linum sylvestre angustis & densioribus foliis, flore minore T. sive *Linum sylvestre tenuifolium*

nuifolium Lob. lc. 413. est Linum sylvestre IV. Tab. hist. 1207. schmahl blättrichter wilder Glachs, auf der Wiesen zu Ostwald häufig. *perenn.*

Linum pratense flosculis exiguis T. seu Linum minimum IB. 3. 455. est Linum Catharticum Wedel. Klein Wiesen Glachs, Klein Vogel-Kraut, auf Wiesen zwischen dem Ostwinckel und Hohenwart, in der Ruprechtsau, wie auch in der Elsau und Kalltau. *perenn.*

Lithospermum majus erectum T. sive Lithospermum aut Milium solis IB. 3. 500. *floribus monopetalis infundibuliformibus albis* sive Lithospermum arvense Tab. hist. 1234. Gremil ou Herbe aux Perles, Meer oder Stein-Hirse, in der Ruprechtsau am Garten, bey der Aubruck im Ostwinckel. *perenn.*

Lithospermum arvense minus floribus luteis, vel luteo coeruleis T. kleine blaugelbe Mauß-öhrlein, mit harichten Blättern, vor dem Spital Thor, auf denen Frucht-Feldern bey Niederhauffbergen. *ann.*

Lithospermum arvense minus T. sive Echium scorpioides solis equum, flore minore IB. 3. 589. *coeruleo monopetalo infundibuliformi, folio integro aspero*, blaue Mauß-Dehrlein, lc. I. Tab. hist. 511. *petit gremil*, auf allen ungebauten Feldern. *ann.*

Lithospermum arvense medium, flore coeruleo Vaill. sive Auricula muris Lob. lc. 461. grose blaue Mauß-Dehrlein, mit harichten Blättern,
tem,

tern, in der Ruprechtsau in trockenen Gräblein, in dem Gansauer Wald.

Lithospermum arvense medium, flore albo Mappi hist. alsat. pag. 179. grose weise Maug-Dehrlein, in dem Barrer Wald, nahe der Erbsgrub, gegen Hochfeld. *ann.*

Lotus seu *Melilotus pentaphyllos minor glabra* T. five *Trifolium filiquosum, fructu subrotundo*, Tab. hist. Ic. a. 905. est *Lotus corniculata glabra minor* IB. 2. 356. fünff blättrichter *Lotus*, kleiner Schoten-Klee, auf denen Wiesen in der Gansau, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Lotus corniculata hirsuta minor T. IB. 2. 356. kleine Vogelwicke, mit rauhen Blättern, in sandigen Orten, in steinichten Gruben, bey der Rheinbruck. *perenn.*

Lupinus sylvestris flore luteo T. floribus *papilionaceis, foliis digitatis seu stellatis, fructu siliquoso*, Wicken Bohnen, Lupinen, *Lupin. Ic. 3. Tab. hist. 881.* in Gärten, und Gartners-Feldern. *ann.*

Luteola herba salicis folio T. five *Lutea* Plinii quibusdam IB. 3. 465. *integro folio, flore luteo polypetalo anomalo.* Streich-Kraut, *Gande ou herbe à jaunir* Ic. Tab. hist. 319. auf denen Wäldern / und auf allen Glacis. *perenn.*

Lychnis segetum major T. five *Pseudomelanthium* IB. 3. 314. ♂ *HFyst. Ic. 5. Tab. hist. 674.* Raden, unter der Frucht, aller Orten. *ann.*

Lychnis segetum rubra foliis perfoliatæ T. *Vaccaria dicta* IB. 3. 357. Ic. Tab. hist. 3. 1253. Rüb-Kraut, in denen Sommer-Feldern. *ann.*

Lychnis segetum rubra, foliis perfoliatæ, flore pallido T. Rüb-Kraut, mit bleich rothen Blumen, auf denen Aeftern gegen Niederhaufbergen. ann.

Lychnis sylvestris angustifolia, caliculis turgidis striatis T. folio incano, sive altera incana, Lobel. Ic. 338. Wald-Rößlein, mit aufgeblasenen und gestrieten Kelchen, Passe fleur. aller Orten auf der Glacis perenn.

Lychnis sylvestris latifolia, caliculis turgidis striatis T. foliis hirsutis, sive *Lychnis sylvestris* III. Clus. hist. caliculis striatis, & Lob. Ic. 339. zu Waslenheim. perenn.

Lychnis papaver spumeum angustifolia glabra, flore purpureo Moris, Prælug. 284. & T. caule inferius intense rubro, auf dem Glacis, vor dem Spithal-Thor, gegen der Ill. perenn.

Lychnis sylvestris quæ saponaria vulgo T. sive *Saponaria vulgaris* IB. 3. 346. flore ex albidulo purpurascente rosaceo, folio glabro. Savoniere, Geiffen-Kraut, an denen Strassen, bey Hohnheim. perenn.

Lychnis sylvestris, quæ *Saponaria vulgo*, apicibus violaceo purpureis, & majoribus odoratis, Geiffen-Kraut, mit Viol blauen Zünglein, bey Hohnheim häufig. perenn.

Lychnis sylvestris, quæ *Saponaria vulgo*, flore albo. Vaill. Geiffen-Kraut, mit weissen Blumen, oberhalb Blobsheim, auf der Kraft, am Wasser, perenn.

Lyfima-

Lyfimachia humifusa, folio rotundiore, flore luteo. T. *monopetalo rotato*, fructu globoso, five *Nummularia* vel *Centimorbia* IB. 3. 370. Pfennig oder Egel-Kraut, 1c. Tab. hist. 1261. auf feuchten Wiesen, bey der Schlut, bey allen Lufften, perenn.

Malva vulgaris folio sinuato, flore majore T. *monopetalo campaniformi*, fructu orbiculari five *Malva sylvestris* major, Papellen, Ros-papellen, mit gestrißten rothen Blumen, auf ungebauten fetten Orten, in denen Hecken, in der Ruprechtsau. perenn.

Malva vulgaris flore minore, folio rotundo, T. & IB. 2. 949. five *Malva sylvestris* minor Tab. hist. 1150. *Petite Mauve*, gemeine Röß oder Gänse papellen, an denen Wegen, aller Orten, an der Mauer alter Stadt-Gräben, perenn.

Matricaria tanacetifolio, flore minore, femine umbilicato T. oblongo, five *Tanacetum inodorum* II. Clus. hist. 338. Berg Mutter-Kraut, mit kleinen Blumen ohne Geruch, auf dem Gebürg, in dem Urbis-Thal, oberhalb Kayfersberg, perenn.

Matricaria tanacetifolio flore majore, femine umbilicato T. five *Tanacetum inodorum* I. Clus. hist. 338. Berg Mutter-Kraut, mit grossen Blumen, auf dem Hochgebürg zu Kap-polstein / und oberhalb Dusenbach, in denen Gebüsch. perenn.

Medica sylvestris floribus croceis T. five
L 5 Medi-

Medica flavo flore Clus. hist. CCXLIII. est Lens major repens, *Tab. hist. lc. 123.* in Rivino nominatur Falcata, nobis vero Medicago est sylvestris, *floribus croceis papilionaceis, fructu falcato*, Sichel-Klee, grose kriechende Linsen, mit gelben Blumen, auf der Contrescarpe, vor dem Cronenburger und Steinstrasser Thor ganze Blatz voll. *perenn.*

Melampyrum coma purpurascens T. *flore monopetalo personato* & in Rivin, five Triticum vaccinum IB. 3. 439. *fructu subrotundo bifario*, Buch oder Rüh-Weizen, Wachtel-Weizen, *Ble de Vache*, in der Frucht, zu Eingselheim und Oßwald. *ann.*

Melampyrum coma coerulea T. five Melampyrum sylvaticum Rivin lc. 1. *Tab. hist. 553.* Wald Rüh-Weizen, mit blauen Strauß, in dem Ostwinckel und Wald, zu Zabern. *ann.*

Melampyrum cristatum, flore purpureo albo T. ♂ IB. 3. 440. *rectu luteo, foliis angustis*, in denen Frucht-Neckern, zu Ittenheim.

Melampyrum luteum latifolium T. *rectu albo* gelber Rüh-Weizen, est Milium sylvaticum lc. 1. *Tab. hist. 555.* auf dem St. Ottilien Gebürg, auf der Oßwalder Nacht-wende. *ann.*

Melampyrum flore albo Mapp. hist. Alsat. p. 190. Buch-Weizen, mit weissen Blumen, zwischen Inlenheim und Niederebenheim, auf dem Paßberg, zu Buchsweyler. *ann.*

Melilotus officinarum Germaniæ T. *flore luteo*

teo papilionaceo odorato, radice longa alba, seu Melilotus vulgaris, flore luteo IB. 2. 370. est *Melilotus Germanica* Lobel. Icon. 43. & Tab. hist. 895. ut & in Rivin. *Melilot*, gemeiner Stein-Klee, in der Ruprechtsau, und zu Lingelsheim, auf den Feldern. *perenn.*

Melilotus officinar, germaniæ, flore albo T. *semine subrotundo*, weiser Stein-Klee, an dem Canal, bey Eckbolsheim, bey denen Schanzen vor dem Fischer-Thor, auf der kleinen Insel, bey der Rhein-Bruck. *perenn.*

Melilotus vulgaris altissima frutescens, flore albo T. hoch aufgeschossener Stein-Klee, mit weissen Blumen, zwischen beyden Rhein-Brucken, auf denen aufgeworfenen Werckern.

Melilotus vulgaris altissima frutescens, flore luteo T. groser Stein-Klee, mit gelben Blumen, bey dem Mauerhof, am Canal, zu Eckbolsheim, bey der Brucken, zwischen beyden Rhein-Brucken, an dem Weg. *perenn.*

Melilotus major odorata violacea T. Stie-
bengezeit, mit blauen Blumen, *Lotier bleu* Ic. Tab. hist. 896. auf grasichten Boden, bey dem Engelländischen Hof. *perenn.*

Melissa hortensis T. seu *vulgaris, odore Citri* IB. 3. part. 2. 232. *floribus monopetalis labiatis albis, semine subrotundo*, *Melisse*, Mutter-Kraut, Ic. Rivin & Tab. hist. 757. *perenn.*

Melo rotundus parvus T. five *Sacharinus* Tab. hist. Ic. 3. 856. *flore monopetalo campaniformi, fructu luteo ovato*. *Melon sucrée*, Zucker-Melonen, in Gärten, *ann.* Melo

Melo vulgaris T. & IB. 2. 242. gemeine Melonen, Ic. 1. Tab. hist. 885. *ibid.* ann.

Melo reticulatus T. & IB. 2. 244. Netz-Melonen, *ibid.* ann.

Mentha sylvestris rotundiore folio T. five Menthastrum, folio rugoso rotundiore, flore albo monopetalo labiato spicato, odore gravi, Ic. IB. 3. part. 2. pag. 219. wilde Münz, wilder Balsam, Menthe sauvage Ic. Tab. hist. 729. vor dem Spithal-Thor, auf dem Schießrein, bey Ostwald an der Landstraß. *perenn.*

Mentha sylvestris longiore folio T. five Menthastrum spicatum, folio longiore candicante, IB. 3. p. 2. 221. hirsuto, floribus sub purpurei coloris spicatis, Roß oder Pferd-Münze, Ic. Rivin & Fuchs hist. plant. Matthiol. Epitom. 489. Mente sauvage. an denen Rändern der Wasser, gegen der grünen Wart, und andern Orten mehr. *perenn.*

Meum fol. anethi T. five Meum vulgare IB. 3. p. 2. 11. florib. alb. rosaceis umbellat. Ic. Clus. hist. CXCVIII. ♂ in Rivin. Bärrwurk, Bären-Fenchel, auf der Wiese, des Hochgebürgs Hochfelds, häufig. *perenn.*

Millefolium nobile T. five Tanacetum minus album, odore camphoræ, vel Achillea millefolia odorata, IB. 3. 140. weiß edel Garben-Kraut, auf Brach-Weckern zu Ostheim. *perenn.*

Muscus squamosus vulgaris repens clavatus T. five Lylopodium Tab. hist. Ic. 3. 1199. Julis semine farinaceo refertis Paté. de Loup. Bärlapp, St. Joh.

Joh. Gürtel, in dem Gebürg, hinter Waslenheim, in dem Börser Wald, hinter dem St. Ottilien Gebürg. *perenn.*

Muscus capillaceus major, pediculo & capitulo crassioribus T. five *Adiantum aureum* *Tab. hist. pag. 1186.* Tausend Gulden Wiedersthon, *Perce mouffe*, an feuchten sumpfigen Orten, hinter Ottrott. *perenn.*

Nasturtium hortense crispum latifolium T. *flore albo simplici cruciformi, fructu subrotundo*, frauser groß blätterichter Garten-Kresse, *Cresson frisee à feuilles larges* Ic. CB. *prodr. 44.* ☞ *Tab. hist. Ic. IV. 842.* in Gärten. *ann.*

Nasturtium hortense latifolium T. breiter Garten-Kresse. Ic. Matthiol. *Epitom. 156. ann.*

Nasturtium sylvestre capitulis cristatis T. five *Nasturtium verrucosum* IB. 2. 919. *foliis coronopi, flosculis albis cruciformibus*, Ic. *Tab. hist. 4. pag. 302.* Feld-Kresse, an denen Wegen und ungebauten Orten, auf dem Schießrein. *ann.*

Nasturtium sylvestre tenuiter incisum, fructu minori T. five *Thlaspi angustifolium* Fuchs. Ic. *Tab. 16. 853.* Besam-Kraut, an denen Wegen vor dem Spithal-Thor, vor dem Steinstrasser Thor, an der Landstraß, nach Schiltigheim, neben denen Aeftern, *ann.*

Nasturtium sylvestre tenuissime divisum T. Kleiner wilder Kresse Weg-Kresse, neben den Aeftern am Pfad-Weg, nach Eckbolsheim, bey der Carthaus häufig. *ann.*

Nymphæa alba major T. *flores rosaceo multipli-*

ci radice tuberosa longa & filamentosa. IB. 3. 772. & Tab. hist. 1. 1117. Nenufar blanc, weisse Wasser-Lilien, weisse See-Blumen, in dem Graben auf der Wiese, bey der grünen Wart häufig, perenn.

Nymphæa lutea major T. fructu globoso multicapsulari & IB. 3. 771. 1c. Tab. hist. 3. 1118. & HEYST. Nenufar jaune, gelbe See-Blumen, in denen Stadt-Gräben, vor dem Juden-Thor, bey Grabenstaden, bey dem Zoll. perenn.

Nymphæa alba minor H. EYST. kleine weisse See-Blum, in stillen Wassern, zwischen Obwald und Grabenstaden, in dem Gräblein hinter dem Rhein Ziegel-Ofen, perenn.

Nymphæa alba minima, foliis asari, floribus tripetalis albis longis pediculis, radice filamentosa longa, nobis; quæ Ranæ morsus Tab. hist. 1c. pag. 1131. Grosch-Biß, in allen Gräben um die Stadt. perenn.

Oenanthe aquatica T. sive Filipendula aquatica IB. 3. part. 2. 191. Tab. hist. 1c. 4. 424. flosculis albis, rosaceis umbellatis, semine oblongo striato & in Rivin. Wasser Stein-Brech, auf allen sumpfigen Wiesen, in Gruben, vor dem Spithal-Thor. perenn.

Oenanthe seu Filipendula aquatica altera IB. 3. part. 2. 192. quæ Ruta palustris Tab. hist. 1c. 2. 421. Wasser Filipendel Wurzel, zwischen Arbogast und dem Wicshäusel, in sumpfigen Gruben, perenn.

Ophioglossum vulgatum T. sive Ophioglossum
IB. 3.

IB. 3. 708. *flosculis in oculos non cadentibus foliis, crassiss, angustis oblongis, fructu lingulato* Ic. Tab. hist. 1232. *Natter-Zünglein, Langue de serpent*, auf denen Bergmatten / bey Baar und hohen Andlau, *perenn.*

Ornithopodium majus T. seu *Ornithopodium*, *flore flavescente* IB. 2. 313. *papilionaceo, siliqua recurva articulata, radice tuberculis nodosa, fructu siliquoso articulo falcato, semine subrotundo*, Vogel Fuß-*Worte*, auf durren Aeffern, bey Bofsheim, in dem obern Ried. *ann.*

Ornithopodium minus T. five *Perpusillum* *Ornithopodium*, Lob. Ic. 82. auf brachliegenden Aeffern, bey Hagenau und Schweighausen, *ann.*

Orchis muscam referens major T. five *Orchis myodes*, *flore grandiusculo* IB. 2. 767. *testiculata absque calcari, flore grandiusculo*, große Mücken präsentirende Stendel-Wurzel, in ausgesteckten Eßlöchern, und andern trockenen grasichten Orten zu Holzheim / *Orchis semblent une grande Mousche* Ic. Tab. hist. 3. 1050. ♂ Lob. Ic. 182. *perenn.*

Orchis palmata montana, maculata, flore variegato, Mapp. five *Palmata maculata* IB. 2. 775.

Orchis corpus muscæ referens minor T. *testiculata, sine calcari, five Orchis Myodes galea est alis herbidis* IB. 2. 761. Vaill. p. 147. est *Orchis Myodes* 1. Lob. Ic. 181. *Kleine Stendel Wurzel*, mit grünen Mücklein, auf dem Haulenberg häufig *perenn.* Or.

Orchis muscam referens lutea T. sive *Orchis Myodes lutea* IB. 2. 768. *testiculata cum calcaribus foliis tribus* Ic. Tab. hist. 2. 1050. gelb Stendel-Wurzel, in dem Zilficher Wald. perenn.

Orchis, parva seu Monorchis flosculis luteis minoribus moschum olentibus, bulbo unico, nobis, quæ Orchis parva autumnalis lutea IB 3. 768. gelb wohlriechend Knaben-Wurzel, mit einer Ziebel, zu Hangenbiethem und auf dem Haulenberg.

Orobanche hypopitys lutea Dillen cat. Giff. 99. quæ *Hypopytis Rivin. floscul. muscosis clausis, in spicam congestis fructu oblongo quinquecapsulari*, gelbe Wald-Wurzel, oder Schuppen-Wurzel, in dunklen und schattichten Waldungen, hinter dem Ottilien Berg. perenn.

Osmunda foliis lunatis T. sive *Ruta lunaria*, Tab. hist. Ic. 413. *Lunaria Botrytis* IB. 3. 709. Fleisne Mond-Raute, *Lunaire*, auf dem Gebürg, bey dem Lichtenberger Schloß, und hinter Wassenburg, in dem Dettweiler Wald häufig. perenn.

Oxycoccus sive Vaccinia palustris T. & IB. 7. 525. *flore albo rosaceo fructu globoso* Moosbeeren, Kesselbeeren, Canneberge zu Boselshausen, und in dem Hagenauer Forst. Ic. H. Eyst. perenn.

Pedicularis serotina, purpurascente flore T. sive *Euphrasia parva purpurea* IB. 3. 433. est *Odontites* Tabern. & Rivin. rother Augen-Trost, Wiesen Nödel, zu Oßwald, auf denen Wiesen, wie auch zu Gravenstaden. ann.

Pedicularis serotina flore albo Vaill. Wiesen Nödel mit weissen Blumen, auf feuchten Wiesen

sen zwischen dem Mayer-Hof, und dem Eckbolsheimer Ziegelofen *ann.*

Pentaphylloides palustre rubrum T. five *Quinquefolium* seu potius *Heptaphyllum flore rubro* *IB.* 2. 398. est *Quinquefolium palustre* *Tab. hist. Ic.* 12. 354. *foliis superne viridibus, inferne cinereis serratis, floribus purpureis rosaceis* *Ic. Hort. Eyst.* auf sumpfrichten Wiesen, zu Wört, zu Wimmenau, hinter Buchsweyler. *perenn.*

Pepo oblongus T. *flore luteo monopetalo campaniformi fructu oblongo* *Ic. Tab. hist.* 8. 857. grose gemeine Kürbse, hin und wieder an denen Reizen der Neben, auch ganze Aecker voll, aller Orten auf dem Land. *ann.*

Pepo vulgaris T. five *major rotundus, flore luteo folio aspero non maculato*, quæ *Cucurbita* five *Zucha* *IB.* *Ic.* 2. 218. grose runde Kürbse *ibid.* *ann.*

Pepo vulgaris five *Cucurbita major*, *foliis asperis albis maculis pictis, fructu rotundo* nobis. grose runde Kürbse, mit rauhen weiß gesprenckelten Blätteren, *ibid.* *ann.*

Peucedanum germanicum T. *flore rosaceo umbellato semine ovato* five *Peucedanum minus Germanicum* *IB.* 3. *part.* 2. 36. vel *Peucedanum Foeniculum porcinum* *Lobel. Ic.* 781. *Ic. Tab. hist.* 1. 163. est *Hippomarathrum* *Rivin.* Haar Strang, auf der Contrescarpe, vor dem Metzger-Thor, auf denen Wiesen, zu Obwald, *perenn.*

Phaseolus vulgaris T. five *Smila hortensis*

IB. 2. 255. flore papilionaceo purpureo, foliis ternis uno pediculo scandente, absque capreolis, fructu longo, semine reniformi, gemeine Bohnen, mit rothen Blumen, Ic. Tab. hist. 876. & Lobel. 59. in Gärten, und auf denen Feldern, ann.

De hoc genere plures dantur species & varietates quoad fructum, & colorem. vide Tournef. Inst. pag. 412. die man bey denen Ackerleuten findet.

Phaseolus major HLB. five Smilax hortensis major, fructu ex rubro & nigro variegato, flore coccineo. grose gemahlte Türkische Bohnen, in Gärten, ann.

Phaseolus major five Smilax hortensis major fructu ex rubro & nigro variegato, flore candido. grose gemahlte weisse Bohnen, mit weissen Blumen, ibid. ann.

Phellandrium T. & Rivin. vel Cicutaria aquatica quorundam IB. 3. part. 2. 183. tenuifolia flore rosaceo umbellato albo, caule crasso, semine gibbo leviter striato, & Tab. hist. Ic. 3. 1170. Cique en marais, in Gräben, stillstehender Wasser, indem Graben gegen der Ziegel-Hütte, wenn man an Wasser-Zoll gehen will, perenn.

Polygala major T. & IB. 3. 357. flore anomalo polypetalo personato, folio longo & angusto, fructu compresso, semine oblongo, blaue Kreuz-Blümlein, Tab. hist. Ic. 2. 1212. an feuchten Wiesen, und andern grasichten Orten, bey Heiligenstein. perenn.

Polygala major alba T. Kreuz-Blümlein, mit weissen Blumen, Ic. 1. Tab. hist. 1212. ibid. perenn.

Polygala major purpurea Tab. hist. Ic. 3. 1212. rothe Kreuz-Blümlein. Poly-

Polygala vulgaris T. sive *Polygalon multis* IB. 3. 386. vel. *Polygala cœrulea* Tab. hist. Ic. 5. 1213. gemeine blaue Creuß-Blümlein, Ic. Hort. Eyst. auf allen feuchten Wiesen, und andern grasichten Orten. perenn.

Polygala alba T. & Tab. hist. Ic. 7. 1213. Kreuz-Blümlein, mit weissen Blumen, ibid. perenn.

Polygala purpurea T. & Tab. hist. Ic. 6. 1213. rothe Kreuz-Blümlein, ibid. perenn.

Potamogeton rotundifolium T. folio rotundiore IB. 3. 776. flore cruciformi spicato purpureo, Ic. Tab. hist. 1117. Saam-Kraut, mit runden Blättern, Epideau, in denen Stadtgräben, bey dem Spithal-Thor. perenn.

Potamogeton foliis crispis sive *Lactuca rana-rum* T. seu *Fontinalis crispa* IB. 3. 778. Frosch-Lattich, mit krausen Blättern, in dem Spithal-Graben, in Wasser-Gräblein, in der Nusprechtsau, perenn.

Potamogeton longo ferrato folio T. potius undulato alterno & lucido sine pediculo, est *Lapathum fluitans*, longo ferrato folio IB. 2. 988. Hecht-Rock, in der Zll häufig.

Potamogeton foliis latis splendentibus T. *perfoliatis*, sive *Potamogeton altera Dodonæi* IB. 3. 778. Saam-Kraut, mit breiten glänzenden Blättern, ibid.

Potamogeton foliis angustis & undulatis T. *floribus Muscatellæ*, schmahl blättricht Samm-Kraut, mit Wollen gestalten Blättern, auf der Kaltau, in denen Gräben, auch auf dem Wasser,

ffen, in denen eingefaßten Wasser = Quellen,
perenn.

Potamogeton flosculis ad foliorum nodos
T. *albis cruciformibus* five Myriophyllum aquati-
cum minus Clus. hist. CCLII. Saam Kraut, mit
Blumen, an denen Gleichen der Blätter / in
denen fließenden Wasser = Gräben, in der Ru-
prechtsau, und auf dem Krümmerich, bey dem
Wickhäusel. perenn.

Potamogeton alpinum plantaginis folio T.
alternis oblongo leviter undulato, five Fonti-
nalis lucens major Ic. 3. 1B. 777. Saam-Kraut,
mit Wasser Wegerich-Blättern, in der Ill häufig,
bey Osward. perenn.

Potamogeton graminifolium fluviatile flo-
sculis ex alis foliorum prodeuntibus, ex viridi albican-
tibus nobis, seu Fluviatilis gramineo folio po-
lycarpos. Vaill. pag. 54. auf dem Wacken, in
einem eingefaßten Quell = Wasser = Brunnen, in
dem Rhein-Giessen. perenn.

Potamogeton minus, foliis densis mucrona-
tis non ferratis Bot. Monsp. five Fontalis media
lucens, Ic. 1B. 3. 777. spizig Saam-Kraut, in
sumpfichten Wassern auf dem Wacken,
in dem Eckbolsheimer Wald, in denen leis-
michten feuchten Gruben. perenn.

Potamogeton ramosum angustifolium T.
& 1B. 3. 778. flosculis pusillis uvæ in modum conge-
stis Moschatellinae similibus, Nestig Saam-Kraut,
mit schmahlen Blättern, in der Ill, zwischen de-
nen Fischer-Pfählen, und Reisen zu Osward.

Pota-

Potamogeton caule compresso, foliis graminis canini Ray hist. 189. Saam-Kraut, mit Graß-Blättern, in stillstehenden Wasser-Gräben, bey Gravenstaden, wie auch in der Zu bey Ostwald häufig. *perenn.*

Ptarmica vulgaris folio longo ferrato T. & IB. 3. 147. *flore albo radiato*, wilder weiser Bertram, weisse Rhein-Farn, lc. Tab. hist. pag. 1164. auf feuchten Matten zu Ostwald, an denen Wasser Gestaden, bey der Gallen-Matt, *perenn.*

Pyrola rotundifolia major T. *fructu subrotundo, flore viridi rosaceo, folio crenato*, sive *Pyrola* IB. 3. 533. lc. Tab. hist. 1139. ♂ in Rivin. *Pyrole à feuilles, larges & rondes*, Apfel Wintergrün, Wald-Mangoldt im Hörter-Wald, auf denen Bergmatten, zu Barr häufig. *perenn.*

Pyrola folio mucronato ferrato T. sive *Pyrola folio ferrato* IB. 3. 536. est *Pyrola* 11. Clus. hist. CXVII. *Pyrole à feuilles pointues*. Wintergrün, mit spizigen Blättern, Wald-Mangold mit Birn-Laub, in dem Hörter-Wald, zu Dorlisheim, auf den Bergen. *perenn.*

Quinquefolium folio argenteo T. sive *Pentaphyllum erectum, foliis profunde sectis subtus argenteis, flore luteo* IB. 2. 398. *rosaceo*. quod *Quinquefolium petraeum majus* Tab. hist. lc. 10. 353. aufrecht stehend 5. Finger-Kraut, mit silberfärbigen Blättern, neben den Wegen, an Gärten, zu Ostwald, auch in dem Ostwinckel, und an steinichten Orten, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Ranunculoides folio circinato, tenuissime
diviso Act. Reg. Scient. pag. 48. 1719. & Vaill.
Bot. Paris. 143. *in ima parte cornu cervin. exprimen-*
te, flosculis rosaceis albis, pediculo nudo insidentibus
longiori, est Millefolium aquat. minus Clus.
hist. CCLII. Grenouillette, gehört Wasser-Gar-
be, in dem Graben, vor dem Spithal-Thor,
bey der ersten Brücke häufig, in dem Graben,
hinter der Schiffmatt. *perenn.*

Ranunculus palustris longifolius major T.
five Ranunculus lanceatus major Tab. hist. Ic.
17. III. est Lingua Plinii IB. 3. app. 365. groß
lang blättricht Wasser Hahnen-Fuß, in feuchten
sumpfichten Orten, bey dem Eckbolsheimer Zie-
gel-Ofen. *perenn.*

Ranunculus palustris minor T. Ic. 18. Tab.
hist pag. III. five Ranunculus longifolius, aliis
Flammula IB. 3. app. 864. kleiner langblättrich-
ter Wasser Hahnen-Fuß, ibid. und zu Osward
auf feuchten Wiesen. *perenn.*

Ranunculus palustris ferratus T. five Ranun-
culus lanceatus ferratus Tab. hist. Ic. 19. pag.
112. Sumpf Hahnen-Fuß, mit eingeschnittenen
Blättern, vor dem Fischer-Thor, auf der Wie-
se oberhalb der Schiffmatt, in denen Pfützen,
vor dem Miegger-Thor. *perenn.*

Ranunculus palustris folio sagittato maxi-
mo

mo T. feu Sagitta major IB. 3. 790. flore rosaceo albicante, groß Pfeil-Kraut, Queue d'aronnelle, oberhalb der grünen Wart, wo man auf Oßwald zu gehet, und in denen Gräben um die Stadt. perenn.

Ranunculus palustris folio sagittato minori, T. five Sagitta IB. 1. 790. Tab. hist. Ic. 2. pag. 1121. Klein Pfeil-Kraut, in Wasser-Bächlein bey Arboast und der grünen Wart. perenn.

Ranunculus palustris folio sagittato angustiori T. five Sagitta minor angustifolia IB. 3. 790. Ic. Tab. hist. 3. pag. 1121. in denen Stadt-Gräben und sumpfigten Orten am Canal. perenn.

Rapa fativa oblonga feu Fæmina T. feu Rapum oblongum sativum IB. 2. 838. flore luteo cruciformi siliquoso, lange Winter-Kuben, Rave Ic. Tab. hist. 797. auf Aecfern aller Orten. ann.

Rapa rotunda radice candida T. five Rapum sativum rotundum IB. 2. 838. est Rapum vulgare Tab. hist. 790. Rave commune, gemeine runde Kuben, ibid. ann.

Rapa fativa rotunda minor vel Rapum rotundum minus, Ic. Tab. hist. 2. 790. frühe Kube, oder Stupfel-Kube, auf denen Gartners-Feldern, ann.

Rapa major fativa orbiculata sessili feu compressa candida Boerh. quod Rapum orbiculatum, Tab. hist. Ic. 3. 790. Scheib-Kuben, ann.

Rapa minor fativa orbiculata five Rapum orbiculatum minus, Tab. hist. Ic. 4. 791. kleine Scheib oder Früh-Kube ann.

Rapa fativa rotunda radice foris & intus flavescente T. ganz gelbe Rube, zu Brumath und Krautweyler, auf denen Aeftern. ann.

Rapa fativa rotunda radice punicea T. braun rothe Ruben, auf denen Gartners Feldern ann.

Rapunculus scabiosæ capitulo cœruleo T. sive Scabiosa globularis vel ovina IB. 3. 12. Ic. Tab. hist. 14 444. Schaf Rävungel, auf denen Aeftern, in dem Ruprechtsauer Wald, gegen dem Rhein perenn.

Reseda vulgaris T. flore rosaceo subluteo, fructu trigono oblongo spicato, sive Reseda lutea IB. 3. 467. spicata, Felo-Raucen, auf denen Wällen, hin und wieder um die Stadt. perenn.

Rosmarinus hortensis angustiore folio T. floribus monopetalis labiatis sub cœruleis, semine subrotundo, Romarin, Rosmarin, mit schmahlen Blättern, Ic. Tab. hist. pag. 311. in Gärten. perenn.

Rosmarinus spontaneus latiore folio T. sive Rosmarinus coronarius fruticosus ignobilior IB. 2. 15. Romarin sauvage, Rosmarin, mit ganz breiten grünen Blättern, cum præced. perenn.

Rosmarinus folio variegato T. Rosmarin, mit schmahlen gold gefleckten Blättern, in horto medico.

Rosmarinus hortensis angustiore folio argenteus H.K.Par. Rosmarin mit weiß gefleckten Blättern, in hort. medico.

Rubeola vulgaris quadrifolia lævis, floribus purpurascens T. monopetalis infundibuliformibus sive Rubia cynanchica IB. 3723. Klein blau
Me

Megerkraut, auf durren Wiesen und Aeffern, zu Oßwald und Züllich / neben den Aeffern, und zu Niederhauffbergen.

Rubeola vulgaris lævis quadrifolia floribus albis T. Klein Megerkraut, mit weissen Blümlein, *lc. 4. Tab. hist. 433.* auf der Contrescarpe, bey dem Fischer-Thor, auf der Glacis, vor dem Cronenburger-Thor. *perenn.*

Rubia tinctorum fativa T. *flore albo monopetalo campaniformi, foliis stellatis, radice rubra fructu gemino* *lc. Tab. hist. 1. 1178.* Ferber-Röth, Garance, zu Krautweyler häufig.

Rubia sylvestris Monspessulana major T. & *IB. 3. 715.* *floribus luteis, foliis asperis*, wilde Ferber-Röthe, *lc. 2. Tab. hist. 118.* an der Landstrasse, vor dem Weisen-Thurn, in denen Hägen. *perenn.*

Ruta muraria T. & *IB. 3. 753.* Mauer oder Steinraute, *Rue de murailles. lc. 3. Tab. hist. 1184.* & in *Tournef. Inst. rei herb.* in allen Fugen, alter Mauren. *perenn.*

Sabina sterilis *IB. seu vulgaris Sabina* Mas. *Tab. hist. p. 1355.* Seven-Baum Männlein.

Sabina baccifera *IB. fol. Cupress.* Seven-Baum, Weiblein. *lc. Tab. hist. p. 1355.*

Salvia major an *Sphacelus Theophrasti* T. *sive Salvia latifolia* 3. 324. *flore monopetalo labiato purpureo, semine subrotundo.* grose oder breite Salbey *lc. 1. Tab. hist. 760.* *Grande sauge*, in Gärten, *perenn.*

Salvia major foliis ex luteo & viridi variegatis

tis HAP. gemahlte oder Froschen-Salben, *in horto medico, perenn.*

Salvia altera perelegans tricolor argentea Belgarum HRP. 3. färbige oder Holländische Salben, *ibid. perenn.*

Salvia latifolia ferrata T. seu crispa IB. 3. 395. Sauge frisée, breit blättricht Salben, mit an dem Rand eingeschnittenen Blättern, hin und wieder in Gärten. *perenn.*

Salvia baccifera T. five Cretica pomifera Clus. hist. 343. Beeren oder Fruchttragende Salben, *in horto medico. perenn.*

Salvia minor aurita T. seu auriculata IB. 3. 305. Edel-Salben, mit spitzigen geöhrtten Blättern, oder Kreuz-Salben, *lc. 2. Tab. hist. 761. Sauge Franche, in Gärten. perenn.*

Salvia minor non aurita T. flosculis albis, Edel-Salben, mit spitzigen Blättern ohne Ohren *ibid.*

Salvia folio tenuiore T. seu Arborescens flore albo, est Salvia Hispanica. H. Eyst. schmahl blättrichte Salben, *in horto medico. perenn.*

Samolus Valerandi T. & IB. 3. 791. folio rotundo non crenato, floribus albis rotatis, pediculis longis infidentibus, five Anagallis aquatica tertia Lob. Ic. 467. vor dem Fischer-Thor, auf dem feuchsten Grund, gegen dem Ziegelofen über. *perenn.*

Scabiosa capitulo globoso major T. quæ Scabiosa V. Clus. hist. Ic. 11. & Tab. hist. Ic. 21. 445. store, cæruleo tubuloso flosculoso, semine coronato Scabieuse tête étoilée, rund köpfige Scabiosen, oder

Alpo

Alpstem-Kraut, bey Mittel und Niederhaufbergen, auf dem Haulenberg. *perenn.*

Scabiosa capitulo globoso minor T. five *Scabiosa minor* IV. *Tab. hist. Ic. 12. 445.* kleine rund köpfige Scabiose, auf durren Wiesen auf der Gansau, auf der Mezgerau, in dem Zulkircher Wald. *perenn.*

Scabiosa folio integro hirsuto T. five *Succisa seu Morsus Diaboli*, IB. 3. 11. *flore caeruleo purpureo flosculo*, *radice præmorsa* Ic. *Tab. hist. pag. 452.* rauher Teufels Abbiß, *Mort du Diable*, auf allen feuchten Wiesen, bey der grünen Wart, *perenn.*

Scabiosa folio integro glabro T. *flore caerulea* Teufels-Abbiß, mit blauen Blumen, und Blättern, ohne Haar, auf Berg-Wiesen, hinter Baar, *prioris est varietas.*

Scabiosa folio integro, *flore albo* T. Teufels-Abbiß, mit weissen Blumen.

Scorzonera angustifolia sub caerulea T. *flore semiflosculo*, *semine papposo* aut *elatior* IV. *Clus. hist. five Scorzonera Pannonica angustifolia* *Tab. hist. IB. 996.* schmahlblättrichte Scorzonera, mit blaulichten Blumen, in Gärten und Gartners-Geldern. *perenn.*

Scorzonera humilis latifolia nervosa T. five *Pannonica* *Tab. hist. Ic. 2. 995.* Scorzonere, breitblättrichte Scorzonera, *ibid.*

Scorzonera humilis angustifolia T. five *Pannonica* 3. *Clus. hist. Ic. 6. 996.* schmahl blättrichte Scorzonera, *ibid. perenn.*

Scor-

Scorzonera laciniatis foliis T. five *Tragopogon pratense laciniatum*, flore luteo pallido *IB. 2. 1059. Bock's Bart*, mit groſen Bleichgelben Blumen, auf denen *Wiesen. Ic. Tab. hist. 994. Barbe de Boue.*

Scorzonera latifolia sinuata T. five *Scorzonera major hispanica* Clus. *hist. CXXXVII. radice nigra longa*, gemeine *Scorzonera*, *Ic. Tab. hist. 1. 995. Scorzonere perenn.*

Scrophularia aquatica major T. five *Scrophularia maxima radice fibrosa* *IB. 3. 421. foliis betonicae*, flore monopetalo anomalo sub purpureo auriculato, radice fibrosa, fructu rotundo acuminato quæ *Betonica aquatica Tab. hist. 934. ♂ in Rivin. Braunwurzel*, mit *Betonien-Blätter*, *grande Scrophulaire*, auf feuchten Orten, und *Wassergeſtaden. perenn.*

Scrophularia palustris non foetida seu *aquatica minor* T. five *Scrophularia aquatica foemina* Matth. *Ic. 867. Kleine Braunwurzel*, an der *Ill bey Ofwald. perenn.*

Scrophularia nodosa foetida T. five *Scrophularia vulgaris & major* *IB. 3. 421. Grande scrophulaire*, *Braunwurzel*, am *Wasser*, bey der *Gallenmatt / Ic. Tab. hist. 930. perenn.*

Secale hybernum vel majus T. *Secale* *IB. 2. 416. flore apetalo*, folio graminis, semine oblongo. *Winter Roggen*, oder *Korn*, *Ic. Tab. hist. 586.*

Secale vernum vel minus T. five *Secale alterum* Dalech. *Lugd. 396. Sommer-Rocken.*

Sedum minus teretifolium album T. five
Sedum

Sedum minus folio longiusculo tereti, flore candido, IB. 3. 690. *Käsen-Träublein*, Ic. 2. *Tab. hist.* 1226. *Triquemadame* aller Orten, auf un-
reinen Tächern und alten Mauren. *perenn.*

Sedum teretifolium album majus Mor. hist. R. Bles. große weise Käsen-Träublein, auf den Glacis, vor dem Fischer-Thor, zwischen den Maursteinen, in dem Steinstrasser Wasser-Graben, *perenn.*

Sedum minimum luteum non acre T. five *Sempervivum minus vermiculatum insipidum* IB. 3. 695. *Mauer-Pfeffer* ohne scharfen Geschmack, auf steinichten Uckern, zwischen Eingsheim und Ensisheim. *perenn.*

Sedum minus luteum folio acuto T. five *Sedum minus flore luteo* IB. 3. 692. kleine gelbe Käsen-Träublein, Ic. 1. *Tab. hist.* 1226. auf brachliegenden steinichten Ueckern, *perenn.*

Sedum parvum acre flore luteo T. & IB. 3. 695. kleine Käsen-Träublein, mit scharfen Geschmack, Ic. 3. *Tab. hist.* 1226. *Pain d'oiseau*, auf sandigen Orten, in der Ruprechtsau, auf dürren Wiesen, bey dem Rhein Ziegelofen. *perenn.*

Sedum palustre sub hirsutum T. five *Sedum minus tertium seu palustre* Clus. hist. VIII. est *Sedum purpureum pratense* IB. 3. 692. klein roth Wiesen Haußwurk, auf feuchten Wiesen, bey Wimmenau. *perenn.*

Sedum minus luteum ramulis reflexis T. five *Aizoon scorpioides* Lob. Ic. 377. est *Sedum minus*

minus luteum flore se circumflectente IB. 3. 639. Raken-Träublein, mit gelben Blumen, und umgebognen Aestlein, auf dem Weg, gegen dem Ottilien Kloster, nicht weit von dem Bäumen. *perenn.*

Serpillum vulgare majus flore purpureo T. *monopetalo labiato* Ic. 4. Tab. hist. 749. ♂ in Rivin. Quendel oder Feld-Kümmel, mit rothen Blumen, auf dürrer Wiesen, auf denen Reinen der Aecker, bey dem Mauer-Hof. *Serpolet à fleur rouge. perenn.*

Serpillum vulgare majus flore albo T. großer Quendel, mit weissen Blumen, Ic. 4. Tab. hist. *Serpolet à fleur blanc. ibid.*

Serpillum vulgare minus T. five Serpillum vulgare IB. 3. part. 2. 269. flore purpur. Kleiner Feld-Kümmel, Ic. 7. Tab. hist. 748. ♂ in Rivin. *Serpolet à feuilles étroites.*

Idem flore albo T. Ic. 6. Tab. hist. 748. Kleiner Quendel, mit weissen Blumen, neben dem Canal, bey dem ersten Schliessen. *perenn.*

Serpillum vulgare minus capitulis lanuginosis T. Quendel mit wollichten Köpfen, auf dem Wacken, und zu Niederhaufbergheim, an grasichten Reinen, im Granwört. *perenn.*

Serpillum foliis citri odore T. five Serpillum citratum Tab. hist. Ic. 2. 747. ♂ H. Eyst. ♂ Rivin. auf dem St. Ottilien Berg, in denen Hohlwegen, von Heiligenstein aus, an grasichten abhangenden Orten, Quendel mit Citronen Geruch. *perenn.*

Ser

Serpillum vulgare minus, foliis acutioribus & angustioribus CBp. Quendel, mit schmahlen und spizigen Blättlein, auf sandigen Boden, zwischen dem Hagenauer Forst bey Schweighausen, perenn.

Sinapi arvense præcox semine nigro T. flore cruciformi fructu siliquoso five Rapisstrum arvorum Lobel. Rapisstrum flore luteo IB. 2. 844. Hederich wilder Senf, mit gelben Blumen, und schwarzen Saamen, hin und wieder auf denen Aeffern.

Sinapi Erucae folio T. five Sinapi Eryfimo Tragi cognatum five simile IB. 2. 857. Ic. Tab. hist. 838. Montarde sauvage, wilder Senf, ben der neuen Retoude, gegen der Citadell, an denen Aeffern, zu Gundershofen. ann.

Sium, five Apium palustre foliis oblongis T. angustis per ambitum serratis, floribus albis rosaceis umbellatis, fructu subrotundo, Ic. 1. Tab. hist. 202. est Sium minus Rivin & Sium umbelliferum IB. 3. 172. Wasser-Eppich, Berle in dem Graben, an dem Wickhäusel, an dem Wasser, gegen der grünen Wart. perenn.

Sonchus asper laciniatus dentis leonis folio T. flosculis semiflosculosis luteis semine papposo five Sonchus laciniatus spinosus IB. 2. 1016. Sau Distel, mit eingeschnittenen Blättern, Ic. 1. Tab. hist. 494. an der Landstrase, vor dem weissen Thurn, und auf denen Kraut-Aeffern. perenn.

Sonchus asper non laciniatus T. five Sonchus minor laciniolus asperior five spinosior, foliis

foliis in ambitu indiffectis, caule fistuloso, rauher Gänse oder Sau-Distel, mit unzerschnittenen Blättern, Ic. 1. Tab. hist. 498. bey dem vorerstehenden. *perenn.*

Sonchus asper arborescens T. *flosculis luteis semiflosculosis* five *Sonchus altissimus* Clus. hist. CXLVII. *semine albo*, Baum Sonchen-Kraut, in dem Ostwinckel, an dem Wasser in feuchten Gruben, am Canal. *perenn.*

Sonchus repens multis *Hieracium majus* T. & IB. 2. 1017. ♂ *Lobel.* Ic. 237. groß kriechend Sonchen-Kraut, grose Gänse-Distel, mit schmahlen Blättern, an denen Aeftern, und vor dem Spithal-Thor, und zu Ohwald. *perenn.*

Sparganium ramosum T. & IB. 2. 541. *flore apetaloglobofo, fructu echinato, folio gramineo triangulari*, Ic. 1. Tab. hist. pag. 559. Zgels-Knospen, Nied-Gras, in sumpfigten Gräben, vor dem Fischer Thor, und über der hohen Wart. *perenn.*

Sparganium non ramosum T. seu alterum IB. 2. 541. Tab. hist. Ic. pag. 560. Zgels-Knospe, ohne Aeste, gegen dem Wasser. Soll über, an dem Wasser. *perenn.*

Sparganium minimum T. & IB. Ic. 2. 541. Kleine Zgels-Knospen, auf denen Matten, zu Ehrstein, in morastigen Gruben, in dem Eckbolsheimer Wald.

Spinacia vulgaris sterilis T. *flore apetaloglobofo, semine angulato*, Binetsch oder grün Kraut, *Epinars* Ic. Tab. hist. pag. 809. in Gärten und Gartners-Feldern. *perenn.*

Spi-

Spinachia vulgaris capsula feminis aculeata
T. Binetsch mit stachelichten Saamen, est *Spinacia* Lobel lc. 1. pag. 809. *ibid.* perenn.

Sphondylium vulgare foliis hirsutis T. five
Branca ursina Germanica IB. 3. part. 2, 160. *flore albo rosaceo umbellato, semine plano nudo ovato.* Berce,
Bären-Klau, lc. *Tab. hist.* 280. ♂ in Rivin. perenn.

Sphondylium vulgare hirsutum, floribus
purpureis T. *Berce rouge*, Bären-Klau, mit röth-
lichten Blumen, in denen Hecken am Rhein.
perenn.

Tamariscus Germanica T. *folio crassiore, flore albo rosacco, fructu compresso siliquoso.* *Tamaris* Ta-
mariscken, lc. 1. *Tab. hist.* 1354. ♂ IB. 1. 351.
hin und wieder auf denen Sand-Bäncken am
Rhein, perenn.

Thalictrum majus filiqua angulosa aut stria-
ta T. five *Thalictrum nigrius*, caule & semine
striato IB. 3. 486. *strobis rosaceis umbelliferis albis se-
mine oblongo,* Wiesen-Kraute, lc. 1. *Tab. hist.* 120. ♂ in
HEyst. Rue des prez, perenn. bey dem Jäger-Hof.

Thalictrum pratense angustifol. T. & IB. 3.
487. est Vl. vel *pratense* ll. Clus hist. 234. est
Ruta pratensis major angustifolia lc. V. *Tab. hist.*
121. Wiesen-Kraute, mit schmahlen Blättern.

Thymus vulgaris folio tenuiore T. five *Thy-
mum vulgare rigidius* folio cinereo IB. 3. part.
2. 263. Thymian lc. HEyst. fast in allen Gärten.

Tithymalus foliis pini, forte *Dioscoridis Pithy-
asa* T. *flore monopetalo campaniformi, fructu trigono.*
five *Tithymalus Pinea* Lob. lc. 357. ♂ *Tab. hist.*

990. Ic. 14. Wolfs-Milch, mit Fichten-Blättern, in der Ruprechtsau, auf der Promenade.

Tithymalus rotundis foliis non crenatis T. sive Esula rotunda IB. 3. 669. & Rivin. est Peplus Tab. hist. 993. Wolfs-Milch, mit runden Blättern, in Küchen Gärten, und Gartners Feldern. ann.

Tithymalus Myrsinites angustifolius T. sive 2. Tab. hist. Ic. 8. 989. Wolfs-Milch, mit schmalen Myrten-Blättern, auf dürren Weiden, in der Ruprechtsau. perenn.

Tithymalus Helioscopius T. & IB. 3. 669. foliis majoribus, subrotundis est Esula solis equa Rivin. Ic. Tab. hist. 990. nach der Sonne sich richtende Wolfs Milch, Reve le matin, suivant le soleil, fast aller Orten, in der Ruprechtsau, auf den Aeckern. perenn.

Tithymalus Myrsinites, fructu verrucæ simili T. non ramosus, sive Tithymalus verrucosus IB. 3. 673. Warzeln Wolfs-Milch / in der Ruprechtsau, auf der Promenade perenn.

Tithymalus palustris fruticosus T. sive Tithymalus magnus multicaulis sive Esula major IB. 3. 671. qui maximus. Tabern. hist. Ic. 1. 987. & in Rivin. grose Wolfs-Milch, in sumpfigen Orten, beim Mauer Hof. perenn.

Tithymalus montanus non acris T. sive Esula minor altera floribus rubris Lob. Ic. 358. & IB. 3. 673. süsse Wolfs-Milch, in dem Gebürg hinter Hohen Andlau und Hochfelden. perenn.

Tithymalus non acris summe foetidus, foliis latioribus, flosculis exviridi luteis, nobis, non est prioris

prioris varietas ut Dominus Mappus existimat, sed quotannis in uno eodemque loco fetens exsurgit. Stinckende Wolfs-Milch, mit grün gelben Blumen, beym Jesuiter Hof, an denen Garten-Zäune und in dem Gansauer Wald. *perenn.*

Tithymalus amygdaloides angustifolius T. & Tabern. hist. Ic. 6. 988. est *Alypum* Matthiol. Ic. *Tithymalis* affine IB. 3. 676. Wolfs-Milch, mit schmahlen Mandel-Blättern, in der Ruprechtsau, neben den Aeckern, und auf der Promenade. *perenn.*

Tormentilla sylvestris T. sive *Tormentilla* IB. 2. 598. *flore rosaceo luteo, folio dissecto, fructu globoso* Ic. Tab. hist. 360. Est *Tormentilla heptaphyllon* HEyft. Ic. etiam in Garidel. hist. Tab. 103. Ruhr oder Blutwurk, Tormentill, Tormentille, auf der Gansau, in dem Brumbter Wald, wie auch in dem Wald zu Illkirch. *perenn.*

Tormentilla alpina major vulgaris T. grose Blutwurk, bey Andlau auf denen Wiesen, bey Rappolsweyer in dem Gebürg. *perenn.*

Tribuloides vulgare aquis innascens T. *flore rosaceo fructu subrotundo aculeato*, sive *Tribulus aquaticus* IB. 3. 775. Wasser oder Stachel-Nüsse, Wasser-Castanien, Jesuiter-Müßen, *Chataigne d'eau*, in tiefen Beyhern zu Wimmernau.

Trichomanes, sive *Polytrichum officinarum* T. & IB. 3. 754. Wiederthon, Frauen-Haar, rother Steinbruch, in officinis substituitur *adiantho nigro*, zu Barr, zwischen denen Steinen,

an denen Weinbergen, auf dem Ottilien Gebürg, zwischen denen Steinrißen, *perenn.*

Trichomanes minus & tenerius T. five *Trichomanes minus album* IB. 3. 755. est *Trichomanes minor* mas Ic. 4. *Tab. hist.* 1188. Klein Wiedertodt, Männlein, auf dem Ottilien Gebürg in feuchten schattichten Steinrißen, *perenn.*

Trifolium montanum lupulinum T. *flore papilionaceo fructu globoso, capitulis spadiceis*, Berg Hopf Klee, hinter hohen Andlau, auf denen Berg-Wiesen. *perenn.*

Trifolium montanum spica longissima rubente T. five *Trifolium majus*, folio & spica longiore IB. 3. 375. est *Lagopus major* H. Eyst. Berg-Klee, mit rothen langen Blumen, und langen Blättern, in dem Eschauer und Gausauer Wald. *perenn.*

Trifolium pratense purpureum majus, foliis longioribus & angustioribus floribus saturatioribus Ray. synopsis 194. groser Wiesen-Klee, mit längern satt rothen Blumen, in dem Ostwinckel. *perenn.*

Trifolium arvense humile spicatum five *Lagopus* T. est *Lagopus trifolius* quorundam IB. 2. 377. *flore papilionaceo albescente* Ic. 1. *Tab. hist.* 908. *¶ in Rivin.* Kleiner Rachen-Klee oder Hasen-Bfötlein, *Pied de Lievre*, aller Orten auf denen brachliegenden Feldern, *ann.*

Trifolium spica oblonga rubra T. five *Trifolium majus* Ill. Clus. hist. CCXIV. & IB. 12. 375. groser rother Weisen-Klee, mit ablangen

zugespitzten Blumen, in dem Ostwinckel, *perenn.*

Trifolium capitulo spumoso aspero minus CB. prodr. 140. kleiner Wiesen-Klee, mit wollichten rauhen Köpfen, auf feuchten Wiesen, bey der Rheinbrück, vor dem Fischer-Thor, oberhalb der Schiffmatt, *perenn.*

Triticum hybernum spicis carens T. floribus apetalis stamineis semine oblongo, Winter oder gemeiner Weizen, *Blé d'hyver* Ic. 1. Tab. hist. 597. à tempore sationis dicitur etiam *Triticum aestivum*, Sommer-Weizen, auf denen Felderen.

Triticum typhinum simplici folliculo T. Welscher Weizen, mit einfach geährten Körnern, Ic. IB. 2. 108 zu Drusenheim.

Turritis leucojifolio T. flore cruciformi, fructu siliquoso, sive *Myagrum siliquosum* vel secundum *Tab. hist. Ic. 2. 1252.* est *Myagro* affinis planta siliquis longis IB. 2. 894. großer wilder Kresse, an dem Ufer gegen dem Wasser Zoll über, in Gärten, und neben den Aeftern, *ann.*

Turritis alpina foliis ineisis T. Thurn Alpen-Kraut, mit eingeschnittenen Blättern, auf den Bergen gegen Hochfeld, in dem Barrer Wald, an feuchten schattichten Orten. *ann.*

Veratrum flore atro rubente rosaceo, semine oblongo T. sive Helleborum album flore nigro IB. 3. 634 *Elleboe blanc, à fleur rouge brun*, weiße Nießwurzel, auf dem Gebürg, hinter Blinschweyler an Creutz-Pfad. *perenn.*

Veronica aquatica major, folio subrotundo T. sive Anagallis aquatica major. IB. 3. 791.

♂ *Tab. hist. Ic. 4. 1094. ♂ in Rivin, est Becca-
bunga Officinarum, flore monopetalo coeruleo rota-
to, Bachbung großer Gauchheil, Berle in feuch-
ten Orten, beym Wickhäusel, an der Bruck, in
der Ruprechtsau. perenn.*

*Veronica aquatica minor folio subrotundo
T. five Anagallis aquatica folio rotundiore mi-
nor B. 3. 790. kleine Bachbung Ic. Tab. hist. 1. 1094.
an Wassergräblein, in der Ruprechtsau, pe-
renn.*

*Veronica aquatica major, folio oblongo
T. five Anagallis aquatica major, flore coeru-
leo, folio oblongo B. 3. 791. est Berula, Tab.
hist. Ic. 3. 1094. Bachbung, mit langlichten Blät-
tern, in denen meisten stillstehenden Wasser Gru-
ben, in der Ruprechtsau, an dem Wasser zu
Obwald. ann.*

*Veronica aquatica minor folio oblongo T.
flore purpurascente five Anagallis aquatica minor
2. Tab. hist. Ic. 2. 1094. ♂ in Rivin. kleine Bach-
bung, mit schmahlen Blättern, vor dem Mez-
ger = Thor in denen wässerichten Orten zu Ob-
wald am Bach, perenn.*

*Vicia sepium folio rotundiore acuto, flore
papilionaceo, fructu siliquoso, semine nigro subrotundo,
T. Sommer Saat = Wicken, mit schwarzen
Körnern, Ic. 1. Clus hist. CCXXXV. Zaun. Wi-
cke, auf denen Geldern, in der Ruprechtsau, in
dem XV. Wörth. ann.*

*Viola montana coerulea grandiflora HRP.
flore polypetalo anomalo, fructu trigono five Melani-
blaue*

um montanum Dalechamp. Lugdun. 1204. blaue Berg Violen, mit großen Blumen, oberhalb Hochfeld, auf dem Weidgang. *Grande Violette de Montaigne*, perenn.

Viola montana alba grandiflora, weisse große Berg-Violen, *ibid.*

Viola montana lutea grandiflora, five *Iacea tricoloris* genus, flore luteo magno repens non annuum IB. 3. 548. est *Violæ montanæ* *tertiæ* genus aliud Clus hist. 310. gelbe Berg-Violen. *ibid.*

Viola montana tricolor, flore odoratissimo T. five *Iacæ tricoloris*, five *floris tricoloris* genus, flore purpureo magno repens non annuum IB. 3. 548. est *Viola montana* Ill. five *Tricolor* Clus. hist. 310. große Berg-Violen, auf dem Roßberg zu Mafsmünster.

Viola tricolor hortensis repens T. Dreyfaltigkeit Blumen, Frensam = Blum, *Pensées*. 1c. 2. Tab. hist. 690. ann.

Virga aurea vulgaris latifolia T. & IB. 2. 1068. *foliis minus serratis, floribus luteis radiatis, semine papposo*, quæ *Virga aurea* HEyft. gemein Heydnisch Wund-Kraut, *Verge dorée* in denen Hecken zu Oßwald und Züllich. perenn.

Virga aurea latifolia serrata T. five *Virga aurea vel Solidago Saracenica latifolia serrata* IB. 2. 1068. breit blättricht gekerbt Heydnisch Wund-Kraut, an der Zü, gegen Oßwald, auch in dem Ostwinckel, 1c. Tab. hist. 1260. perenn.

Vitis sylvestris Labrusca T. flore rosaceo racemoso

*moso albescente, fructu globulari, five Labrusca Da-
lech. Lugd. 1406. Vigne sauvage, wilde Rebe,
auf dem Weg gegen Oskwald, in den Hecken,
in dem Ostwinckel, gegen Zulfirch, perenn.*

*Vulneraria rustica T. five Anthyllis legumi-
nosa Rivin, flore lutea papilionaceo, foliis subrotun-
dis, siliquoso brevi semine subrotundo, gelber Hasens-
Klee, Ic. 3. Tab. hist. 909. ♂ in Rivin. Vulnereaire,
auf allen trockenen Wiesen, auf der Glacis, vor
dem weissen Thurn Thor, in dem Ostwinckel.
perenn.*

*Ulmaria officinarum T. Clus. hist. CXLVIII.
five Barba caprae floribus compactis CBp. albis
rosaceis, foliis serratis, radice capillata amara nigra,
fructu membranaceo, Barbe de Chevre ou Reine de prez
Ic. Tab. hist. 1162. Weißbart, an dem Wasser der
Gallen-Matt, auf feuchten Wiesen an dem Ca-
nal. perenn.*

MENSIS

JULIUS ET AUGUSTUS.

*Abrotanum linifolio acriore odorato T. flore
flosculoso, semine papposo Ic. Tab. hist. 855. Stabwurz,
mit Flachskraut Blättern, Estragon in Gärten,
und auf denen Gärtners Felderen, häufig. perenn.*

*Abfinthium ponticum T. folio latiori, floribus
luteis flosculosis, semine papposo, five Abfinthium
vulgare majus, Ic. 1B. 3. 168. Absinte ordinaire,
gemeiner Vermuth, Ic. Tab. hist. pag. 1. aller
Orten, in Gärten und Weinbergen, perenn.*

Abfin-

Abfinthium ponticum montanum T. five *Abfinthium vulgare montanum* *IB.* 3. 173. *Abfinte de Montaigne*, Berg *Wermuth*, auf dem *Wasserburg* bey'm *Schloß*. *perenn.*

Acetosa arvensis minima non lanceolata T. five *Oxalis minima* *Tab. hist. Ic.* 6. 827. gar kleiner *Saurampfer*, auf dörren sandigen *Aeffern*/zu *Ringelsheim*, *perenn.*

Agaricus pedis Equini facie, five *Fungus ignarius ex albo cinereus & glaber*, *Feuer oder Zunder-Schwamm*, in allen *Waldungen* / unten an den *Stämmen*, alter *Eich* und *Buchbäume*, *perenn.*

Agaricus auriculæ forma T. five *Fungus sambucinus* est I genus fungor. perniciosor. *Clus. hist. CCLXXVI.* *Hollunder Schwämme*, *Judas-Dehrlein*, an denen alten *Hollunder-Stämmen*.

Agaricus flavus betulinus. gelber *Bircken-Schwamm*, in dem *Gansauer Wald*, an alten *Bircken-Stämmen*.

Agaricus lamellatus, pectunculiforma, *Alno adnascens* *Scherard. Suppl. & Vaill. Tab. X. fig. 1.* *Muschelförmiger Schwamm*, an alten *Erlen Stämmen*, an den *Wässern*.

Agaricus officinali similis *Dillen.* five *Agaricus albus caudicibus arborum adhærens*. *weißer Baum-oder falscher Lerchen-Schwamm*, in *Waldungen*, an unterschiedenen *Bäumen*.

Agaricus porosus rubens carnosus hepatis facie *Dillen & Dodon.* *Leberförmiger Baum-Schwamm*,
N 5

Schwamm, an alten Eichenbäumen, in dem Hagenauer Forst.

Alcea hirsuta T. sive *villosa* IB. 2. 1067. haarichter Fellsriß, auf der Contrescarp, zwischen dem Cronenburger und Steinstrasser Thor, an denen Fußpfaden, nach Mittelhaufbergen, neben den Aeffern, *perenn.*

Allium montanum bicornae angustifolium flore purpurascens T. *liliaceo, fructu subrotundo*, sive *Ampeloprasum proliferum* Lobel. 156. est *Allium sylvestre bicornae purpureum proliferum* IB. 2. 561. Heiden Knoblauch, schmahlblättrichter Berg Knoblauch, auf der Elsau gegen Urbogast auf denen Aeffern, in denen Weinbergen, zwischen Barr und Heiligenstein. *perenn.*

Alfene palustris seu paludosa rotundifolia repens, foliis portulacæ pinguibus binis ex adverso nascentibus, flosculis virescentibus rosaceis lc. Tournef. alfat. pag. 115. Tab. II. lit. b. an *Alfene* quoddam genus *Pelagicum & littorale* Clus. hist. CLXXX. 1111. Wasser-Burzel, in sumpfigen Orten, vor dem weissen Thurn, bey der ersten Bleich, *perenn.*

Alfene spergula dicta major, T sive *Spergula* IB. 3722. *Alfene geniculata*, foliis strictissimis circa caulem stellatim positistennibus, flosculis albis integris rosaceis, radice singulari fibrosa nobis, an denen Furchen, feuchter und sandigen Aeffern, häufig auf denen Sand-Bäncken, der Breusch, gegen Escholsheim. *ann.*

Alfene pusilla graminea flore tetrapetalo T. *herbi-*

Alsine pusilla graminea flore tetrapetalo T.



J. Striedbeck. sculp.

herbido é muscoso fugaci, radícula repente, five Saxifraga graminea pusilla flore parvo tetrapetalo Ray hist. 1026. in grasichten Orten, in dem Ostwincfel, an dem Canal bey der Wolfheimer Bruck, auf der Insel, wo die Breusch in die Zu fällt. vid Tab. nostr. VIII. *perenn.*

Alfine palustris minor folio oblongo repens, flosculis parvis racemi modo junctis albis rosaceis Ic. Tournef. alsat. 115. Tab. 11. lit. c. five *Polygoni Linifolia per terram sparsa, flore scorpioidis* IB. 3. 379. Sumpf Gauchheil, mit langen Blättlein, und gedrungeenen weissen Blümlein, an sumpfsich. Orten, auf der Insel, wo die Breusch in die Zu fällt, *ann.*

Alfine palustris tenuifolia muscosa T. five *Alfine muscosa quibusdam* IB. 3. 365. ☞ Dalech. Lugd. 1235. *Alfinastrum serpillifolium* flore albo tetrapetalo Vaill. Ic. Tab. 11. fig. 2. *foliis oblongis conjugatis, cauliculo nodoso*, auf der Insel, wo die Breusch in die Zu fällt, in dem Hagenauer Forst, in sumpfsichten Orten. *ann.*

Althæa Dioscoridis T. five *Bismalva* IB. 2. 954. *folio molli incano, flore albo monopetalo campaniformi, semine reniformi*, Ic. Tab. hist. 1152. Etz bisch, Guimauve, auf aufgeworfenen Wassergräben, zu Fegersheim, und zu Marlenheim. bey Fegersheim *perenn.*

Alyssum montanum perenne incanum T. feu *Thlaspi montanum luteum* IB. 2. 928. vel *supinum luteum* Lobel. Ic. 220. *flore cruciformi*
luteo

luteo fructu gibbo, unter denen zerfallenen Felsenstücke in dem Hochgebürg Niedereck. *perenn.*

Amми perenne umbellatum T. flore rosaceo semine gibbo striato sive *Eryngium arvense, foliis serræ similibus* CBp. quod *Crithmum quartum umbelliferum* Matthioli 1B. 3. part. 2. 195. *Bacillen* oder *Sichel-Kraut*, in dem Wall bey dem steinstraser Thor, auf denen Fleckern bey Ober-ehenheim am Weg, nach Eckbolsheim, *perenn.*

Amми majus foliolis plurimum incisiss & nonnihil crispis T. neben den Fleckern, in dem Ostwinckel, und bey dem Züllicher Wald. *perenn.*

Anacampteros vulgo Faba crassa T. flore albo rosaceo foliis succulentis est *Fabaria officinarum* Orpin, 1c. 1B. 3. 681. 3 Tab. hist. 1c. 1227. zu Gravenstaden und Züllich, auf denen Fleckern, in dem Eckbolsheimer Wald an dem Canal. *perenn.*

Anacampteros purpurea T. sive Telephium floribus purpureis rosaceis Lob. 1c. 398. Orpin à fleur, purpurine, fette Henne, mit rothen Blumen, in dem Reichstatter Wald. *perenn.*

Angelica pratensis apii folio sive Sium quibusdam flore luteolo 1B. 3. part. 2. 170. est *Seseli pratense Rivin tenuifolium flore rosaceo umbellato, semine oblongo striato* Roß-Fenchel, auf denen Matten zu Obwald am Canal, est *Hippomarathrum* 1. Tab. hist. 160. *perenn.*

Apium anisum dictum semine suaveolente majore T. flosculis albis rosaceis, foliis imis subrotundis

dis in ambitu serratis, superioribus profunde dissectis fructu globulari; Uniß, Anis Ic. Tab. hist. 171. & in Rivin. auf denen Gartners-Felderenn. ann.

Apium seu Petroselinum crispum T. Krauß Peterlein, Ic. 2. Tab. hist. pag. 264. & in Rivin. ibid. perenn.

Apium hortense seu Petroselinum vulgare flosculis albis rosaceis umbellatis foliis latis dissectis Persil, gemein oder Garten-Peterlein, Ic. Tab. hist. 264. & in Rivin. perenn.

Apium palustre & officinar. T. flosculis albis rosaceis umbellatis seu Apium vulgare ingratius IB. 3. part. 2. 100. est Paludapium, Tab. hist. Ic. 1. 273. & Apium Rivin. Eppich, Wasser-Peterlein, an Wasser-Gräben, in der Ruprechtsau, an= perenn.

Aphaca T. flore papilionaceo fructu siliquoso. Lob. icon 70. five Lathyrus annuus foliis convolvuli minoris Mor. HOx. seu Elatine 11. Tab. hist. Ic. 3. 1092. gelbe Steinwicke, in der Ruprechtsau, auf denen Aeffern, ann.

Aristolochia clematitis recta T. five vulgaris IB. 3. 560. longa, floribus luteis monopetalis tubulatis, fructu cylindraco Tab. hist. Ic. 2. 1142. & in Rivin. Aristolochie, Oster-Lucey, zu Dorlisheim, Bläßheim und Barr, an denen Reinen der Reben. perenn.

Aster atticus coeruleus vulgaris T. flore purpureo radiato, semine papposo IB. 2. 1044. est Atticus aster flore coeruleo HEyst. blau Stern-Kraut, Ic. Tab. hist. 1. 716. zwischen Lingelsheim und Obwald,

wald , in dem Zürcher Wald. *petit Mugue*,
perenn.

Aster palustris luteus, folio lanuginoso longiori T. *fructu papposo*, sive *Britannica conyzoides* IB. 2. 1047. seu *vera Dalech. Lugd.* 1082. Wasser Stern-Kraut, mit haarichten Blättern, am Rhein, beym Auenheimer Wald. *perenn.*

Atriplex angusta oblongo folio T. *floribus pallide virentibus stamineis*, est *Atriplex helxines folio semine oblongo*, Lob. Ic. 257. vel *Atriplex vulgaris angustifolia cum folliculis* IB. 2. 973. wilde schmahl blättrichte Melte, hin und wieder bey Miststätten, und aufgeworfenen Gräben / *Arroche ann.*

Atriplex folio hastato seu deltoide T. sive *Atriplex procumbens rubra*, folio triquetro HRPar. Melte, mit 3 eckichten Blättern, ibid. und am Ballhaus. *perenn.*

Atriplex hortensis alba sive *pallide virens* T. *flore stamineo subluteo*, *foliis latis pinguibus mucronatis*, sive *Atriplex sativa alba* Lob. Ic. 253. weisse Garten-Melte, *Bonnes dames*, in denen Kraut-Aeckern, *ann.*

Atriplex angustissimo & longissimo folio HLB. Melte mit sehr schmahlen und langen Blättern, hin und wieder auf denen Kraut-Aeckern. *perenn.*

Atriplex hortensis rubra T. sive *Atriplex sativa altera folio & flore purpureo livens* Lob. Ic. 253. & Ic. 1. Tab. hist. pag. 810. rothe Garten Melte, *Arroche rouge*, hin und wieder in denen

nen Gärten, und auf denen Gartners-Aeckeren.
ann.

Betonica arvensis annua, flore ex albo flavescnte T. *monopetalo labiato verticillato semine oblongo*, five *Sideritis glabra arvensis latifolia* IB. 3. 427. est *Sideritis* flore albo, barba luteola Rivin. *Alyssum majus*, Tab. hist. Ic. 3. pag. 929. grose Feld-Alysseu Glied-Kraut, an der Schäfelsheimer Klamm, *ann.*

Bidens foliis tripartito divisis T. *flore flosculoso semine aculeato*, five *Cannabina aquatica folio tripartito diviso seu minus pulchro* Ic. IB. 2. 1073. Wasser-Dosten, an denen Wasseren bey Osward, und an der Ill, *Eupatoire batard. perenn.*

Bidens foliis tripartito divisis, caule purpurascnte Vaill. Wasser-Dosten, mit röthlichten Stenglen, bey der Rheinbruck, in der Stadt bey dem Frankösischen Spithal, an dem Weg. *perenn.*

Bidens folio non dissecto T. *flore luteo discoide odorato* five *Verbesina pulcherrimo flore* IB. 2. 1074. est *Eupatorium cannabinum chrysanthemum* Tab. hist. Ic. 2. 336. in Sumpfen.

Bistorta major radice minus intorta T. *foliis rugosioribus, semine triangulari* Matter = Wurk, mit krausen Blättern, Garidel Hist. plant. Tab. 14. *Bistorte*, in dem Ganßauer Wald zu Zülkirch, und zu Molkheim auf denen Wiesen. *perenn.*

Bistorta major radice magis intorta T. seu *Bistorta media, folio minus rugoso* IB. 538. *folio*

folio integro, flore apetalò incarnato spicato, Matteredwurk, Schlangenwurk, mit glatten Blättern, Bistorte auf feuchten Wiesen, in der Ruprechtsau. Ic. 1. Tab. hist. 82. perenn.

Bistorta alpina maxima Ic. & IB. 3. 539. grose Alpen Matteredwurk, bey der Melckerey gegen Hochfeld, bey dem rothen Kreuz, perenn.

Bistorta alpina minor T. five Bistorta minor Clus. hist. XIX. & IB. 3. 539. klein Alpen Matteredwurk ibid. perenn.

Blattaria lutea, folio oblongo laciniato T. five Blattaria lutea IB. 3. app. 874. flore monopetalò rotato staminulis purpureis, fructu rotundo, Schaben-Kraut, Herbe au Mites ou Blattaire Ic. 5. Tab. hist. 959. auf dem Schießrein, bey allen Lüften, bey den Sandgruben, perenn.

Blitum rubrum majus T. flore stamineo spicato rubente semine oblongo, rother Meyer, Blete rouge Ic. 1. Tab. hist. 817. hin und wieder in Gärten, ann.

Blitum album majus T. weiser Meyer, Blete blanc. Ic. 2. Tab. hist. 817. in denen Gärtners-Aefern. ann.

Blitum rubrum minus IB. 2. 967. seu Blitum rubrum supinum Lob. Ic. 250. rother Meyer, rothe Mistmelte, Blete sauvage, an denen Straßen und Miststätten. ann.

Blitum sylvestre spicatum T. five Blitum album minus IB. 2. 967. foliis variegatis, floribus apetalis, semine lentiformi nigro weiser Meyer, an denen Saunen, vor dem Metzger Thor.

Blitum

Blitum sylvestre spicatum, T. foliis ex albo & viridi variegatis, sive *Blitum album minus* IB. 2. 967. gefleckter fleiner Meyer, an denen Mauren alter Stadtgräben. *perenn.*

Brunella coerulea flore magno T. folio non laciniato, semine subrotundo *Clus. hist. XLIII. 3 Tab. hist. Ic. 1. 944. 3 in Rivin.* blaue grose Brunelle, in dem Illkircher Wald, nahe an denen Fleckern, auf der Obwalder Nachtweyd. *Brunelle, perenn.*

Brunella folio laciniato T. flore magno purpureo quæ 11. *Clus. hist. flore purpur. XLIII. 3 in Rivin.* Brunelle mit eingeschnittenen Blättern, auf allen Matten, *perenn.*

Brunella major, folio non dissecto, flore purpurascente *HRPar.* rothe Brunellen, in dem Gansbauer Wald, und auf der Kaltau. *perenn.*

Buphthalmum Tanacetii minoris folio T. flosculis luteis radiatis, semine anguloso, est *Buphthalmum* 11. *Tab. hist. 90. 3 Matth. Epit. 651.* Kinds-Aug, Streich-Blum, Olil de boeuf. auf durren brachliegenden Aekern, in dem Nled zu Marcklesheim. *perenn.*

Bupleurum folio subrotundo, sive vulgatissimum T. quod angustifolium *Tab. hist. Ic. 2. 1258. 3 in Rivin.* Hasen-Oehrlein, an denen Zäunen zu Osthofen, und an denen Neben zu Bläßheim *perenn.*

Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum T. semine nigro pellucido sive *Perfoliata arvensis annua vulgaris*, IB. 3. part. 2. 198. flosculis

lis subluteis umbellatis rosaceis, Durchwachs oder Bruchwurz, Ic. 1. Tab. hist. 1140. & in Rivin. unter der Frucht, zu Niederhaufbergheim und Oßwald ann.

Bupleurum montanum latifolium T. five *Perfoliata montana* Camer. Hort. Ic XXXVIII. breit blättricht Bruchwurz, zu Sulzbach, bey Collmar, auf dem Gebürg, beyin Bad zu Sulz, zwischen denen Steinen, perenn.

Calamintha vulgaris arvensis verticillata vel *Officinarum Germaniæ* T. *semine oblongo*, five *Calamintha flore magno vulgaris* IB. 3. part. 2. 228. Ic. 1. Tab. hist. 733. & in HEyft. atque Rivin. *Calamente de Montaigne*, gemeine Berg-Münke. perenn.

Calamintha pulegii odore five *Nepeta* T. *Calamintha flore minore, odore pulegii* IB. 3. part. 2. 229. est *Calamintha arvensis*, 11. Tab. hist. 736. Acker Münke, Poley-Münk, auf brachliegenden Aeckern, zu Zulfirch und Oßwald. ann.

Campanula vulgatio foliis *urticæ seu major & asperior* T. & IB. 2. 800 *flore monopetalo cæruleo campaniformi, radice alba nodosa*, Zapfen oder Halskraut, mit blauen Blumen, grose Zaun-Glocken, Ic. 2. Tab. hist. 797. *Campanule ou Gand de nostre Dame*, in allen Wäldern. perenn.

Eadem flore candido T. Halskraut, mit weissen Blumen, in dem Forst bey Hagenau, in denen Hecken, perenn.

Campanula pratensis flore conglomerato T. five *Trachelium minus multis*, IB. 2. 800. Wie-

Wiesen-Glöcklein, mit gedrungeenen blauen Blumen, 1c. 3. Tab. hist. 790. auf denen Wiesen zu Oßwald. *perenn.*

Eadem flore albo T. Wiesen-Glöcklein, mit zusammen gedrungeenen weissen Blumen, auf denen Matten, an dem Eckbolsheimer Canal. *perenn.*

Campanula pyramidata altissima T. folio latiore, flore albo monopetalo five *Campanula lactaria, Tab. hist. 1c. 1. 699. & Clus. hist. CLXXII.* Pyramiden oder Milch-Glocken, auf dem Haulen Berg, *per me luxuriat. perenn.*

Campanula alpina latifolia coerulea CBp. Berg-Glöcklein, mit blauen Blumen, auf den Felsen und Steinflüssen, Niedecker Gebürgs. *perenn.*

Campanula alpina linifolia, flore coeruleo T. & IB. 2. blaue Berg-Glöcklein / mit Lein-Kraut Blättern, auf dem wilden Hochgebürg, bey der schwarzen See, oberhalb Peris, unter Klippen, und an denen Felsen, *perenn.*

Campanula alpina rotundifolia minor T. seu altera IB. 2. 797. five Campanula minor alpina rotundioribus imis foliis Clus. hist. CLXXIII. rund blättrichte Glöcklein, auf dem Hochfelder Hochgebürg, an denen Felsen. *perenn.*

Campanula pratensis floribus singularibus per caulem sparsis T. Wiesen-Glöcklein, mit vielen an dem Stengel hin und wieder stehenden Blumen, zu Ringelsheim und Oßwald. *perenn.*

Cannabis sativa T. five Mas IB. 3. 487. potius foecunda, flore apetalo stamineo. Fruchtbringender Hanf, auf denen Aeckern. *ann.*

Cannabis erratica T. sive *Foemina* IB. Spinn
Hanf ohne Körner. *Iul. ann.*

Carduus lanceolatus latifolius Ic. & IB. 3. 58.
flore purpureo flosculo apetalo majore semine papposo.
Speer-Distel, an allen Landstrassen, an dem
Weg gegen Ittenheim. *ann.*

Carduus Marianus albis maculis notatus T.
& IB. 3. 56. Marien-Distel, hin und wieder auf
dem ausgeworfenen Unrath der Gärten, vor dem
Mehger-Thor, neben den Aeckern zu Zäckirch.
Ic. Tab. hist. 1078. *ann.*

Carduus nutans T. *capitulo magno singulari
pendente, flore purpureo suaveolente, tota stirpe spino-
sus,* Weg Distel, mit rothen hangenden wohl-
riechenden Köpfen, Ic. IB. 3. 56. an allen Land-
strassen. *perenn.*

Carduus nutans flore albo T. Weg-Distel,
mit weissen hangenden wohlriechenden Köpfen, an
der Landstrasse gegen Ittenheim, an den Neben-
bey Lingelsheim. *perenn.*

Carduus acanthoides T. & IB. 3. 56. *caule
alato incano, flosculis purpurascens, sive Polya-
cantha* Tab. Ic. 1. pag. 1080. kleine Weg-Distel,
bey Niederhaufbergen, an denen Wegen der
Aecker/ *perenn.*

Cadus caule crispo T. & IB. 3. 59. *feu spi-
nosissimus angustifolius vulgaris, capitulis minoribus
purpureis,* Weg-Distel, mit kleinen rothen Blu-
men und krausen, überall besetzten Dornichten
Stengel, aller Orten an denen Wegen, und
aufgeworfenen Gräben,

Car.

Carduus stellatus T. five *Calcitrapa* IB. 389. *foliis papaveris erratici, flore purpureo semine non papposo* seu *Spinatella* Tab. hist. Ic. 2. pag. 1080. Stern-Distel, *Chardon étoilé ou Chauffetrape*, vor dem weissen Thurn-Thor, und auf dem Schießrein. perenn.

Carduus stellatus flore albo HRP. Stern-Distel, mit weissen Blumen, Ic. 3. Tab. hist. 1081. bey allen Lüften, perenn.

Carduus tomentosus acanthifolio T. five *Acanthium vulgare* flore purpureo Tab. hist. Ic. 2. 1063, est *Spina alba sylvestr.* Fuchs. IB. 354. ann.

Carduus tomentosus acanthifolio vulgaris flore albo. T. five *Acanthium vulgare*, flore albo Tab. Ic. pag. 1063. perenn.

Carduus capite rotundo tomentoso T. five *Carduus capite tomentoso* IB. 3. 57. Berg-Distel, mit runden wollichten Köpfen, nahe am Dorf, bey Niederhaufbergen, perenn.

Carlina acaulos magno flore T. albo, *semine papposo* seu *Carlina acaulos* IB. 3. 64. weisse niedrige Eferswurzel, est *Chamaleon albus officinar.* Tab. hist. pag. 1068. auf dem Nasfweyler Gebürg, Carline. perenn.

Carlina caulescens, magno flore purpurea T. Ic. 2. Tab. hist. pag. 1068. Carline noir. hohe schwarze Eferswurzel, auf denen höchsten Fürsten, hinter Kayfersberg. perenn.

Carlina sylvestris vulgaris T. five *Attractylis* IB. 3. 81. caule spinosiore, flore luteo radiato, est *Heracantha* Tabern. Drey-Distel, Ic. hist. pag.

1076. ♂ *Clus. hist. CLVII.* bey allen Lüsten, auf der Schlut, und anderen durren Orten. *ann.*

Carthamus seu Cnicus sativus officinar. T. flore luteo flosculofo semine albo anguloso, IB. 3. 79. est *Cnicus vulgaris Clus. hist. CLII.* auf denen Feldern zu Ensis- und Blosheim, *ann.*

Carvi T. flore albo rosaceo semine gibbo ♂ striato five *Cuminum pratense seu officinarum quod Caros IB. 3. part. 2. 69.* Feld oder Mattkümmich, nostr. Macckümmig, auf denen Wiesen bey Schwald, bey dem Rhein-Zoll häufig. *ann.*

Carvifolia Vaill. Tab. fig. 2. & IB. 3. 171. *floribus albis rosateis umbellatis,* five *Cuminum sylvestre equinum Tragi,* Ros-Kümmel, auf der Lingesheimer Rosweid. *perenn.*

Cassida palustris vulgatiores flore coeruleo T. monopetalo labiato, foliis viridibus amaris, semine oblongo, five *Lysimachia coerulea, Tertianaria dicta IB. 3. 435.* blauer Weidrich, bitter Fieber-Kraut, *1c. Tab. hist. pag. 766. ♂ in Rivin.*

Cassida palustris minima flore purpurascen- te *T. Weidrich,* mit rothen Blumen, bey dem Eschbolsheimer Siegel-Ofen, hauc plantulam anno 1739. in prædicto loco reperi, quam in hortum medicum transtuli, ubi nunc luxuriose viget. *vid. Tab. nostr. IX. perenn.*

Caucalis arvensis echinata magno flore, T. five Lappula canaria flore pulchro magno albo IB. 3. part. 2. 79. rosaceo umbellato, foliis profunde incis, five *Echinophora magno flore Rivin. 1c. 1. Tab. hist. pag. 290.* Kletten-Körfel, mit großen

Cassida palustris minima J.



J. Striedbeck. sculp.

biatis, Ic. Tab. hist. 761. Wald = Salbey, Ic. in Rivin. in dem Hördter Wald, auf dem Gebürg zu Oberbrunn. *perenn.*

Chamænerion vulgare latifolium T. *flore luteo rosaceo, fructu siliquoso*, five *Lyfimachia speciosa*, quibusdam *Onagra*. dicta *siliquosa* IB. 2. part 2. 906. est *Chamænerion* HEyst. gelber Weidrich, breitblättriger Schoten-Weidrich, an der Ill, gegen Oßwald, in der Ruprechtsau, an dem Rhein. *perenn.*

Chamænerion glabrum majus T. *latifolium* five *Lyfimachia siliquosa major* CBp. *flore purpureo rosaceo*. Herbe St. Antoine, schöner roth:er Weidrich, mit breiten Blättern, Ic. 6. Tab. hist. 1238. an denen Wasser-Gräben, in der Ruprechtsau, an der Ill gegen Oßwald. *perenn.*

Chamænerion glabrum minus T. five *Lyfimachia minor*, Tab. hist. 3. pag. 1237. fleiner rother Weidrich, zu Oßwald an feuchten Orten. *perenn.*

Chamænerion villosus magno flore purpureo T. five *Lyfimachia siliquosa hirsuta*, *ma-jore flore purpureo* IB. 905. *Lyfimache rouge*, haarichter Weidrich, mit grossen röthlichen Blumen, Ic. 4. Tab. hist. 1237. in dem XV. Wört am Rhein.

Chamænerion villosus minus parvo flore T. five *Lyfimachia siliquosa hirsuta minor*. CBp. *parvo flore purpurascence*, klein haarichter Weidrich, Ic. 5. Tab. hist. 1237. am Weg nach der grünen Wirt und hinter Barr. *perenn.*

Cham

Chamænerion villosum, parvo flore T. five *Lyfimachia filiquosa hirsuta* flore minore, IB. 2. 906. est *Lyfimachia*, II. Tab. hist. pag. 1237. in dem XV. Wört am Rhein, an denen Werckern gegen der Citadell, unter denen Weiden, am Wasser, bey allen Lüssen.

Chenopodium foetidum T. flore apetalis, semine plano orbiculato, five *Atriplex foetida* IB. 2. 974. quæ *Vulvaria* Tab. hist. 8121. stinckende Melte, Schaam-Straut, an denen Mauren alter Stadtgräben. ann.

Chenopodium angustifolium laciniatum minus T. five *Atriplex angustifolia laciniata minor*, IB. 2. 972. schmahl blättrige Mistmelte, an allen Wegen, und an denen Miststätten. ann.

Chenopodium folio laciniato, coma virecente T. Ic. Tab. hist. 2. 812. wilde Melte, *Arroche sauvage*, an Gräblein, in Niederhauffbergen, und zu Schiltigheim in dem Ried. ann.

Chenopodium folio laciniato, coma purpurascente T. Ic. I. Tab. hist. 810. wilde Melde, mit rothen Gipfel, an feuchten Wasser-Gräben, ann.

Chenopodium Pes anserinus I. Tab. hist. 812. T. five *Atriplex dicta Pes anserinus* IB. 2. 975. *Pale Oye*, breite wilde Melde, mit Gänse-Fuß Blättern, Schweintodt, fast aller Orten, in Gräben und Zäunen, wie auch an denen Mauern, ann.

Chenopodium Pes anserinus II. Tab. hist. 812. & T. five *Atriplex dicta Pes anserinus*
O 5 alter

alter five ramosus 1B. breite Wald-Melte, mit spitzigen Gänse-Fuß Blättern. *ibid. ann.*

Chenopodium folio sinuato candicante T. five *Atriplex sylvestris* *Tab. hist.* 810. & 1B. 2972. milde Melte, mit weiß glänzenden Blättern, bey denen Miststätten, und auf denen Gärtners-Feldern. *ann.*

Chenopodium Betæ folio T. five *Blitum erectius* vel *Ill. Tragi* 1B. 2. 967. est *Blitum polyspermum*, Fisch-Melte, *1c. Tab. hist. pag.* 1219. auf denen Aeffern, gegen der Contrescarpe, vor dem weissen Thurn, und Cronenburger-Thor. *ann.*

Chenopodium folio oblongo integro Dillen. seu spuria *Atriplex folio oblongo angusto* Volckamer. *Flor. Norimb. pag.* 53. Melte mit schmahlen langen ganzen Blättern, zu Schiltigheim, an denen Aeffern, und in denen Kraut-Gärten. *ann.*

Chenopodium Opuli folio Vaill. *Tab. VII. fig. 1.* milde Melde, mit Schmelgen Blättern, an denen Mauren der Stuck Magazin, gegen der Citadell. *ann.*

Chenopodium stramonii folio, Vaill. *Tab. VII. spicatum* & *racemosum*, coma purpurascens, milde Melde, mit Stechäpfel Blättern, und langen zugeschnüßtem Strauß, zu Zulfirch in dem engen Weg, gegen dem Wasser, und in denen Zäunen, unterhalb dem Wickhäusel. *ann.*

Chondrilla sonchifolio, flore luteo pallescente live *Sonchus Sylvaticus* 4. *Tob. hist. 1c. II.*

501. est *Lactuca sylvestris murorum flore luteo* IB. 2. 1004. Wald Sonchen-Kraut, mit bleich gelben Blumen, in dem Illkircher Wald, und zu Niederbrunn, an dem Bach, aus denen Mauern, zu Barr in denen Neben. ann.

Chondrilla sonchifolio flore flore purpurascence T. *semiflosculoso, semine papposo, sive Sonchus purpureus* Col. Part. 1. 244. est. *Lactuca sylvatica purpurea* IB. 2. 1005. Wald-Lattich, mit Sonchen-Kraut, mit purpur rothen Blumen, in bergichten Wäldern hinter Barr, *Condrie rouge per me in hort. transposit. læte provenit. perenn.*

Chrysanthemum folio minus secto glauco T. sive *Chrysanthemum segetum* Lob. Ic. 552. est *Chrysanthemum arvense*, Tab. hist. 2. 366. Acker Gold-Blum, auf denen Feldern bey Illkirch, wie auch zu Oswald unter der Frucht. ann.

Circæa lutetianorum T. sive *Ocimum verucarium* IB. 2 977. *foliis solani, flore bipetalo, radice repente alba, fructu pyriformi oblongo*, Lobel. Ic. pag. 266. ♀ 412. *Circée* Wald-Kletten, in feuchten schattichten Büschen und Hecken, gegen Oswald. perenn.

Circæa minima T. sive *Circæa solanifolia alpina* CBp. Kleine Wald-Klette, auf dem Gebürg gegen Hochfeld, und Neuweiler, in dem Wald. perenn.

Cirsium arvense sonchifolio radice repente, flore purpurascence T. *composito, flosculoso odorato semine papposo*, *Chardon aux anes*, Haber oder Acker-Distel, Ic. Tab. hist. 1079. in Haber-Feldern,

deren, an denen Gräben und Landstraßen, vor dem Spithal-Thor. *perenn.*

Idem flore albo T. *suaveolente*, Haber-Distel, mit weissen wohlriechenden Blumen, an der Landstrasse gegen dem Wicthäusel, *perenn.*

Cirsium arvense sonchifolio, radice repente caule tuberoso T. flosculis albis odoratis, sive Carduus hæmorrhoidalis Paris. HRP. Haber-Distel mit knoslichten Stengeln, in dem XV. Wört, in dem Gansauer-Wald, auf einer Zussul, hinter des Försters Hof, *colligitur apud nos à Rhizotomis studiose lucri causa, ad compeſcendos hæmorrhoidum dolores. perenn.*

Cirsium pratense asphodeli radice latifol. foliis tenuiter incisiss T. sive lacea aculeata seu tuberosa Tab. hist. Ic. 4. 436. Stachel oder Glocken-Kraut, in der Ruprechtsau, neben denen Hecken in dem Nied, zwischen der Ill und dem Rhein, bey Schönau, *perenn.*

Cirsium pratense polycephalon vulgare T. sive Carduus palustris capitulo viscoso, foliis sinuosis per marginem rarioribus spinis cinctis, Wiesen Krampf, Alder-Kraut, mit vielen Blumen, auf feuchten Matten, bey dem Maurer-Hof, bey dem Rhein Ziegel-Ofen. *perenn.*

Cirsium asphodeli radice latifolium T. sive Carduus bulbosus Monspel. Lob. Ic. 10. breit blättrig Glocken-Kraut, auf feuchten Wiesen, hinter dem Ochsen-Wört. *perenn.*

Cirsium acaulon flore purpureo T. sive Chamaeleon exiguus Tragi IB. 3. 62. est *Carlina minor*

minor purpureo flore *Clus. hist. CLVI.* Kleine Eberswurzel, mit rothen Blumen, aller Orten, auf durren grasichten Orten. *perenn.*

Clematitis sylvestris latifolia T. seu dentata IB. 2. 125. flore albo rosaceo, semine plumoso anguloso subnigro, Liene ou herbe aux Gueux, Lienen oder Wald-Reben, mit zerkersten Blättern, Gänse-Mordt, Ic. 1. Tab. hist. 1273. in denen Bäumen, in der Ruprechtsau, und auf dem Weg, gegen Zulkirch. perenn.

Eadem foliis non incisus T. sive Clematitis latifolia integra IB. 2. 175. Wald-Reben, mit ganzen Blättern, ibid. perenn.

Clinopodium arvense ocymifacie T. Acinos multis IB. flore purpureo monopetalo verticillato labiato, semine oblongo Ic. 4. Tab. hist. 739. & in Rivin. Basilic sauvage, Stein-Boley, auf denen Fleckern zu Zulkirch, und Ruprechtsau. ann.

Clinopodium origano simile elatius majore folio T. seu Origani facie IB. 3. part. 2. 250. groser Wirbel-Dost, Ic. in Rivin. & Tab. hist. pag. 736. an denen Hecken, bey der Carthaus. perenn.

Clymenum Parisiense coeruleoflore T. papilionaceo coeruleo albo fructu siliquoso, semine orbiculari, sive Cicercula sylvestris Tab. hist. Ic. 4. 885. est Lathyrus sylvaticus Rivin. Richern mit Wischen-Blättern, auf der Kraft, auf feuchten grasichten Orten, oberhalb Blosheim.

Cnicus pratensis acanthifolio, flore flavescens T. flosculoso semine papposo, sive Carduus pratensis Tragi, Lob. Icon 11, IB. 3. 42. Wie-

sen

sen-Distel, mit gelblicht weissen Blumen, an der Breusch, vor dem weissen Thurn, zu Ostwald auf feuchten Wiesen. *perenn.*

Cnicus pratensis acanthi folio flore purpureo, T. humilior Wiesen-Distel, mit rother Blume, auf feuchten Matten, in der Ruprechtsau, und in dem Ostwinckel, *perenn.*

Cnicus sylvestris hirsutior sive Carduus benedictus T. flore luteo flosculoso, Cardebenedicten Chardon benit, Ic. Tab. hist. 1066. zu Schiltigheim, auf den Fleckern *ann.*

Conyza major vulgaris T. floribus subluteis flosculosis hirsutis, semine papposo, sive Conyza major Matthiol. Baccharis quibusdam IB. 2. 1051. Ic. Tab. hist. 243. Herbe à punaises ou chasse puce, grose Dürrwürzel, auf denen Gräben alter Stadtmauren, an der Mauer bey dem Spital-Thor. perenn.

Conferva cynosbatus seu Spongiola Rosæ sylvestris. Dodon. Schlaf-Kunzen, Hagenbutter-Schwämme, an denen wilden Rosen-Hecken.

Corallo Fungus flavus. Vaill. Tab. 8. fig. 4. sive Coralloides flava IB. 123. in apice dentata ramosa, gelber Corallenästiger Schwam.

Cucubalus Plin. T. seu Alfine Baccifera IB. 2. 175. flore albo caryophyllæo, fructu molli ovato nigro est Alfine repens majus Clus. hist. CLXXXIII. Hecken oder Busch Hüner-Darm, neben denen Fleckern, gegen Eingselsheim, in denen Hecken, in dem Steintal häufig. perenn.

Cuscuta major T. flore monopetalo campaniformi ex rubro pallescente, fructu subrotundo angulato sive

five *Cuscuta vel Cassuta* IB. 3. 166. *Cassitha* Tabern. hist. 1102. Seiden oder groß Filz-Kraut, *Cuscuta*, an grasichten Orten, an denen Stauden-Gewächsen, in der Ruprechtsau zu Oßwald. ann.

Cuscuta minor T. five *Epithymum* Tab. hist. 743. *Epithim*, kleine Flachs-Seide, auf dem Glacis, vor dem Steinstrasser und Weisenthurn Thor, auf denen Aeckern, an dem Flachs. ann.

Daucus annuus minor floribus rubentibus, rosaceis umbellatis, T. *Anthriscus quorundam semine aspero hispido* IB. 3. part. 2. 83. Aecker-Kletten, mit rothen Blumen, auf brachliegenden Aeckern zu Illkirch und Oßwald, an den Zäunen, gegen dem Wickhäusel. ann.

Daucus annuus minor floribus albis T. five *Anthriscus quorundam semine aspero hispido umbellis albicantibus* IB. 3. part. 2. 83. Aecker-Kletten, mit weissen Blumen, auf dem Glacis, der Citadell, auf denen Aeckern, gegen Hausbergen. ann.

Dens leonis foliis hirsutis & asperis caule aphylo T. five *Hieracium caule aphylo hirsutum*, IB. 2. 5037. Löwen-Zahn, mit haarichten Blättern, auf brachliegenden Aeckern, an verschiedenen Orten hinter dem Rhein Zoll. perenn.

Dens leonis foliis canescentibus villosis T. five *Hieracium montanum angustifolium foliis cichoraceis incanis lanuginosis quod Hieracium Hedypnoidis folio*, Clus. hist. CLXII an Sonnenreichen bergichten Orten, zu Oberbronn. perenn.

Digitalis lutea magno flore T. flore monopetalo

malo, fructu acuminato, seu Digitalis lutea
maior folio latiore, IB. 3. 813. est Di-

lutea Tab. hist. 244. große gelbe Finger-

hüttlein, auf dem obersten Gebürg, Halgenstein,
Blinschwenler, Digitale jaune perenn.

Digitalis purpurea, T. & 10h. B. 2. 812. folio
maior, große Fingerhüttlein, 1c. Rivin. Digitale rou-

ge, auf dem Gebürg, St. Ottiliae per me auf
Haulenberg. perenn.

Digitalis flore magno candido. T. & IB. 2.
hinter Blinschwenler, 3. Viertel Stund

häufig, per me auf dem Haulenberg. perenn.
Digitalis major lutea vel pallida, parvo flo-

re T. seu Digitalis flore subluteo angustiore fo-
lio IB. 2. 814. gelbe kleine Fingerhüttlein, auf

dem Hochgebürg zu Nappolswenler, oberhalb
Dusenbach, perenn.

Dipsacus sativus T. flore flosculoso semine stria-
to T. & IB. 3. 75. five Carduus fullonum Lob.

1c. 17. zahme Karten oder Weber-Distel, bey
Wörth.

Dipsacus sylvestris aut Virga pastoris major
T. Dipsacus sylvestris seu Labrum Veneris,

IB. 3. 74. flosculis flosculosis rubris, wilde Karten-
Distel, mit rothlichten Blumen, Chardon á foulon

á fleur rouge 1c. Tab. hist. 2. pag. 1070. an denen
Landstrassen aller Orten, perenn.

Dipsacus folio laciniato T. & IB. 3. 75. vel
secundus Tab. hist. 1c. 3. pag. 1071. flosculis albis flo-

sculosus, Karten-Distel, mit weissen Blumen, und
eingeschnittenen Blättern, am Weg, vor der er-

sten

sten Rhein-Bruck, hinter Schiltigheim am Was-
ser. *perenn.*

*Dipsacus sylvestris capitulo minore, vel Vir-
ga pastoris minor* CBp. est *Scabiosa angustifo-
lia flore subcoeruleo* HEyst. kleine wilde Kar-
ten-Distel, *petite verge á berger*, 1c. 3. Tab. hist.
1071. an dem Weg, linker Hand am Garten,
bey der Albruck häufig, wie auch zu Hohnheim
perenn.

Elichrysum seu Stoechas citrina latifolia T.
flore flosculofo semine papposo, sive *Stoechas citrina*
latiore folio IB. 3. 153. seu *Amaranthus luteus*
Tab. hist. 3. 778. Rhein-Blumen, Immerschön,
mit Schwefel gelben Blumen, und breiten Blät-
tern, bey Schweighausen, gleich vor dem Dorf
häufig, wie auch zu Birschweiler, auf der Ha-
genauer Hardt, bey Mergenthal. *perenn.*

Elichrysum seu Stoechas citrina angustifolia
T. sive *Stoechas citrina tenuifolia Narbonensis*
IB. 3. 154. Rhein oder Motten-Blumen, von
schwefelgelber Farbe, und schmahlen Blättern
ibid perenn.

*Elichrysum germanicum calice ex aureo ruti-
lante* T. Motten-Blumen, mit goldgelben Blu-
men, zu Merschweiler häufig. *perenn.*

Elichrysum spicatum T. sive *Gnaphalium re-
ctum* IB. 3. 160. *folio angusto oblongo, floribus floscu-
losis in caule positis*, groß schmahl blättria Ruhr-
Kraut, auf sandigen Orten, an der Breusch,
gegen Eckolsheim, in Gansauer Wald *perenn.*

Equisetum foetidum majus sub aqua repens
P CBp.

CBp. & 1B. 3. 731. *valde fragile, subcinerei coloris,*
stinkender Pferde-Schwanz, in der Ruprechts-
au, in schleimichten Wasser-Gruben *perenn.*

Equisetum foetidum tenuioribus ramulis per
extremitatem stellatis Dillen. Catal. plantar.
Giss. hart stinkend Pferd-Schwanz, in der Ru-
prechtsau. *ibid.*

Erysimum vulgare T. five Erysimum Tragi
1B. 2. 863. flosculis luteis cruciformibus, siliqua tenui
longa, quod Erysimum Irio 5. Tab. hist. 840.
Velar ou Tortelle, Weg-Senf, aller Orten, an
denen Wegen, neben den Mauren, auf dem
Graben alter Stadt-Mauer. ann.

Euphrasia officinarum T. five Euphrasia 1B.
3. 432. Augen-Trost / flore monopetalo anomalo bi-
labiato, 1c. in Rivin. 8. Tab. hist. 1246. aller Or-
ten auf denen Wiesen. ann.

Euphrasia minus ramosa, flore ex coeruleo
purpurascente HEyst. auf denen Wiesen bey
Obwald / bey dem Rhein Ziegel-Ofen häufig,
est Euphrasia Rivin. fleiner Augen-Trost, mit
blaulichten Blumen. ann.

Euphrasia ramosa pratensis flore albo, mo-
nopetalo personato amplo flore albo, fructu oblongo,
HEyst. Augen-Trost, mit grossen weissen Blumen,
auf der Lingsheimer Nachtweid häufig, auf
der Wiese, zwischen allen Lützen, und dem
Mauerhof. ann.

Faba flore candido lituris nigris conspicuo.
T. fructu siliquoso, five Faba major recentiorum
Lob. 1c. 57. est Faba, Tab. hist. 879. Welsche oder
Sau

San-Bohnen, auf denen Feldern aller Orten,
Grande Feve. ann.

Fagopyrum vulgare erectum T. folio hedera-
ceo, floribus purpurascens apetalis, semine triangula-
ri, Heide-Korn, in denen Feldern zu Drusen-
heim, 1c. Tab. hist. 646. Blé ann.

Fagopyrum vulgare scandens T. sive Hel-
xine semine triangulo IB. 2. 157. quod Volu-
bilis Tab. hist. 1264. Blé noir nigra Buch-oder schwarze
Winde, mit einen zecfigten schwarzen Saamen,
auf denen Aeffern, und neben dem Weg Of-
wald zu. ann.

Fagopyrum scandens altissimum dumeto-
rum, flore apetalo semine triangulari, Rupp. Flor.
Ien. steigendes Heide-Korn, auf der Elsau, in
denen Gärtners-Zäunen, auch bey den Stein-
straser Thor, auf der Contrescarpe ann.

Foeniculum vulgare germanicum T. foliis ca-
pillaceis, floribus rosaceis luteis, semine gibbo & stria-
to, Fenchel Fœnouil 1c. 2. Tab. hist. 147. auf denen
Gärtners-Feldern, und an den Reinen, der
Reben zu Ergersheim, und Wolcksheim. perenn.

Foeniculum sylvestre humilius Peucedani
foliis T. sive Caucalis Anglica, Tab. hist. 1c. 97.
flosculis albis rosaceis radice alba Stein-Fenchel, bey
Ofwald auf der Nachtwend. perenn.

Fucus fluviatilis aculeatus undulatus T. est
Fluvialis Pisana IB. 3. 779. foliis denticulatis, in
der Ill gegen Ofwald, nahe am Ufer, perenn.

Fucus tubulosus intestinorum forma T. aus-
gehölter Meer-Kohl. in stillstehenden faulen Was-

ser-Gräben, auf dem Weg in der Ruprechtsau.

Fungus crassus in metam surrectus T. *superne cinerei, in ferne ex flavo pallescentis coloris* est XX. gen. nox. fung. Clus. hist. CCLXXXIV. in dem Brumbter Wald.

Fungus truncis humi jacentibus innatus, pluribus ex pediculo prodeuntibus CBp. seu Amanita fasciculosa, ex luteo aut fusco rufa, radicibus arborum innascens Dillen. in dem Hagenauer Forst, an alten faulen abgehauenen Stößen der Bäume.

Fungus albus acris CBp. & Vaill. est Fungus Piperatus albus lacteo succo turgens IB. 3. 825. *vescus pileolo candido*, weisse Pfifferling, hin und wieder in Wäldern, an alten Buchen.

Fungus angulosus & veluti in lacinias sectus CBp. est *Fungus luteus pallidus*, Chanterelle dictus se contorquens esculentus IB. 3. 832. est Fungus nemorum Lob. Ic. 273. Rötling oder Augst-Schwämme, Ic. Vaill. Tab. XI. fig. 14. & 15. in dem Brumbter Wald, an alten abgehauenen Stämmen der Bäume.

Galeopsis procerior caliculis aculeatis, flore purpurascente T. *monopetalo labiato, semine oblongo*, sive Cannabis sylvestris quorundam Lob. Ic. pag. 527. est Cannabis spuria Rivin. stachelichte Acker-Nessel, mit rothen Blumen, an der Landstrasse, in denen Gräben und Hecken, gegen Eckbolsheim, in feuchten Gräben am Weg, nach Schiltigheim, Tab. hist. Ic. 2. pag. 936. ann.

Galeopsis procerior caliculis aculeatis flore flave-

flavescente T. five Cannabis sylvestris spuria tertia Lob. lc. 528. stachelichte Acker-Messel, mit bleich gelben Blumen, bey der Earthaus, an denen Zäunen, auf denen Aeckeren, gegen Schiltigheim. *ann.*

Galeopsis procerior, caliculis aculeatis floribus candidis T. Acker-Messel, mit ganz weissen Blumen, oberhalb der grünen Wart, neben der Landstrass. *ann.*

Galeopsis procerior foetida spicata T. five Galeopsis vel Urtica iners magna foetidissima IB. app. 853. est Lamium maximum sylvaticum foetidum, flore monopetalo labiato purpurascence punctato, stinckende Wald-Messel, in denen Hecken und Hölzern aller Orten, est Urtica V. Tab. hist. 921. & in Rivin. sub nomine Stachys sylvatica. *perenn.*

Galeopsis patula segetum, flore purpurascen- te, T. five Ladanum segetum, flore rubro quorundam, IB. 855. est Alyssum Galeni flore purpureo Tab. hist. lc. 2. pag. 928. purpurrothe Alyssen, oder Kornwuth, auf denen Aeckeren, hin und wieder, Ic. Rivin. sub nomine Ladanum segetum folio latiore *ann.*

Eadem flore albo T. weisse Korn Wuth, auf dem Gebürg, gegen Urbisthal, anno præterito sub oculos cecidit, zu Brischwickersheim, auf brachliegenden Aeckern.

Galeopsis palustris betonicae folio, flore variegato T. five Galeopsis angustifolia foetida IB. 3. app. 854. est Clymenum minus Dalech.

Lugd. 1357. in HEyft est *Lysimachia Galericalata*.

Gentiana major lutea T. seu vulgaris major Ellebori albi folio IB. 3. 520. flore monopetalo campaniformi, groß Engian, Bitterwurzel, wächst häufig auf dem Bölchen, in dem Obern Elsaß, auf welchem sich ein unergründlicher Teich befindet, so mit Felsen umgeben, und Ao. 1740. bey der allgemeinen Wasserfluth, oberhalb an zweyen Orten gesprungen, und viele Dörfer verwüstet hat, und so er unterhalb Rust bekommen, geglaubet wurde, daß dadurch ganz Elsas hätte, zu grund gehen müssen. *perenn.*

Gentiana cruciata T. five *Gentiana minor*, seu *Vulgi cruciata* IB. 3. 522. est *Gentiana* III. Clus. hist. 313. floribus purpureis monopetalis campaniformibus erectis & cruciatim dispositis, radice longa alba, fructu ovato semine plano marginato, *Gentiane croisée* Modelgeer, Creukwurk, zu Oßwald Lingelsheim und Gansauer Wald häufig, 1c. *Tab. hist. pag. 1104 perenn.*

Gentiana major purpurea T. seu magno flore purpureo IB. 3. 521. est *Gentiana major purpureo flore* Clus. hist. 312. auf dem Gebürg bey Oberbronn und in dem Urbisthal. *perenn.*

Gentiana angustifolia autumnalis major T. five *Pneumonanthe*, *Tab. hist. 1176.* Wasser Lungen-Blum, Lungen-Engian, bey dem Krümmmeri, und auf denen Gansauer Matten häufig. *perenn.*

Gentiana autumnalis ramosa T. five *Gentiana*

tiana annua *Clus.* 1. *flore ex cœruleo purpureo* *IB.* 3. 526. auf der Gansau vor dem Wald zu Illkirch, in dem Wald häufig. *ann.*

Gramen spicatum spica cylindracea tenuissima longiore T. five *Gramen cum cauda muris purpurascente* *IB.* 2. 473. est *Gramen Alopecuroides minus alterum* *Lob. Ic.* 9. Fuchs's Schwanz Gras, auf der Contrescarpe, vor dem Weisen-Thurn, neben denen Fleckern, fast aller Orten, vor dem Steinstrasser Thor. *perenn.*

Gramen spicatum spica cylindracea crassiori T. five *Gramen Typhinum* 11. *Tab. hist. pag.* 531. Liesch-Gras, hinter Barr auf denen Matten *perenn.*

Gramen paniculatum autumnale, panicula ampliore ex viridi nigricante T. five *Gramen Harundinaceum montanum* *Tab. hist. pag.* 541. vel *enode* *IB.* 2. 481. Berg Ried-Gras, auf Berg-Waldungen, hinter Wassenburg, hinter Heiligenstein, in dem Hagenauer Forst. *perenn.*

Gramen montanum panicula spadicea delicatior, *IB.* 2. 476. auf dem Niedecker Gebürg *perenn.*

Gramen montanum panicula miliacea sparsa *CB. prodr.* 17. ♂ *IB.* 2. 462. Berg Gras, mit einem Hirse-Strauß, auf dem Gebürg gegen Niedeck.

Hieracium chondrillæ folio glabro radice succisæ majus T. *flore semiflosculoso semine papposo*

sive *Hieracium minus*, præmorfa radice Fuchs. *IB.* 2. 1031. & Lob. *lc.* 237. *lc.* *Tab. hist.* 4. 491. Habicht-Kraut, mit Chondrillen Blättern, und Abbis Wurzel, an denen Gräben, der Landstrass nach Hohnheim, bey der ersten Bleich am Wasser-Zoll, auch auf denen Wiesen, *perenn.*

Hieracium chondrillæ folio glabrum T. sive *Aphacoides* *Tab. hist. lc.* 5. 492. Habicht-Kraut, mit Pfaffenröhrleins-Kraut, ähnlichen Blättern auf der Contrescarpe, zwischen dem weissen und Cronenburger-Thor, auf denen Wiesen hin und wieder. *perenn.*

Hieracium chondrillæ folio hirsutum T. sive *Hieracium folio & facie Chondrillæ* Lobel. *lc.* 239. & *Tab. hist.* 11. 494. an denen Wegen, und an denen Hecken, zu Eschau und Zülkirch. *perenn.*

Hieracium foliis coronopi T. *atro virentibus seu nigrum* *Tab. hist. lc.* 3. 491. Schwarzh Habicht-Kraut, zu Oßwald, Zülkirch, und Esbolsheimer Wald, auf den Glacis, um die Stadt. *perenn.*

Hieracium fruticosum latifolium foliis dentatis glabrum T. sive *Hieracium majus latifolium Pannonicum* 2. *Clus. hist. CXL. IB.* 2. 1027. Habicht-Kraut, mit breiten glatten Blättern, bey Keisersberg, in denen Hecken. *perenn.*

Hieracium fruticosum hirsutum angustifolium majus T. sive *Hieracium rectum rigidum quibusdam Sabaudum* *IB.* 2. 1030. Berg Habicht-Kraut,

Kraut, mit schmahlen harten Blättern, auf dem Berglein, bey Mittelbaufbergen, *perenn.*

Hieracium pilosellæ folio erectum majus T. five *Pilosella minori flore hirsutior & elatior non repens* IB. 2. 1040. est *Pilosella major altera* Ic. Tab. hist. 3. 507. grose Mauf-Dehrlein, oder groß aufrecht stehendes Habich-Kraut, mit baarichten Mauf-Dehrlein Blättern, auf den Wiesen bey Gravenstaden, auf dem Glacis, vor dem Fischer Thor, an denen Mauren. *perenn.*

Hieracium pilosellæ folio erectum minus T. five *Pilosella major.* Tab. hist. 1c. 2. 507. Habich-Kraut, mit langen spizigen Blättern, und bleich gelben kleinen Blumen, in denen Waldungen, hinter Heiligenstein. *perenn.*

Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro T. five *Hyoferis angustifolia* Tab. hist. 1c. 2. 490. klein Ferklein-Kraut, auf der Mehgerau, vor dem Fischer-Thor. *perenn.*

Hieracium minus dentis leonis folio sub aspero T. five *Hypocheiris porcellia* Tab. hist. 489. Ferkel-Kraut, *Salade de porco*, in der Kuprechtsau, auf der Promenade *perenn.*

Hieracium dentis leonis folio obtuso majus T. five *Hieracium macrocaulon junceum primum* Dodon. IB. 2. 1031. est *Hieracium longius radicum* Tab. hist. 1c. 7. pag. 492. caule fistuloso, Habich-Kraut, mit Pfaffen-Röhrlein Blättern, und großen Wurkeln, auf den Wiesen bey Ofwald, und dem Canal, an den Neben bey Barr. *perenn.*

Hieracium murorum folio minus piloso non

maculato T. HAP. *folio angustiore indissecto seu Pulmonaria gallica tenuifolia* Tab. hist. 505. Buch: Kohl, mit schmahlen Blättern, ohne Flecken, in dem Wald zu Ingwenler. *perenn.*

Hieracium murorum laciniatum minus pilosum T. five Pulmonaria Gallica foemina Tab. hist. 1c. 2. pag. 504. Buch: Kohl, mit gefleckten Blättern, und auf denen alten Mauren. *ibid.*

Hieracium luteum hirsutum T. & IB. 2. 1024. an der Landstrasse, vor dem Spithals Thor, in der Ruprechtsau *perenn.*

Hordeum distichum, quod spica binos ordines habeat T. *flore apetalis, semine oblongo acuto* seu Hordeum distichum æstivum trimeste minus 1c. 2. Tab. pag. 621. Sommer Gerste, Futter Gerste, auf allen Feldern. *ann.*

Hordeum distichum spica nitida Zea feu Briza nuncupatum T. five Briza monococcos Dod. Lob. 1c. 31. 1c. Tab. hist. 2. pag. 608. Einforn zu Drusenheim und Weisenburg. *ann.*

Hordeum distichum Zea dicoccos dictum Tab. hist. 1c. 1. pag. 608. Spelz, *ibid.* *ann.*

Hordeum polystichum vernum T. five Hordeum polystichum æstivum Tab. hist. 1c. 3. 621. Sommer Gerste, mit vielen Reihen, *ann. ibid.*

Hordeum polystichum hybernum T. five majus, Tab. hist. 1. pag. 621. Wintergerst.

Hottonia Boerh. Ind. plant. alter 207. five Millefolium aquaticum Viola aquatica dictum. IB. 1782. *floribus sub purpurascens, rosaceis, foliis pennatis, caule erecto nudo,* Wasser-Violen, mit auf-

aufrechtstehendem Stengel, und purpurrothen Blumen, beyh XV. Wört, in der Ruprechttau, in einem Graben. *perenn.*

Iacea pratensis nigra latifolia T. five *Iacea nigra vulgaris capitata & squamosa* *IB.* 3. 27. *piloso folio non lacinato, flore flosculoso purpureo, semine papposo, Flocken-Baum / Iacée* *lc. Tab. hist.* I. 436.

Iacea nigra laciniata T. five *Iacea austriaca* *VI. Clus. hist.* Flocken Blum, mit gekerzten Blättern, auf denen Wiesen, auf der Contrescarpe, vor dem weissen Thurn. *perenn.*

Iacea cum squamis cili instar pilosis T. & *IB.* 3. 28. five *Cyanus foliis imis ad basin pinnatis, superioribus integris ovato lanceolatis* *Haller.* 691. ubi *Icon egregia*, auf denen Wiesen zu Eckbolsheim, zu Obwald und Zllkirch. *perenn.*

Iacea nemorensis quæ Serratula vulgo T. five *Serratula* *IB.* 323. *foliis serratis ad radicem integris reliquis profunde incisis flore purpureo flosculoso, Scharren-Kraut*, auf denen Wiesen, beyh Mauerhof, und in dem Zllkircher Wald. *perenn.*

Eadem flore albo T. *Scharren-Kraut*, mit weissen Blumen, *rarius occurrit. perenn.*

Iacea nigra angustifolia vel Lithospermi arvensis foliis caule aspero T. Schwarze Flocken-Blum, mit schmahlen Blättern, und rauhen Stengel, auf dem Glacis, vor dem weissen Thurn und Cronenburger Thor, auf: denen Wiesen, gegen Eckbolsheim. *perenn.*

Iacea

Iacea vulgaris laciniata flore purpureo T. five *Scabiosa major squamatis capitulis* CBp. *Ic. Tab. hist. 3. pag. 435.* est *Centaurium collinum* Gesneri, flore purpureo *IB. 3. 32.* gemei-
ne grose Flocken-Blum, mit zackichten Blättern,
auf denen Fleckern, bey Schwald und Nieder-
haußbergheim, und andern heckichten Orten,
perenn.

Iacea integrifolia humilis CBpr. 127. nie-
drig stehende Flocken-Blum, mit ganzen Blät-
tern, bey den Eckbolsheimer Ziegel-Ofen, *perenn.*

Iacobaea palustris altissima foliis ferratis T. *floribus radiatis semine papposo*, five *Virga aurea angustifolia ferrata*, five *Consolida palustris*, *Tab. hist 946.* vel *Lingua avis* Dalechamp. *IB. 2. 1063* Wasser gulden Mund-Kraut, an dem Ufer der Ill, gegen Schwald. *perenn.*

Iacobaea latifolia *IB. 2. 1057.* St. Jacobs-
Blum, mit breiten Blättern, an denen Hän-
dern Gebüsch und Wälder, zu Aakweiler.

Iuncus acutus panicula sparsa T. five *Iun-
cus foliaceus* *IB. 2. 521.* Iunc kleine Weyher-Binse,
mit flattrichten Strauß. *Ic. Tab. hist. 3. pag. 566.*
an feuchten sumpfigten Orten, auf denen Wie-
sen zu Schwald. *perenn.*

Iuncus acumine reflexo minor & trifidus T.
feu *Iuncus trifidus* *IB. 2. 521.* Moß-Binze, in
der Ruprechtsau, in sumpfigten Orten, in dem
Eckbolsheimer Wald, in wässerichten Gruben.
perenn.

Iuncus palustris humilior erectus T. feu
Holo-

Holostium Matthioli junceum IB. 2. 510. ☞
Lob. Ic. 18. Krotten-Gras, auf wässerichten Wie-
 sen, aller Orten, in der Ruprechtsau.

Juncus foliis articulatis floribus umbellatis
 T. est *Gramen aquaticum* *Tab. hist. Ic.* 1. pag.
 529. Wasser Bingen-Gras, auf wässerichten
 Matten, zu Obwald und Gravenstaden. *perenn.*

Juncus parvus cum pericarpis rotundis IB.
 seu *Gramen junceum* III. *Tab. hist. Ic.* 3. 535.
 gar klein Bingen-Gras, in sumpfigen Orten,
 unten an dem Glacis, vor den Metzger und
 Spithal-Thor. *perenn.*

Lactuca sylvestris odore viroso T. flore luteo
semiflosculo, caule lactescente semine papposo *Ic. Tab.*
hist. pag. 807. Laitue sauvage. wilder Lattich,
 auf der Contrescarpe, vor dem Steinstrasser-
 Thor häufig, auf denen Gräben, alter Stadt-
 Mauren, *perenn.*

Lactuca sylvestris costa spinosa T. five En-
divia multis dicta, folio laciniato dorso spino-
so IB. 2. 1003. ☞ in *Matthiol. Epit.* 300. Leber-
 Distel, Gänse-Zung, vor dem Fischer-Thor
 häufig, und auf denen Wällen, *ann.*

Lactuca montana latifolia laciniata, flore coe-
ruleo T. five *Sonchus coeruleus latifolius* IB.
 2. 1005. est *Sonchus laevis* IV. *Tab. hist. Ic.* 6.
 500. Wald-Lattich, blauer Hasen-Kohl,
perenn.

Lactuca perennis humilior flore coeruleo,
 T. five *Chondrilla caerulea* IB. 2. 1019. ☞ *Tab. hist.*
Ic. 1. pag. 486. blau Chondrillen-Kraut, auf dem
 Paß-

Nachberg, zu Buchsweyler, und auf denen Frucht-Neckern daselbst, perenn.

Lapathum minimum T. *store apetalò semine triangulari* & Tab. hist. Ic. 4. 824. seu Lapathum acutum minimum IB. 2. 985. Kleine Grind-Wurzel, mit zugespigten Blättern, in denen Gräben, gegen dem Wicshäusel, auf feuchten Neckern bey Zülkirch. *plus petit patience perenn.*

Lapathum aquaticum folio cubitali T. five Lapathum maximum aquaticum five Hydro-lapathum, IB. 2. 986. est Lapathum palustre Tab. hist. Ic. 5. pag. 824. Wasser-Umpfer, Butterwecken-Kraut, aut Herba vera & genuina Britannica veterum Munting. Icon. 1. pag. 695. *plus grande Patience aquatique*, in dem Stadt-Gräben, vor dem Metzger-Thor. perenn.

Lapathum aquaticum minus T. five Hydro-lapathum minus Tab. hist. Ic. 6. 824. est Lapathum vulgare minus Munt. hist. pag. 690. Klein Wasser Grind-Wurzel, aller Orten, in feuchten Gräblein, und andern wässerichten Orten. *Petite Patience aquatique perenn.*

Lappa major Arctium Dioscoridis T. five Personata, Lappa maior aut Bardana IB. 3. 570. & Lob. Ic. 588. Ic. 1. Tab. hist. p. 1157. *store composito flosculoso purpureo, folioli latiore integro, capitulis tomentosis semine papposo; est Bardana officinar.* Bardane ou Grand Glouteron, grose Kletten, mit wollichten Köpfen, und rothen Blumen. perenn.

Lappa capitulis glabris Halleri pag. 675. five Personata seu Lappa major Matthiol. Epit. pag. 887. & IB.

♂ IB. 3. 570. groſe Kletten, mit glatten zackich-
ten Köpfen, bey Hohnheim. *perenn.*

*Lappa majore montana capitulis minori-
bus rotundioribus & magis tomentosis T. five
Personata altera cum capitulis villosis IB. 3.
571. Berg-Kletten, mit röthlichten Köpfen, auf
den Wassenburger Gebürg perenn.*

*LasERPitium foliis latioribus lobatis Moris
uinbell. 29. & T. flosculis albis rosaceis, semine stria-
to, groſe weiſe Hirsch-Wurzel, auf dem Gebürg
hinter Hochfelden, ingleichen zu Hochfeld, bey
der Melckeren, Ic. 1. Tab. hist. pag. 312. perenn.*

*Lavendula angustifolia T. flore monopetalo la-
biato caeruleo, Lavendul, mit blauen Blumen, al-
ler Orten in Gärten, Ic. Tab. hist. 3. 755. perenn.*

*Eadem flore albo IB. 3181. Lavendel mit wei-
ſen Blumen.*

*Lavandula latifolia T. five Pseudonardus
quæ vulgo Spica IB. 3. part. 2. 281. Spick Aspic
ou Nard commune perenn. ibid.*

*Lepidium latifolium T. five Lepidium Pau-
li IB. 2. 940. flosculis albis cruciformibus, foliis oblon-
gis, gustus acerrimi, radice alba repente. semine ob-
longo, Pfeffer / oder Fleisch-Kraut, Ic. Tab. hist.
847. in Gärten. perenn.*

*Lens major T. & IB. 2. 317. flore papiliona-
ceo fructu brevi siliquoso, semine orbiculari convexo,
groſe Linsen, Pfennig-Linsen, auf denen Gart-
ners und Bauren-Meckern, Lentille Ic. Tab. hist.
858. ♂ in Rivin. ann.*

*Lens vulgaris semine subrufo T. five Lens
IB. 2.*

IB. 2. 317. kleine gemeine braune Koch-Linsen.
ibid. ann.

Lens vulgaris semine ex luteo pallido T. ge-
meine weise Koch-Linsen. *ibid.*

Lentibularia vulgaris HRP. & Rivin five
Millefolium aquaticum flore galericulato lu-
teo, *Lobel*, 791. ♂ IB. 3. 783. *monopetalo ano-*
malo. Wasser-Fenchel, mit gelben Blumen, vor
dem Fischer-Thor, in denen Wasser-Gruben,
rechter Hand, ingleichen zwischen dem Canal,
und dem Eckbolsheimer Wald. *perenn.*


Ligustrum T. & IB. 1. 528. *flore albo monope-*
talo infundibuliformi odorato fructu globoso nigro se-
mine gibbo, Hartriegel Bein-Holz, Fræne Ic.
Tab. hist. 1454. *perenn.*

Ligustrum foliis é luteo variegatis HAP. five
Ligustrum variegatum Munting. *hist.* 258. Fræne
panachée, Hart-Kiegel, mit gelb gefleckten Blät-
tern / in dem Ruprechtsauer und Züllicher
Wald. *perenn.*

Lingua cervina officinarum T. *Phyllitis* seu
Lingua cervina vulgi, IB. 3. 756. *Phyllitis vul-*
garis Clus. *hist. floribus in aversa parte provenientibus*
muscosis luteis *Langue de cens*. Hirsch-Zung, Ic. *Tab.*
hist. 1192. hinter Barr, in denen schattichten
Bergen. *perenn.*

Lotus pentaphyllos minor glabra, foliis lon-
gioribus & angustioribus H. Edinb. & Vaill. est
Lotus pentaphyllos frutescens, tenuissimis
glabris foliis CBp. Kleiner Schoten Klee, vor
dem Fischer-Thor, nahe an dem Ziegelofen. ra-
rioris est proventus. Lychnis

Lentibularia Rivin.



J. Strickbeck. sculp.

Lychnis sylvestris quæ *Behen album* vulgo foliis angustioribus T. *flore caryophyllæo* auf den Wiesen beyrn Mauerhof, an den Glacis, der Citadell gegen dem Rhein-Zoll häufig. *perenn.*

Lychnis annua minima, *flore carneo, lineis, purpureis distincto* T. *sive Betonica vel Tunica minimæ similis planta* IB. 338. in dem Ostwinckel, auf denen Aeckern, gegen der hohen Warth. *ann.*

Lycopus palustris glaber T. *flore monopetalo labiato, semine subrotundo*, *sive Marrubium aquaticum quorundam* IB. 3. 318. *foliis hirsutis lacinatis, floribus monopetalis campaniformibus albis*, weiser Wasser Andorn, an denen Wasser Gräben, gegen der grünen Warth. *lc. in Rivin. sub nomin. Pseudo marrubii perenn.*

Lycopus palustris foliis in profundas, lacinias incisis T. zu Osward, in einem Graben bey der letzten Brücke *perenn.*

Lycopus palustris villosus T. *sive Marrubium palustre hirsutum* CBp. in der Ruprechtsau, bey der ersten Bleich, bey der Walckmühl, nahe an der Brück *perenn.*

Lyfimachia lutea major quæ *Dioscoridis* T. *sive Lyfimachia lutea* IB. 2. 901. *flore monopetalo rotato, fructu globoso*, gelber groser Weidrich, *Perce bossé. ou Lyfimachie*, zu Osward in denen Hecken. *perenn.*

Eadem foliis ternis T. quæ *Lyfimachia lutea* HE. in der Ruprechtsau, an den Wasser, an Gräben *perenn.*

Eadem foliis 4ternis & quinis , non sunt diversæ species, sed solummodo variationes, quod bene annotavit Bærhave.

Marrubialtrum vulgare T. five Stœchas arvensis minima Rivin. caule quadrangulo subhirsuto, foliis serratis, floribus subcæruleis verticillatis monopetalis labiatis, semine subrotundo , auf denen Aeffern unter der Gerste, ann.

Marrubium album vulgare T. & IB. 3. 316. floribus monopetalis verticillatis labiatis, folio incano rugoso , semine oblongo. weiser Andorn , Marrube blanc Tab. hist. 925. & in Rivin. auf dem Schießrein , bey denen Gärten , an dem Weg gegen dem Rhein zu. perenn.

Marrubium Cardiaca dictum T. flore purpureo labiato, Herkgespan, Agripaume & in Rivin Ic. 1. Tab. hist. 535. an denen Zäunen , in der Ruprechtsau , und andern Orten mehr. perenn.

Mays granis aureis T. five Triticum Indicum, IB. 2. 453. floribus apetalis, semine subrotundo. plures ejus sunt species uti videre est in Instit RH. Tournef. pag. 531. Türckisch oder Welschkorn, Blé de Tourquie , auf denen Feldern ann.

Melilotus capsulis reni similibus, incapitulum congestis T. flore papilion. seu Trifolium pratense luteum Mas , flore minore, semine multo IB. 3. 280. est Trifolium arvense , Tab. hist. Ic. 3. 908. vel Melilotus minima Rivin. gelber Wiesen oder Feld-Klee , auf durren Wiesen und Aeffern gegen Ochwald. ann.

Mentha aquatica T. flore monopetalo labiato, five

p.245.

Pulegium Serpens



Tab. X.



J. Striedbeck. sculp.

five Pulegium IB. 3. part. 2. 256. Voley Puliot. Ic. 3. Tab. hist. 730. ♂ in Rivin. in sumpfsichten und feuchten Orten, in der Ruprechtsau und vor der grünen Wart. perenn.

Eadem flore albo T. Voley, mit weissen Blumen, an der Landstrasse, gegen allen Lüften. perenn.

Mentha aquatica five Pulegium vulgare humifusum non repens, cauliculis longissime se extendentibus ruberrimis, floribus in globum congestis, foliis minoribus. nobis, auf denen Sandbäncken, wo die Breusch in die Ill fällt. perenn. vid. Tab. nostr. X.

Mentha arvensis verticillata hirsuta T. IB. 3. part. 2. 217. floribus monopetalis labiatis, hirsutis fulvis Ic. Tab. hist. 1. 737. ♂ in Rivin. Calament sauvage, Acker-Münze, auf Aekeren, bey Haubbergen, auf der Lingelsheimer Nachtwend, perenn.

Mentha rotundifolia palustris feu Aquatica major T. Mentha aquatica five Sisymbrium IB. 3. part. 2. 233. est Mentha rubra officinarum, flore monopetalo labiato, pallide rubescente, rothe Bach oder Fisch-Münze, in allen Stadt-Gräben, Ic. Tab. 3. hist. 736 ♂ in Rivin. perenn.

Mentha sylvestris, longioribus, nigrioribus & minus incanis foliis T. five Mentha spicata folio longiore acuto glabro nigriori, IB. 3. part. 2. 220. Schwarze Hof-Münzen / in dem Weg gegen Gutleuthen, nach dem Schiltigheimer Feld, wo man gemeiniglich die Wecken verkauft. perenn.

Millefolium aquaticum umbellatum, capillaceo breviquefolio CBp. five *Millefolium & Foeniculum aquaticum* Tab. hist. Ic. 1. Tab. hist. 186. in sumpfsichten und stillstehenden Teichen.

Nicotiana major latifolia T. flore monopetalo infundibuliformi purpurascente, folio molli acuminato integro, fructu oblongo Tabac, Herbe de la Reine Ic. Tab. hist. 971. auf denen Felderen. ann.

Nigella arvensis cornuta T. five *Melanthium sylvestre vel arvense* IB. 3. 209. flore sub caeruleo rosaceo, foliis fœniculaceis, fructu oblongo, St. Catharinen Blumen, wild Narden-Kraut, Ic. 4. Tab. hist. 192. auf Saam Feldern, nach vollendter Erndte, zu Osward. ann.

Onagra latifolia T. five *Lyfimachia lutea corniculata* flore monopetalo rosaceo, fructu cylindraceo, gelber gehörneter Wendrich, an dem Weg gegen dem Rhein-Zoll, oberhalb der Rheinbruck, in der Ruprechtsau/ gegen Aluenheim am Rhein. perenn.

Onobrychis foliis viciæ fructu echinato major T. flore eleganter rubente papilionaceo, fructu siliquoso, Mahnen-Kamm, mit röthlichten Blumen, Sain foin ou Espavette, est *Polygala Gesneri*, IB. 2. 335. Ic. in Rivin. in denen Klammern, bey Niederhaufbergen, und Brischwicksheim häufig, perenn.

Onobrychis foliis Viciæ, fructu echinato major, caulescens & ramosa Schol. Bot. auf denen Berglein, zu Mundelsheim. perenn.

Oreoselinum apii folio majus T. flore rosaceo

um.

umbellato, semine ovato striato, sive Libanotis altera quorundam, aliis dicta Cervaria nigra IB. 3. part. 2. 165. Schwarze Hirschmursel, Berg-Peterlein, Ic. 3. Tab. hist. pag. 313. est *Cervaria Rivin.* & *Garidel hist. plant. Tab. 116.* auf durren Wiesen, oberhalb Bennisfeld häufig. *perenn.*

Oreoselinum apii folio minus T. sive *Apium montanum Dalechampii* IB. 3. part. 2. 103. Ic. 1. Tab. hist. 276. *Persil de Montaigne*, Berg-Peterlein, Berg-Eppich, auf Bergmatten, auf dem Halgensteiner Hochgebürg.

Oreoselinum pratense Cicutæ folio T. sive *Umbellifera allatica magna, umbella parva sub-lutea*, IB. 3. part. 2. 106. gelber Bogels-Nest, auf feuchten Matten, bey Ehrstein und Weisenburg *perenn.*

Origanum sylvestre T. sive *Origanum vulgare spontaneum* IB. 3. 236. *flore purpureo monopetalo labiato, semine subrotundo* Wohlgemuth, Dosten, Origan Ic. Rivin. Tab. hist. 4. pag. 726. in denen Hecken zu Osrowald, und an denen Reinen, der Strassen *perenn.*

Origanum sylvestre album sive *Origanum album*, Tab. hist. Ic. 1. 725. Dosten mit weissen Blumen, an den Zäunen und Gräblein, nach der Earthaus, bey Mittelhausbergen, in den Reben *perenn.*

Orobanche ramosa floribus cœruleis T. *monopetalis anomalis personatis, fructu oblongo unicapsulari*, Hanfwürger mit blaulichten Blumen, aller

Orten, in Tabac-Stücker zu Schiltigheim. *perenn.*

Orobanche ramosa floribus purpurascen-
tibus T. seu Orobanche minor, purpureis flori-
bus sive ramosa IB. 2. 781. Hanfwürger mit
röthlichen Blumen. *ibid.*

Orobanche ramosa floribus sub albidis T.
Hanfwürger, mit weissen Blumen, auf Tabac-
Stücker zu Oßwald.

Parnassia vulgaris & palustris T. *flore rosaceo
fructu ovato*, Gramen Parnassi Dodon. quibus-
dam Hepaticus flos, IB. 3. 537. weisse Herk-
Blumen, Ic. 2. Tab. hist. 527. in dem Zäfircher
und Eckbolsheimer Wald. *perenn.*

Pedicularis ferotina lutea T. *flore monopetalo
anomalo*, sive Coris Monspeffulana lutea IB. 3.
433. est Odontites flore luteo Rivin. gelber
Augentrost, bey dem Eckbolsheimer Ziegelofen, an
Eingelsheimer Wäldlein,

Perficaria mitis maculosa T. *floribus apetalis
purpureis spicatis*, sive Perficaria mitis IB. 3. 777.
est Perficaria II. Tab. hist. pag. 1240. gelind
fieckigt Flöh-Kraut, mit rothen Blumen, *Perfi-
caire tacheté*, aller Orten, in sumpfigten Grun-
den, in der Ruprechtsau. *perenn.*

Perficaria mitis non maculosa T. *floribus pur-
pureis*, Flöh-Kraut, mit röthlichen Blumen und
Blättern, ohne Flecken, *ibid.* *perenn.*

Perficaria mitis non maculosa *floribus candidis*
gelind Flöh-Kraut, ohne Flecken, mit weissen
Blumen, vor dem Juden-Thor, hinter der Ci-
tadell. *perenn.*

Per-

Perficaria mitis cum maculis ferrum equinum referentibus T. sive *Perficaria mitis maculosa* Lobel. Ic. 315. gelind Flöh-Kraut, mit Roß Eisen gleichenden, gefleckten Blättern, um den Mauerhof, auf Kraut-Meckeren häufig. *perenn.*

Perficaria minor T. sive *Perficaria pusilla*, repens Lob. Ic. 316. & Tab. hist. Ic. 3. 1240, Klein Flöh-Kraut, mit rothen Blumen, auf feuchten Meckeren und andern sumpfigen Orten, bey Ohwald unter denen Weiden-Bäumen. *perenn.*

Perficaria angustifolia T. *caule rubente laevi ac geniculato, spicis oblongis, floribus ex geniculis pallide purpurascens apetalis*, est *Perficaria pumila* Tab. 1240. *semine ovato*, Flöh-Kraut, mit schmalen Blättern, und röthlichten Stengel, wie auch bleichrothen Blumen, in sumpfigen Orten, bey dem Lazareth, in der Ruprechtsau an dem Rhein. *perenn.*

Perficaria salicis folio, *Potamogeton angustifolium* dicta Ray Hist. Saam-Kraut, mit Weiden-Blättern, in Teichen und Wasser Gräben um die Stadt, vor dem weissen Thurn. *perenn.*

Perficaria urens seu *Hydropiper* T. IB. 3. 780. Est *Perficaria acris, floribus rubentibus in spicam non compacte congestis, sed magis á se invicem distantibus. folio longo*, Courage Ic. 1. Tab. hist. 1240. Wasser-Pfeffer, brennend Flöh-Kraut, mit langen Blättern, und rothen Blumen, auf dem Schießrein am Wasser, bey der Brücke gegen Echiltigheim, dicitur *acris non ab urendo sed ob foliorum & seminis saporem quadantenus acrem.*

Perficaria palustris fluitans, foliis brevioribus & latioribus, florum spica spinosa purpurea compactiore Rupp. Flor. Jen. Wasser-Pfeffer, mit rundlichten Blättern, und dicht gedrückten Blumen, bey Oßwald mitten in der Zül, gegen des Herren Prætoris Schloß über häufig, am Ufer gegen Oßwald der Zül. *perenn.*

Polium Lavendulæ folio T. *flore monopetalo labiato albo, quod Ajuga folio integro est* Rivin. sive *Polium recentiorum foemina Lavendulæ folio* Lob. Ic. 488. & Tab. hist. Ic. 5. 750. wilder Lavendel, Berg-Poley, über dem Mauerhof, rechter Hand gegen Oßwald, an einer steinichten Grube, auf der Meßgeran, an deren Hügeln, hin und wieder *perenn.*

Polium lavendulæ folio angustiori T. sive *Polium campestre* Tab. hist. Ic. 6. 750. wilder Lavendel, mit schmahlen Blättern, auf dürren Wiesen, gegen der Gansau, bey der hohen Wart, auf erhabenen sandigen Henden. *perenn.*

Polygonifolia, floribus & seminibus extremis ramulis acervatim congestis Dillen. Catalog. Plant. *flosculis albis rosaceis*, est *Polygoni-vel Linifolia* per terram sparsa flore, scorpioides IB. 3. 379. Ic. vid. Tournefort Alsat. sub nomine *Alfine palustris minor* Tab. 11. hist. c. bey Wolfsheim am Canal.

Polygonum latifolium T. sive *Polygonum aut Centinodia* IB. 3. 374. *flore apetalo stamineo rubro semine triangulari*, breit blätterich Weg-Gras, mit rothen Blümlein, Ic. 1. Tab. hist. 1214. *Renonce*

nonce ou Centinode, hin und wieder an denen Wegen, *perenn.*

Idem flore candido T. Blut-Gras, mit weißen Blumen, *ibid.*

Polygonum brevi angustoque folio T. five *Polygonum*, *Tab. hist.* 1214. Wegtritt, mit kurzen schmahlen Blättern, gegen Oßwald, neben den Ackeren, wie auch in der Ruprechtsau, *perenn.*

Polygonum oblongo angustifolio T. five *Polygonum angustifolium* *IB.* 3. 376. est *Polygonum* *III. Tab. hist.* 515. Wegtritt, mit langen schmahlen Blättern, auf den Feldern zu Oßwald, vor dem Fischer-Thor gegen der Citadelle *perenn.*

Polypodium vulgare T. five *Polypodium*, *IB.* 3. 746. *flosculis subluteis muscosis, dorso foliorum exeuntibus, foliis dissectis, radice repente*, Engel-Suess, Farn-Kraut, auf dem Wassenburgischen Gebürg, an denen Felsen, und auf denen alten Eichbäumen, *IC. Tab. hist.* 1188.

Polypodium minus T. kleine Wald Süesse-Farn, zu Oberbronn, auf dem Römischen Berg-Schloß Wassenburg, auf denen alten Mauern hinter Barr. *perenn.*

Polypodium angustifolium fol. vario T. five *Lonchitis altera folio polypodii*, *IB.* 3. 344. milde Hirsch-Zung, in dem Bärenthal, etliche Stund, von Buchsweyler, in dem Thal, gegen dem Ottilien-Brunnen, von Heiligenstein, *IC.* 2. *Tab. hist. pag.* 1190. *perenn.*

Porrum sylvestre 11. *Tab. hist. Ic. 872. flore liliaceo fructu subrotundo, semine subrotundo, Porreau sauvage, wilder Brißlauch, auf sumpfsichten Wiesen, beym Maurhof häufig. perenn.*

Porrum sectivum juncifolium T. sive *Porrum sectile* Matth. 873. *flore liliaceo purpureo, Schnittlauch, in Gärten und Gartners-Feldern, perenn.*

Portulaca latifolia sativa seu domestica T. *flosculis sublineis rosaceis fructu ovato, E 1B. 3. 678. Ic. 2. Tab. hist. 830. zahmer Burzel, Pourpier domestique, in Gärten und Gartners-Feldern. ann.*

Portulaca angustifolia seu sylvestris vel spontanea T. *Pourpier sauvage Ic. 1. Tab. hist. 396. wilder oder Acker-Burzel, auf sandigen Aeffern bey Oßwald, und in der Ruprechtsau. ann.*

Potamogeton pusillum, gramineo folio, caule rotundo Rap. Hist. *flore cruciformi viridescente* sive *Potamogeton pusillum gramineo folio breviori* Vaill. *Ic. 4. Tab. XXXII. gar Fleiner Wasserlock, mit runden Stengeln, in dem XV. Wört, in einem Gräblein häufig. perenn.*

Potamogeton ingens gramineo folio longiori fructu quadrigemino Vaill. *Tab. XXXII. fig. 5. Mittelmässig Wasserlock, mit langen Graß-Blättern, in der Ill bey Oßwald, gegen der Ubersahrt, est* *Peucedanum aquaticum* *Tab. hist. 187. nostratibus Flußlock, perenn.*

Ranunculus palustris folio angustiore plantaginis T. *flore simplici rosaceo albo fructu globoso, sive Plantago aquatica minor* *Tab. hist. pag.*

1114. Schmahl blättrichter Wasser-Wegerich, *Plantain d'eau à feuilles étroites*, in Gräben, neben denen Wiesen, in der Ruprechtsau, unten an dem Glacis, vor dem Mezer-Thor. *perenn.*

Ranunculus palustris plantaginis folio humilis & supinus T. sive *Plantago aquatica humilis angustifolia & longifolia* *Lob. Ic. 300.* kleiner niedriger Wasser-Wegerich, in Gräblein zwischen Oßwald, und Gravenstaden, unten an dem Glacis, in sumpfigten Orten, vor dem Mezer-Thor. *perenn.*

Ranunculus palustris plantaginis folio ampliore T. sive *Plantago aquatica* *IB. 3. 787.* est *Plantago palustris sive aquatica* *Tab. hist. Ic. 1111.* großer Wasser-Wegerich, mit breiten Blättern, *Plantain d'eau, à feuilles larges. perenn.*

Ros solis folio subrotundo T. *flore rosaceo fructu ovato*, sive *Ros solis foliis circinnatæ rotunditatis*, *IB. 3. 761.* est *Ros solis major* *Lob. Ic. 811.* *flore monopetalo rosaceo albe, radice pilosa seu Rorella* *Ic. 1. Tab. hist. 1202.* Sonnen-Thau, mit rundlichen Blättern, *Rosée du soleil.* auf dem Moos/ auf dem Hochfeld. *perenn.*

Ros solis foliis oblongis T. & *IB. 3. 761. Ic. Tab. hist. 1202.* Sonnen-Thau, mit länglichten Bieren-Laub ähnlichen Blättern, in dem Hagenauer Forst, und Hördter Wald *perenn.*

Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis T. *flore rosaceo, fructu ovato*, sive *Lysimachia purpurea spicata*, *IB. 2. 902.* brauner Weidrich, auf feuchten Wiesen, und an denen Wasser-Beständen, *Salicaire* *Ic. Tab. hist. 1236. perenn.* Sa-

Salicaria hyssopifolio latiore T. five *Hyssopifolia aquatica*, *IB. 3. 792. floribus rosaceis cærulescentibus*, auf feuchten Wiesen bey Ehrstein.

Salicaria hyssopifolio angustiore T. *minus ramosa* in dem Ried, zwischen der Zu, und dem Rhein bey Marckelsheim, wie auch in feuchten Orten, in dem Ruprechtsauer Wald. *perenn.*

Sedum majus vulgare T. & *IB. 3. 687. seu Barba Jovis, flore rosaceo stellato umbellato, fructu multicapsulari, la Grande Joubarbe, grose Haußwurz, 1c. Tab. hist. pag. 1224. & HEyst. auf denen Stroh-Dächern der Bauren perenn.*

Sium latifolium T. five *Sium maximum latifolium* *IB. 2. 175. est Pastinaca palustris Tab. hist. 2. 202. seu Sium Rivin. grose Wasser-Pastinacke, Berle in denen Stadtgräben, außerhalb der Stadt. perenn.*

Sium aquaticum virulentum, foliis multifidis longis & ferratis, floribus subluteis rosaceis, caule excavato striato & geniculato, succum luteum fundente, fructu subrotundo radice crassa fibrosa acris, quod Cicuta est Wepferi vel Sium aquaticum majus angustifolium Tab. hist. 1c. 4. 203. vel Cicutaria Rivin. giftiger Wasser-Schirling, perenn.

Sium umbellatum repens Ger. *emacul. vel Sium aquaticum ad alas floridum Moris umb. 63. radice repente* Klein Friechender Wasser-Eppich, bey dem Wasser, auf dem Schießrein, bey der Bruck, gegen der Tabac-Mühl, auf einer feuchten Wiese, vor dem weissen Thurn, gegen dem Fort. *perenn.*

Sisym-

Sisymbrium annuum absinthii minoris folio T. five *Sophia Chirurgorum* I ob. Icon. 198. est *Seriphium Germanicum* IB. 2. 886. Weiß Saamen, Besen-Kraut, hin und wieder an denen Wegen, und alten Mauern. ann.

Solanum tuberosum esculentum T. *flore albo monopetalo rotato simplici fructu globoso seu Papa, american.* IB. 3. 614. quæ *Arachidna* Theophrast. Clus. hist. LXXIX. Kartoffeln oder Grund-Bieren, mit weißen Blumen, Ic. Tab. hist. pag. 869. auf denen Aeffern und Feldern. perenn.

Idem *flore purpureo*, Grund oder End-Bieren, mit rothen Blumen, ibid.

Utrumque quandoque fert flores plenos.

Solanum officinarum acinis nigricantibus T. five *Solanum hortense seu vulgare acinis nigris*, IB. 3. 608. Nacht-Schatten, mit schwarzen Beeren, an feuchten Orten und Winkeln, an schattichten Mauern, in der Stadt. *Morelle à fruit noir*, Ic. 1. Tab. hist. pag. 1993. ann.

Solanum officinarum acinis luteis T. five *Solanum hortense seu vulgare acinis luteis* IB. 608. *folio minori virenti*, Nacht-Schatten, mit gelben Beeren, *Morelle à fruit jaune*, an dem Brumbter und Hördter Wald häufig. ann.

Sonchus lævis laciniatus latifolius T. *flore semisflosculofo, semine papposo*, five *Sonchus, minus lacinosus, mitior five minus spinosus* IB. 2. 1014. glatter Hasen-Kohl, Gänse-Distel, mit breiten eingeschnittenen Blättern, Tab. hist. Ic. 4. 499. auf den Brach-Aeffern, und Kraut-Aeffern um die Stadt. perenn. Son-

Sonchus lævis minor paucioribus laciniis, T. kleiner Hasen-Kohl, mit glatten Blättern, *1c. Tab. hist. 3. 499. ibid. perenn.*

Sonchus lævis angustifolius T. glatter Hasen-Kohl, mit schmahlen Blättern, *1c. Tab. hist. 495. & Lob. 1c. 236. in denen Gräblein vor dem Spithal-Thor, gleich an der Brück. perenn.*

Stachys major germanica T. five Fuchsi *1B. 3. 319. flore albo monopetalo labiato, foliis tomentosis, semine subrotundo. riechender Andorn, 1c. Tab. hist. 1. 767. hin und wieder vor denen Thoren, vor dem Wald zu Zulkirch. perenn.*

Thalictrum majus non striatum T. Wiesen-Raute, mit glatten Stengeln, auf feuchten Wiesen, ben Ehrstein, *perenn.*

Thalictrum minus T. five Rutæ pratensis *genus minus semine striato 1B. 3. 487. zu Oberbronn, auf Berg-Wiesen, gegen Wasserburg, beim Quell-Bächlein. perenn.*

Thalictrum pratense angustissimo folio T. Wiesen-Raute, mit sehr schmahlen Blättern, *1c. Tab. hist. 121. in dem Zulkircher Wald häufig, auf der Lingelsheimer Nachtwende. perenn.*

Thymelæa linariæ folio vulgaris T. *flore monopetalo infundibuliformi* five *Passerina* Tragi, *1B. 3. 456. Späßen-Zung, 1c. Tab. hist. 2. 1212. auf denen Fleckern zu Zulkirch und Oßwald, ann.*

Thyselinum Plin. & *1B. 3. part. 2. 188. officinis Olsnitium* five *Apium sylvestre* Dodon. *lacteo, succo turgens, flosculis albis rosaceis, radice nigra, semine fructu striato, wilder Eppich, in sumppfichten*

pfichten Gruben, bey der Eisenschmidt, hinter Oberehenheim, zu Mafmünster. *perenn.*

Thysselinum palustre T. *lactescens acre, foliis ferulaceis flore, albo, semine lato* IB. 3. 188.

Scharfer Wasser-Eppich, *perenn.*

Tithymalus amygdaloides angustifolius Tab. hist. 6. 988. Wolfs-Milch, mit schmahlen Mandel-Blättern, in der Ruprechtsau, auf der Promenade *perenn.*

Tithymalus arvensis latifolius germanicus T. five *Tithymalus platyphyllos* Fuchs IB. 3. 670. breit Blättrichte Wolfs-Milch, auf denen Aeckern und in Gärten, *ann.*

Tithymalus five *Esula exigua* T. five *Esula exigua*. Trag. Lob. Ic. 378. five *Tithymalus minimus angustifolius annuus* IB. 3. 664. kleine Acker Wolfs-Milch, aller Orten. *ann.*

Verbascum Lychnitis, flore albo parvo T. *monopetalo rotato fructu ovato*, five *Verbascum flore albo parvo* IB. 3. app. 873. est *Verbascum Lychnitis* Matth. Lob. Ic. 562. kleine weisse Königs-Kerzen, oder Woll-Blumen, Ic. 2. Tab. hist. 957. *Bouillon blanc*, in der Ruprechtsau, in denen Hägen, auf trockenen Wiesen gegen Obwald.

Verbascum latifolium luteum Mas T. five *Verbascum vulgare flore luteo magno, rotato folio maximo* IB. 3. app. 871. Woll Kraut, Männlein, grose Königs-Kerzen, mit grosen gelben Blumen, Ic. Tab. hist. 256. & HEYST. in der Ruprechtsau, auf der Heyde zu Brumbt häufig. *perenn.*

Verba-

Verbascum Foemina flore luteo magno T. five *Verbascum maximum album foemina* flore sub pallido, *Lob. Ic.* 161. Woll-Kraut, Weiblein mit grossen gelben Blumen, *Ic.* 6. *Tab. hist.* 917. in dem Zülkircher Wald, am Wasser häufig *perenn.*

Verbascum pulverulentum, flore luteo parvo *IB.* 3. *app.* 872. kleine gelbe Woll-Blumen, est *Verbascum luteum* *Tab. hist.* 6. *pag.* 957. bey der Spital-Mühl am Weg / auf dem Metzger-Wall, auswendig gegen denen Gräben zu, häufig. *perenn.*

Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascence T. *Verbascum nigrum* flore parvo apicibus purpureis *IB.* 3. *app.* 872. est *Verbascum nigr.* HEyst. schwarz Woll-Kraut, mit gelben Blumen, und rothen Zäserlein, *Bouillon noir.* an dem Weg auf Gulk, auf Molsheim, in der Gegend wo der Hellebor. foetid. wächst oberhalb der Capell. *perenn.*

Verbena communis coeruleo flore T. *monopetalo labiato semine oblongo*, seu *Verbena vulgaris* *IB.* 3. 443. Eisen-Kraut, *Verveine* *Ic.* 1. *Tab. hist.* *pag.* 380. In Rivin. in der Ruprechtsau, und sonst hin und wieder an denen Wegen. *perenn.*

Veronica spicata angustifolia T. *flore monopetalo rotato* five *Veronica major, angustifolia caulibus viridibus* *IB.* 3. 284. est *Veronica erecta sylvestris* Rivin. aufrecht stehender Ehrenpreis, *Ic.* *Tab. hist.* 4. & 5. 773. in dem Gansbauer Wald, in feuchten grasichsten Orten. *perenn.*

Vero-

Veronica spicata longifolia T. five *Veronica spicata recta*, profunde ferrata IB. 3. 284. est *Veronica spicata* Rivin. *Ic. Tab. hist. 773.* Uebren Wendrich, mit blauen Blumen, und langen Blättern, in dem Zulfircher Wald, hinter dem Mauerhof, bey Schwald, auf feuchten Matten. *perenn.*

Virga aurea virginiana Zanon. five *Aster annuus Canadensis* flore albo papposo HRP. Canadensische Dürrwurk, fast aller Orten. *ann.*

Urtica urens maxima T. five *Urtica vulgaris major* IB. 3. 445. *flore albo apetalo, folio serrato, fructu bivalvi*, grose brennende Nessel, *Ic. Tab. hist. 2. 4. 921. perenn.*

Urtica urens minor T. five *Urtica minor annua* IB. 3. 446. kleine brennende oder Eiter-Nessel, *Petite Ortie Ic. 3. Tab. hist. 921.* an denen Wegen und Wänden, *ann.*

Urtica urens maxima caule rubente T. five *Urtica rubra* *Tab. hist. 4. 921.* grose brennende Nessel, mit rothen Stengeln, in schattichten Orten, bey Schwald und auf denen Glacis, der Stadt. *perenn.*

Xanthium T. five *Lappa minor* IB. 3. 572. *floribus flosculosis albis, foliis sinuatis, fructu semine oblongo*, kleine Kletten, Bettlers-Läuse, *Petit Gletteron, Ic. Matthiol. epitom. 926. perenn.*

MENSIS

AUGUSTUS ET SEPTEMBER.

Abrotanum campestre cauliculis rubentibus,
T. five *Abrotanum sylvestre* IB. 3- 194. *flosculis,*
R *lateis*

luteis flosculosis inodoris, foliis capillaceis, semine paposo, wilde Stab oder Schoßwurz, Aurogne sauvage Ic. Tab. hist. 3. 51. gegen Oswald, neben denen Aeftern. *perenn.*

Abrotanum campestre cauliculis albicantibus T. wilde Stabwurz, mit grünlichten Stengeln, vor dem weissen Thurn-Thor, auf der Gansau, *perenn.*

Abrotanum Mas angustifolium majus T. zahme Stock oder Schoßwurz, Gänsewurz, Kuttelkraut, Ic. 1. Tab. hist. 50. in Gärten, und Gartnersfeldern *perenn.*

Abfinthium ponticum tenuifolium incanum T. Römischer Wermuth, in Gärten *perenn.*

Aconitum coeruleum sive Napellus T. & IB. 3. 655. *flore polypetalo anomalo galeato, folio dissecto atrovirente, radice nigra fibrosa, semine angulari. Cappe de Moine, Tue Loup Wolfswurz, blaue Rappens-Blumen,* Ic. Tab. hist. 980. in Gärten, *perenn.*

Aconitum lycoctonum luteum T. sive *Aconitum folio Platani flore luteo pallescente* IB. 3. 652. Narren-Rappen, gelbe Eisen-Hütlein, *Aconit à fleur jaune* Ic. 4. Tab. hist. 982. *ibid.* *perenn.*

Agaricus digitatus niger apicibus albidis T. est Fungus æthiopico piperi similis Mor. hist. Ox. Part. 3. an abgefaulten Eichen-Holz, so lang in dem Schatten gelegen, unten an eichenen Diehlen, in denen schattichten Gärten, und an deren Ritzen und Spalten.

Artemisia vulgaris major, caule & floribus purpurascentibus T. *flosculis flosculosis* sive *Artemisia vulgaris* IB. 3. 184. est *Artemisia rubra* Tab. hist.

hist. 1. 27. Beyfuß oder rother Buch, *Armoise*, an denen Zäunen, bey denen Schwein-Ställen, vor dem Fischer-Thor, auf dem Glacis. *perenn.*

Artemisia vulgaris major caule ex viridi albicante T. weiser Beyfuß, est *Artemisia alba* Tab. hist. 1c. 2. 27. bey der Carthaus, vor dem Spithal-Thor. *perenn.*

Arundo vulgaris T. seu *palustris* IB. 2. 485. five *Canna sepiaria*, Tab. hist. 1c. 2. 572. folio oblongo, flore apetalo, radice fibrosa & oblique geniculata *Canne ou Roseau*, in denen Stadtgräben, vor den Thoren. *perenn.*

Aster montanus luteus, foliis oblongis T. floreradiato, semine papposo, gelb Bergstern Kraut, in dem Jllkircher Wald, im Dachsteiner Waldlein, auf Berg-Wiesen, bey hohen Andlau, *perenn.*

Aster palustris parvo flore globoso T. five *Conyzæ mediæ minor specie*, vix radiato IB. Eleine Dürrmurk, Sumpf Dürrmurk, *Conise de Marais* 1c. 2. Tab. hist. 1243. an denen Gräben, neben der Landstraß, vor dem Spithal-Thor, bey der grünen Wirt. *perenn.*

Aster pratensis autumnalis Conyzæ folio T. five *Conyza media Matthioli*, flore magno luteo, humidis, locis proveniens IB. 2. 1050. est *Conyza media* HEyst. gelbe Wasser Stern-Blumen, an denen Gräben und feuchten tieffen Orten aller wegen.

Caryophyllus flore tenuissime dissecto albo T. five *Caryophyllus plumarius albus*, Tab. hist.

Ic. 2. pag. 286. weisse wilde Feder-Megelein, auf der Wiese, in dem Granwört, und bey dem Mauerhof. *perenn.*

Coralloides albida T. sive *Fungus ramosus albidus* IB. 3. 837. est *Fung. escul* XIX. gen. *Clus. hist.* Gensen Bart, Händlein-Schwamm, in schattichten Waldungen.

Filago minor T. sive *Gnaphalium minimum* IB. 3. 159. est *repens* & *erectum folio brevi angustoque*, an feuchten Orten, zu Oßwald, und Engelsheim. *perenn.*

Fungus pileolo lato & rotundo T. sive *Fungus campestris albus superne inferne rubens* IB. 3. 824. est *Fungorum esculentor.* IX. gen. *Clus. hist.* CCLXVIII. Champignons. Pfifferling, in Wäldern und auf denen Vieh-Weyden, in dem Ruprechtsauer Wald.

Fungus juniperinus lævis & albicans atque exilis nobis, Wachholder Schwamm, in dem Gansauer Wald, und anderen Wachholder Stöcken.

Fungus pileolo lato puniceo, lacteum & dulcem succum Fundens. CBp. sive *Fungi punicei, lacte dulci manantes, pratenibus similes edules* IB. 3. 829. Brückling in dem Gansauer und Niedecker Wald.

Fungus pileolo lato, longissimo pediculo variegato T. seu *Fungi longissimo pediculo candicantes, sed maculati & esculenti* IB. 3. 826. Weißling, in dem Hagenauer Forst an trockenen Orten.

Fung-

Fungus planus orbicularis aureus CBp. five Fungi lutei magni, dicti laferan, speciosi IB. 3. 831. est XVII. gen. esculent. Fungor. Clus. hist. CCLXXII. Kayferling, Herren Pülz, oberhalb Peris, gegen der schwarzen See.

Fungus umbilicum referens variegatus CBp. est XIII. genus escul. Fungor. Clus. hist. CCLXIX. rothe Teuberling, hinter Barr, in denen Waldungen.

Fungus in metam fastigiatus albus, fusco tinctus CBp. five Fungi in metam fastigiati esculenti, coloris albicantis, fusco tincti IB. 3. 828. est III. Genus escul. Fungor. Clus. hist. CCLXV. in Waldungen, hinter Ottrott.

Fungus perniciosus, ex eodem pediculo multiplex T. five Fungi multi ex uno pede perniciosi IB. 3. 835. est XII. gen. pernicios. Fungor. 5. species Clus. hist. CCLXXXV. Stockschwämme, in dem Ruprechtsauer Wald und Hagenauer Forst.

Fungus auricularis miniatus Hofm. flore Altorf, Holz Schwamm, an abgehauenen faulenden Bäumen, in der Ruprechtsau.

Gentiana pratensis flore lanuginoso T. monopetalo campaniformi, fructu ovato five Gentiana Fugax. 11. Clus, hist. 315. hoher blauer Himmelstengel, mit tausend gulden Blättern, auf der Ringelsheimer Nachtweyd / und beym Polygon perenn.

Gentiana coerulea oris pilosis T. five Gentianella lanuginosa IB. 3. 525. blauer Himmel

Stengel, mit blauen an dem Rand besetzten haar-
richten Blumen, auf der Gansau, vor dem
Wald, auf dürren Wiesen, in dem Ostwinckel.
perenn.

*Glaux palustris flore albo striato clauso foliis
portulacæ* T. Ic. 1. Vaill. Tab. XV. fig. 5. vor
dem weissen Thurn, auf dem Sandbänckel, wo
die Breusch in die Ill fällt. *perenn.*

*Gramen dactylon angustifolium spicis villo-
sis* T. five *Gramen digitatum hirsutum* IB. 2.
445. five *Ischæmum* 11. Tab. hist. pag. 543.
Blut-Gras / auf einer dürren Wiese, am Rhein-
Ziegel-Ofen, auf der Landstraß nach Blobsheim.
perenn.

Gramen dactylon, radice repente five *Offici-
nar* T. five *Gramen repens, cum panicula Gra-
minis Mannæ*, Kriechend Acker-Gras, aller Or-
ten in Gärten, auf denen Aeffern, in der Ku-
prechtsau. *perenn.*

Gramen dactylon folio latiore T. five *Gal-
li Crus* IB. 2. 444. *Gramen Ischæmum vel San-
guinarium* Tab. hist. pag. 534. Blut oder Schwar-
den-Gras, ohnweit der Sau-Bruck / am Be-
cken Wäldlein, neben den Gärten, bey Schiltig-
heim, neben denen Aeffern. *perenn.*

*Gramen spicatum spica cylindracea tenuiori,
longa* T. five *Gramen cum cauda muris minus* IB.
2. 471. est *Gramen typhinum* 1. Tab. hist. pag.
531. Riesch-Gras, auf trockenen Wiesen, auf
der Gansau, und in der Kuprechtsau. *perenn.*

Gramen

Gramen spicatum spica cylindracea glabra foliis hirsutis T. five *Gramen cum cauda muris foliis hirsutis* *IB.* 2. 471. est *Gramen Alopecuroides minus* *Lob.* 1c. 9. in denen Neben bey *Mittelbergheim.* *perenn.*

Gramen spicatum spica cylindracea brevi nodosa T. five *Gramen nodosum spica parva tertium* *CBp.* prodr. 2. 3. bey der Insulförmigen *Matt*, an dem Canal, gegen des *Schliesenmeisters* Haus, auf der *Heyde*, bey der *Eckbolsheimer* Ziegel-Hütte, *perenn.*

Gramen spicatum, spica cylindracea tenuissima brevior T. *rufescente* five *Gramen alopecurinum* *II.* *Tab. hist.* 20. pag. 520. auf denen *Aletern*, vor dem *Steinstrasser* Thor, auf dem *Schießrein*, unterhalb der *Lohmühl*, fast an der *Brücke*, *perenn.*

Gramen paniculatum autumnale, panicula angustiore ex viridi nigricante T. *Wald-Rohr*, neben dem Canal, in feuchten Gruben. *perenn.*

Gramen vulgare minus, panicula rigida T. five *Gramen minus duriusculum* *Tab. hist.* 18. pag. 520. klein hart *Gras*, auf dem *Wall*, zwischen dem *Juden* und *Steinstrasser* Thor, vor dem *Spital-Thor*, wo die *Seiler* arbeiten. *perenn.*

Hieracium fruticosum angustifolium majus T. *flore semiflosculoso, semine papposo* five *Hieracium fruticosum rectum & rigidum* *IB.* 2. 1030. *Berg Habicht-Kraut*, zu *Mittelhaufbergheim*,

in dem Ostwinckel, auf der Heyde, bey dem Eß-
holsheimer Ziegel-Ofen. *perenn.*

Hieracium fruticosum minus T. *caule rubro.*
Flein Berg Habich-Kraut, zwischen dem
Steinstraser und weissen Thurn-Thor häufig.
perenn.

Hieracium montanum glabrum latifolium ma-
jus T. five *Hieracium montanum, majus latifo-*
lium IB. 3. 1032. Ic. Tab. hist. 13. 494. groß
Berg Habich-Kraut, mit breiten Blättern, auf
dem Ottilien Berg. *perenn.*

Hieracium montanum, latifolium glabrum
minus T. five *Hieracium latifol. glabrum ex*
Valle Griesbachianum IB. 2. 1033. est *Hieracium*
montanum latifolium minus Tab. hist. Ic. 14.
495. Klein Berg Habich-Kraut, mit breiten Blä-
tern, auf dem Gebürg hinter Barr, an
feuchten grasichten Orten, hinter Nappolsweyler.
perenn.

Hydrocotyle vulgaris T. five *Cotyledon a-*
quatica IB. 3. 718. ♂ *septentrional.* Lob. Ic. 387.
foliis umbilicatis flore rosaceo albo radice repente, Nom-
bril de Venus, Sumpf Nabel-Kraut, auf der Wie-
se, rechter Hand bey dem Mauerhof, am Wasser-
graben, *copiose vid. Tab. nostr. XII. perenn.*

Juncus palustris humilior T. five *Gramen*
junceum bufoninum Tab. hist. Ic. 6. 536. *repens ca-*
liculis paleaceis, Krotten-Gras, auf allen feuchten
und sumpfigen Orten. *Crapandine perenn.*

Limosella annua, flore albo monopetalo in-
fundi-

p. 266.

Hydrocotyle. J.



Tab. XII.



J. Strickbeck. Sculp.

fundibuliformi stellato, fructu ovato unicap-
sulari, semine foeto exiguo oblongo, foliis ob-
longis planis, longis pediculis infidenti-
bus, radícula fibrosa albicante repente. nob.
five *Alfine palustris repens*, foliis lanceolatis,
flosculis albis perexiguís Pluck. *weise Sumpf*
Stern-Blümlein, in der Ruprechtsau, in
feuchten Pfützen häufig. vid. Tournef. *Alf. Tab.*
v. 156.

Lupulus Mas T. & IB. 2. 151. *floribus apeta-
lis herbaceis fructu squamoso*, *Hopfen* *Houblon mâle*
lc. Tab. hist. 1293. in Gärten und Feldern,
perenn.

Lupulus fæmina T. & IB. 2. 151. five *Sterilis*
wilder Hopfen, *Houblon femelle*, *wilder Hopfen*,
aller Orten, in denen Hecken und Bäumen.
perenn.

Lycoperdon vulgare T. five *Fungus pulve-
rulentus*, *Crepitus Lupi dictus* IB. 3. 848. *Vesse*
de Loupe, *Bovist*, auf feuchten Wiesen zu Ob-
wald, und in den Gansauer Wald.

Lycoperdon minus multiplex spurium T.
unten an denen Wurzeln, alter Bäumen/ auf der
Lingelsheimer Nachtwend.

Lycoperdon vesicarium stellatum T. blasen-
förmiger Stern-Schwamm, am Weg nach dem
Hochfelder Gebürg, hinter Barr.

Majorana vulgaris T. *folio majore, flore albo mo-
nopetalo labiato*, *Majoran* *Mariolaine* *lc. I. Tab. hist.*
718. *ann.*

Majorana tenuifolia T. five *Majorana tenuior* & *lignosior* *IB.* 3. *part.* 2. 241. *nostrat.* *Majorana nobilis*, *Edler Winter Majoran.* *perenn.*

Milium semine luteo T. *folio gramineo flore, apetal.*, *semine subrotundo, seu Milium* *IB.* 2. 446. *Hirse rother oder gelber Hirse*, *Millet jaune* *lc.* 1. *Tab. hist.* 656. auf denen Aeftern, *ann.*

Milium semine albo T. *weiser Hirse*, *ibid.* *Milium semine nigro* T. *Schwarzer Hirse*, *IB.* 2. 446. *est Milium nigrum* *Tab. hist.* *pag.* 656. *lc.* 2. *ann.*

Orchis palmata angustifolia minor odoratissima *CBp.*

Panicum vulgare spica simplici & aspera T. *flore apetal.*, *fructu spicato*, *sive Gramen sylvestre dictum & Dens canis* *IB.* 2. 443. *est Gramen geniculatum*, *Tab. hist.* *lc.* 3. 516. *Knoten-Gras*, neben denen Aeftern, in der Ruprechtsan. *perenn.*

Panicum vulgare spica simplici & molliori T. *wilder Fench oder Hirse*, mit einfacher weicher Aehre, auf denen Aeftern zu Osward, und Eingsheim, bey dem Spithal Garten. *perenn.*

Panicum vulgare spica multiplici longis areftis circumvallata T. *sive Gramen Panicum* *II.* *Tab. hist.* 538. in Gräben, hin und wieder. *perenn.*

Panicum vulgare spica multiplici asperiuscula T. *sive Panicum sylvestre* *Tab. hist.* *lc.* 3. 660. *Pfen-nich-Gras*, mit rauhen Aehren, auf denen Krauts Fel-

Feldern , an denen Zäunen , in der Ruprechtsau.
perenn.

Pimpinella sanguisorba major T. *floribus monopetalis rotatis atro rubentibus, foliis pinnatis & serratis, fructu quadrangulari*, five *Sanguisorba major* flore spadiceo *IB. 3. part. 2. 120.* große Wiesen Pimpernell groß Sperber-Kraut, *Grande Pimpernelle*, *lc. 1. Tab. hist. 316.* perenn.

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta T. five *Sanguisorba minor*, *IB. 3. part. 2. 113.* kleine haarichte Pimpernell, *lc. Tab. hist. 316.* auf denen meisten Wiesen. perenn.

Pimpinella sanguisorba laevis minor T. glatte kleine Garten-Pimpernell, auch auf feuchten Wiesen bey Obwald. perenn.

Polium montanum repens T. *flore purpureo monopetalo labiato* five *Polemonium montanum supinum minimum* *Lob. lc. 488. & Tab. hist. 4. pag. 750.* Klein Berg-Boley, *Polium de Montaigne*, zu Barr auf denen Matten, und zu Heiligenstein perenn.

Pyxidaria repens annua, *flosculis monopetalis anomalis unilabiatis, ex albo purpurascens, longis pediculis infidentibus, facile deciduis, foliis anagallidi similibus, capsula oblonga, seminibus minutissimis referta.* *lc. vid. Tournef. alsat. pag. 156.* Est *Montia aquatica minor* Michel. nov. plant. gen. pag. 18. Tab. 13. Fig. 2. & Mappi. Sed errat dum *Montia* calice gaudet bifido, in nostra autem planta in 5. segmenta divisa est; nominarem itaque

que potius instituto exactiori examine, Alsinoïdes paludosa, foliis anagallidi similibus, flosculis monopetalis rubescentibus, capsula oblonga, Sumpf Gauchheil auf der Insel, wo die Breusch in die Ill fällt: ann.

Tanacetum vulgare luteum T. & IB. 3. 131. floribus flosculosis semine papposo, gelbe Rhein-Farn, Wurm-Kraut, Ic. Tab. hist. 6. pag. 28. hin und wieder an denen Landstrassen. perenn.

Thalictrum majus non striatum T. sive Ruta pratensis major 11. Tab. hist. 120. Rue de prez, Wiesen-Kraut, mit schmahlen Blättern, in dem Zulfircher Wald, und andern durren grasichten Orten, bey Ehrstein. perenn.

MENSIS

SEPTEMBER ET OCTOBER.

Colchicum commune T. sive Colchicum IB. 2. 649. seu Autumnale, flore purpurascete monopetalo liliaceo, radice nigra tuberosa fructo oblongo trigono Herbst-Blumen, Rüh-Dutten, nostr. faule Stuten, nackende Huren, Colbique ou Mort de chien, Ic. Tab. hist. 8. & 9. 1011. auf allen feuchten Wiesen. perenn.

Colchicum album cum purpurascetibus lineis IB. 2. 651. ganz weisse Herbst-Blumen mit rothen Strissen, auf der Lingsheimer Nachtwend, auf der Wiese bey Niederhaufbergen. perenn.

Colchicum montanum angustifolium T. sive Colchicum montanum flore purpureo IB. 2.

656. Berg Herbst-Blumen, mit schmahlen Blättern, auf den Berg-Wiesen hinter Barr.

Coralloides corniculis candidissimis T. five *Musculus corallinus montanus* *Tab. hist. pag. 1198.* wilde Corallen-Moos, auf dem St. Ottilien Berg an denen Felsen.

Coralloides apicibus coccineis Mapp. *hist. al. 81.* Corallen-Moos, mit hochrothen Gipfeln, hin und wieder in Wäldern, auf faulen Bäumen, so zu Boden liegen.

Fungus muscas interficiens T. *pileolo verrucoso rotundolato, lamellis albis pediculo bulboso,* Mücken-Schwämme, five *Fungus XII. genus* Clus *hist. CCLXXIX.* in dem Ruprechtsauer Wald, in dem XV. Wört.

Fungus corylæus orbicularis T. five *Fungi sub corylis orbiculatæ figuræ* *IB. 3. 842. est VI. genus Fung. noxior. Clus. hist. CCLXXVIII.* runder Haselstauden-Schwamm, in dem Ostwinckel, in dem Gansbauer Wald.

Fungus Erynus Bot. Monsp. Manns-Treu-Schwamm, auf der Heyde, gegen dem Eckbolsheimer Ziegel-Ofen, auf Wiesen, bey der hohen Wart.

Fungus latus orbicularis candidus CBp. five *Fungus ranarum albi perniciosi* *IB. 3. 846. XIII. Genus perniciosior. Fung. Clus. hist. CCLXXX.* auf denen Aeffern bey Mägenheim.

Fungus orbicularis in palustribus CBp. five *Fungi rubri perelegantis coloris & rufi* *IB. 3. 846, est Fungor. nox. gen. XXIII. Clus. hist. CCLXXVI.*

CCLXXVI. auf feuchten Wiesen bey Ehrstein.

Fungus orbicularis secundum vias & in Quercetis autumnno nascens CBp. est XIX. gen. Fungor. perniciosior. CCLXXXIII. in schattichten hohen Gebürgen.

Lichen pyxidatus major T. five Muscus pyxidatus IB. 3. 767. grose Kelch-Schwämme auf dem Ottilien Berg, auf abgefauten in schattichten und feuchten Orten liegenden Bäumen.

Lichen pyxidatus minor T. five Muscus pyxoides saxatilis IB. 3. 767. Kleiner Kelch-Moos, auf den Felsen St. Ottilien Gebürge.

Orchis spiralis alba odorata T. five Orchis spiralis minor Lob. Ic. 186. Klein gewunden wohlriechend Stendel-Wurzel, auf der Schlut, bey dem Eckbolsheimer Ziegel-Ofen. häufig.

MENSIS

OCTOBER ET NOVEMBER.

Agaricus digitatus niger T. five Fungus digitatus nigricans ligno ad nascens, Michel. nov plant. gen. pag. 103. ubi Icon. an alten Eichen Pfählen und Dielen, der Wände.

Agaricus esculentus T. five Fungus maximus laciniatus quod XXI. gen. Fung. ascul. Clus. hist. CCLXXV. Eich-Schwamm, Eich-Henne, in allen Waldung unten an alten Eichenbäumen.

Agari-

Agaricus Tuba Fallopianæ instar laciniatus T. an denen alten und faulen Tannen und Foren Bäumen, die zu Boden liegen, in dem Brumber Wald.

Coralloides Cornucervi referens, corniculis brevioribus T. gehörntes Corallen-Moos, in denen feuchten Waldungen, an faulen Bäumen.

Coralloides abietina nivea procerior T. seu Fungus ramosus argenteus ramosus B. 838.

Coralloides corniculis rufescentibus T. five Muscus terrastris coralloides erectus corniculis rufescentibus CBp. röthlichtes Corallen-Moos, in denen Rissen und Spaltungen, der Steinen, in dem Barter Wald, an den Weg, nach dem Hochfeld, ingleichen hinter Ottrott, bey der Segmühl, in steinigten Orten.

MENSIS

NOVEMBER ET DECEMBER.

In his Mensibus, ob acerbum ut plurimum frigoris accessum, Telluris spiracula occludentem, nulla in Alsatia amplius fit plantarum productio, sed quietè omnes sub terra usque ad futurum & novum progerminationis tempus delitescunt, exceptis aliquibus Fungis atque Muscis, quos vero omnes exactissime descripserunt & ad vivum orbi literato, satis superque Iconibus elegantissimis, delineaverunt Viri in re botanica perquam Celeberrimi, Clusius, Dillenius, Vaillantius, & pro tempore in-

ingeniosissimus atque Studiosissimus Dn. Dr. & Profess. Hallerus, Patronus & Amicus meus omni honoris cultu prosequendus. Et sic Horti Alfatici Ianua claudatur, his igitur acquiesce candide ac benevole Lector, atque serena fronte, hunc meum in posteritatis commodum unice inclinantem Laborem aspice. Deo interim Ter Maximo summo Botanicæ & Soli omnium rerum Creatori, cui omnia debemus, pro viribus concessis, humillima mente sit Laus Honor & Gloria in seculorum Secula.



APPEN-

APPENDIX.

Plerorumque Vocabulorum botanicorum, in hoc opusculo contentorum
Derivationes illustrans.

I.

ABies, hujus vocabuli derivatio, Europæis ignota.

Abrotanum, dictum ab ἀβρός mollis & τείνω tendo, quia folia ejus mollia & extensa sunt.

Absinthium, nuncupatur, à vocabulo græco ἀνιδος delectatio & particula privativa ἀ, ac si diceres, planta, quæ nullum præbet delectamentum, seu quæ minime grata est.

Acacia, appellationem habet, ab ἀκάζο acuo, quia tota planta spinosa est.

Acanthus, vocis hujus origo, à græco vocabulo ἀκανθος, quod spinam significat, quasi mollis spina.

Aceris denominatio, obscura est, putant quidam nomen suum accepisse ab ejus duritie, quia ad multa opera percommodum, ejus lignum, quæ torno fiunt.

Acetosa, ejus nomen fluxit, ab Aceto, sapore enim gaudet acido.

Aconitum, dictum ab ἀκονὴς Vertice montium quod in nudis cautibus, quas aconas vocant nascatur.

Acorus, nomen suum accepit, a Vocabulo Acor, addita terminatione us, unde Acorus ab ejus acri sapore.

Agrimonia dicta ab Argemone.

Alcea, appellatur ab ἀλκή auxilio vel remedio, dum Radices dysentericis & ruptis, glutinando auxiliantur.

Alchimilla, nomen sumpsisse putatur ab Alchimistis, cum ad Alchimiam quam maxime utilis est, & ab illis laudatur.

Allium, denominationem hanc quidam ab alendo, alii ab halando factam fuisse existimant, graveolentem enim de se spirat odorem.

Alkekengi, ab arabico vocabulo prodire solet, Alchechengi, alii putant ab ἄλς Mare & κάκιστος vas, quia putamen hujus fructus vas maris refert.

Alnus dicitur mente quorundam, ab Amne, quia in flumine alatur.

Alfine vocatur, ab ἄλσος Nemus, quia in nemoribus & locis umbrosis crescere solet.

Althæa, hoc nomine insignitur ab ἀλθαίω vel ἀλθαίνειν mederi, præstat enim in medendo excellentem virtutem.

Alyssum, vocari existimant ex ἀ privativa & λύσσα Rabies, quia Rabiem seu Furorem caninum tollere putatur.

Am-

Ammi, hoc vocabulum dependet ab ἄμμος.
 Arena, quia semen ejus per similis est Arenæ.
 Amygdalus à græcis ἀμυγδαλή, ubi á latinis γ.
 mutatur in us, unde Amygdalus.

Anacampteros, nomen traxit suum, ab ἀνα-
 κάμπτω excito & ἐρὸς amor, ob virtutem
 amorem excitandi.

Anagallis, vocis origo necdum nota, forsan
 á græca denominatione ἀναγallis.

Anemone, derivatur, ab ἀνέμω Vento dum
 flante vento, flos ejus explicatur.

Anethum dicitur ab ἄνηθος, genus herbæ bo-
 ni odoris, aut ut alii volunt παρὰ τὸ ἀνωδέειν
 currere, quia hæc planta citissime crescat.

Angelica refertur, nomen suum acquisivisse,
 ab angelicas suas quas præstat virtutes.

Anisum ab ἀνισον vel ἄνησον.

Anonis, á græco vocabulo ἀνωνίς deducitur, &
 non juvando, quod inutilis sit Aratoribus.

Antirrhinum, nomine insignitur ex ἀντί & ρίς,
 ῥινὸς quod vituli nares assimilet.

Aparine, á vocabulo ἀπαρίνη, quod femine or-
 bata videatur aut quod aspera sit.

Aphaca, refertur ἀφάκη Lente, quia pertinet ad
 genus leguminis.

Apium, dictum ab Apibus, quæ floribus ejus
 delectari solent.

Aquilëgia, nomen duxit, ab Aquila, á florum
 nempe mucronibus aduncis, instar aquila-
 rum unguium.

Aquifolium, ab ἀκίς Acies & folium ob folia
 acuminata.

Aristolochia nuncupatur, ab ἀρίστος optimus & λοχία Lochia, planta nempe Mulierum lochia promovens.

Artemisia, dicta ab Artemide seu Diana, quia ad Vitia foeminarum utilis.

Arum, nomen suum, à græcis retinet ἄρον.

Arundo, putatur derivari ab Undis, quia lubentissime in aquis fluctuantibus crescit.

Afarum, Vocem hanc agnoscit ex ἀ particula privativa & αἶψα orno, quoniam in coronis non addatur.

Asclepias, herba ab Inventore denominata, Asclepio medico.

Asparagus à græco vocabulo ἀσπαράγος herbam significans furculosam.

Asplenium, ab Asplenon Herba Lieni conducibilis.

Aster ab ἀστήρ stella, quia flores ejus stellæ in modum explicantur.

Astragalus, titulum suum habet, à feminis forma, Talum seu Astragalum referente.

Astrantia, nuncupatur ab ἀστήρ stella quia plantæ hujus summitas Asterem refert.

Atriplex, unde nomen, hodie ad huc ignotum.

B.

Balsamina, vocis origo dependet à Balsamo, quia ad balsama conficienda adhibetur.

Barba capræ, vocatur à florum congerie seu similitudine, quæ caprinam barbam referre videtur.

Belladonna, est vox arabica, à formæ elegantia, pul-

pulchram domicellam significat. & à Vene-
no sic dicitur tota enim venenosa est.

Berberis, nominatur à Vocabulo Arabico sic
dicto.

Betonica, à Vetonica vocabulo romano.

Betula à Betulla, eo quod Bitumine, seu bi-
tuminosa pinguedine abundet.

Bidens, à bis & dente, quia semen ejus biden-
tatum est.

Bistorta, nuncupatur à radice, quæ bis con-
torta est.

Blattaria, Blatta, quia hæc planta animalia seu
Vermiculos, qui libros corrodunt, necat.

Blitum, audit à βλίτε, quod vile est & nullius
pretii.

Boletus, à græco vocabulo βολίτης, quod Fun-
gi genus denotat.

Borrago, à voce corrupta Corago, quod Cor,
Mentemque exhilaret.

Brunella videtur dici, à vocabulo germanico,
die Bräune, quod conveniat in febre arden-
te, quando Lingua & Fauces prunæ instar
ardent.

Brassica, contendunt quidam nomen accepisse,
à præsecando, quia ejus scapo minutatim
præsecatur, alii vero autumant derivatio-
nem habere ἀπὸ τοῦ πρᾶττειν à vorando.

Bryonia, à verbo βρύω germino, quod abun-
de germinare seu pullulare solet.

Buglossum, à græcis vocabulis βῆς Bos & γλῶσ-
σα Lingua, quia folia linguam bovis repræ-
sentant.

Bugula, derivant quidam hanc vocem, á gallico nomine Bugle.

Buphthalmum, nomen accepit, á βῆσ Bos & ὀφθαλμὸς Oculus, quasi Bovis oculus.

Bupleurum, vocabulum hoc compositum est, ex βῆσ Bos & πλευρὸν costa, ac si dicas Bovis costa, Boves enim ea planta comesta rumpi Veteres existimarunt.

Bursa pastoris, sic dicitur, quia capsulae feminales, Bursam pastoris exacte repræsentant.

Butomus, vocis origo desumpta est, á βῆ á particula augente, & τέμνω seco, quia valide á Bobus expetitur vel quod folia ejus valde scindant.

C.

Cacalia, hujus plantæ Etymon nobis ignotum.

Calamintha, á καλὸς pulcher, & μίνθη Mentha dicta, quasi pulchra Mentha.

Caltha, á græco vocabulo, κάλθη Herba nascens in segetibus seu mente Boerhav. quod Caltha diminutivum sit á Calendula, quia primo Mensis die, qui dicebantur Calendæ florescebat.

Campanula, á Campana, quia flores ejus campaniformes sunt.

Cannabis, á κάννα Fistula, quia caulis intus fistulosus est.

Caprifolium, á Capra & Folio, quia capri foliis delectentur.

Cardamine, nominatur á καρ cor et δομάω domo,

- mo , quasi planta cordis vires restaurans.
 Carduus ab ave carduelis dictus, dum semina
 ab ipsis lubentissime vescuntur.
 Casida , á militaris galeæ iconem exprimente,
 quam latini Cassidam appellitavere.
 Castanea , vocatur á Castaneo Magnesiæ urbe,
 ubi olim magna in copia crescebat.
 Caucalis, vox antiqua, hætenus obscura.
 Centaurium, á græco vocabulo κενταύριον a Chi-
 rone Centauro Medico Thessaliæ sic dicto.
 Cerasus , á Cerasunte, Ponti civitate.
 Chamæcerasus, á vocibus χαμαὶ brevis & κέρα-
 σος Cerasus, humilis Cerasus.
 Chamæmelum, á χαμαὶ humi & μέλον, pomum
 humile vinosum odorem de se spirans.
 Chamæpithys á χαμαὶ humilis & πῖλος Pinus,
 quasi humilis pinus.
 Chærophyllum á verbo χαῖω gaudeo & φύλλον
 folium, quasi planta foliis gaudens.
 Chelidonium, nuncupatur, á græco vocabu-
 lo χελιδὼν Hirundo, quia ab hirundine mon-
 stratum fuit, ut herba visui saluberrima.
 Chenopodium á χὺν Anser & πῆς Pes, quod
 folia effigiem habent pedem anserini.
 Christophoriana, á Sanct. Christophoro, quasi
 planta Christophoriani.
 Chrysanthemum, á κρύσος Aurum, & ἄνθεμον,
 flos quasi aureus.
 Cichoreum, á κιχείω, invenio, quia undique
 provenit.

Cicuta dicitur, quod internodia habet cava & fistulosa.

Cicutaria, quasi planta, Cicutæ affinis.

Cirsium apellatur á κίρσος Varix, quia ad Varices tollendas usurpatur.

Cistus, á græca voce κίσος Hedera vel á Cista, quia vasculum feminale in cista quasi hæret.

Clinopodium, existimamus nomen sumpsisse á κλίνη Lectus & πῆς pes.

Cnicus, á κνίζω hinc κνίκος, planta pungens, quia spinulis gaudet acutis.

Cochlearia ita dicta, quod folia ejus cochlearis instar sint excavata.

Colutea à græco vocabul κολυτέα.

Convolvulus, á convolvendo, quia plantas vicinas lubenter amplectit.

Coralloides planta referens corallia.

Cotyledon nominatur á κοτύλη cavitate, quia folia ejus excavata sunt.

Cornus, dicitur ob corneam duritiem.

Coronilla vocabulum hispanicum, Coronam minorem denotans.

Cratægus, forte á græca voce. κραταιός fortis seu robustus derivatur, nam κράτος Robur audit.

Cruciata, quia flores & folia in formam crucis sunt disposita.

Cucubalus á κῦ ubique & βάλλω imitto, quia ubique radices immittit suas repentes.

Cucumis nomen est á Curvore unde Cucumeres quasi Curvimeres.

Cu-

Cucurbita, dicta ab incurvatu, quia planta, nisi sustinetur, semper incurvetur.

Cuscuta, Vocabulum est syriacum, Herbam absque radice significans.

Cyanus, nomen suum traxit, á floris cyaneo colore.

Cydonia, á Cydone Cretæ oppido.

Cynoglossum, á vocibus græcis, κυνὸς & γλῶσσα canis & Lingua, folia enim canis linguae similia sunt.

Cyperoides vocatur, quasi planta ad cyperum accedens.

Cyperus, titulum suum habet, á græca voce, κύπερος, Vasculum ob radice effigiem.

Cytifus, ab Insula Cytilo, ubi hæc planta uberime crescit, vel á græco vocabulo κύτισον, Fruticis genus, quod ovium pabulum est, ut in iis lac augeatur.

D.

Daucus, suam denominationem agnoscit á græco vocabulo δαύκη quod pastinacam significat, vel á δαίω uro, & δαῦκος quia calidæ est naturæ.

Delphinium, á Delphino dictum, quia flos ejus nondum apertus, Delphinum repræsentat.

Dens Leonis, ob foliorum figuram, maxillam dentibus leonis instructam referentem sic appellatus.

Dentaria, á radicum forma dentibus quasi repletam.

Digitalis á floris similitudine cum Digitali, quo mulieres inter suendum digitos munire solent.

Dipsacus á græcis vocabulis *δίψα* sitis & *ἀκός*, medela ut remedium contra sitim.

E.

Echium fundit suam nomenclaturam, à voce græco *ἐχίς* Vipera, propter seminis formam.

Elatine καὶ ἐνλίφρασις dicta videtur quod minime procera sit.

Emerus, nomen fictum est, á Theophrasto.

Elychrysum currit ἀπὸ τοῦ χρυσοῦ ab auro & τῆς ἡλίου

Sole, quia aureum folis instar habet florem.

Equisetum progreditur ab equo & seta, quia folia & rami Equisetum referunt.

Erica, nomen deductum á verbo *ἐρέμω* frango quia ad calculum frangendum sæpissime adhibetur.

Erucago ab *Eruca*, quasi herba ad *Erucam* accedens.

Ervum, vocatur ab, *ἐρέπτω* edo, quia ab hominibus & brutis vesci solet.

Eryngium, á græca voce *Ἐρίγγιον*, id est Barbæ capra, quia hujus plantæ summitates, antequam caulis & folia prorumpunt barbam capræ referunt, alii vero putant, nomen suum sumpsisse ob *ερύγην*, eructatum quod capræ, ob hujus plantæ esum, ingesta vomitu exferere solent.

Erysimum dictum, ab *ἐρύω*, salvum conservo, ob eximiam in medendo facultatem.

Euo-

Euonymus, nominatur, ab *ἐν* bonum & *ὄνομα* nomen, quasi planta boni nominis.

Euphrasia, ab Euphragia vel á græco verbo *εὐφροσύνη* quod animi lætitiā adfert & oculorum caliginem tollit.

F.

Fagopyrum, nomen habet á *φάγω* edo, & *πυρὸς* frumentum, ac si diceres Frumentum edule.

Fagus, ἀπὸ *ἰεὶ φάγειν*, á comedere, antiquis enim ejus fructus erat nutrimentum.

Filago dicitur á Filo, quia filis abundat.

Filicula, á Filice, parvam filicem denotans.

Filipendula, á pendeo & filo, quod radices ejus, quasi ex filo pendere videntur.

Filix, vocabuli hujus derivatio adhuc ignota.

Fœnum græcum, á Fœno & adjectivo græcus, quia in Græcia pecora eo faginantur.

Fragaria, á fragrantia odoris quem spirat, fructus.

Frangula, á frangendo, quod facile frangatur.

Fraxinella, á Fraxino quasi parvus fraxinus.

Fraxinus quod magis in asperis locis, montanisque fragis nascatur, hinc per derivationem Fraxinus.

Fucus, á græca denominatione *φῦκος* Fumaria, quia lubentissime in agris fimo pinguibus crescat.

Fungus, á Funere, quod vescentibus periculolissima sit esca.

G.

G.

Galeopsis, hoc nomen plantæ impositum est, á γαλή Felis, quod ejus flores faciem felis repræsentant.

Gallium á γάλα Lac, quia vim possidet Lac coagulandi.

Genista ita dicta, á Genu, quod valde flexilis sit.

Genistella, á Genista, ac si dicas parva Genista.

Gentiana, á Gentio, Illyricorum Rege, primo Virtutum inventore.

Geranium, ἀπὸ τῆς γεράνης á Ciconia, quia capsulæ seminales, rostro ciconiæ conferunt.

Gladiolus, nomen habet á Gladio, quia folia ejus gladii figuram habent.

Glaux, á glauco colore.

Globularia á vocabulo latino, Globus, dum flos globosus est.

Gramen nuncupatur á gradiendo seu progrediendo, quod geniculatis internodiis mirifice serpit novasque spargit radices.

Grossularia, dicitur á cute fructus grossa vel densa.

H.

Hedera, dici putatur, quod arboribus repando ad hæreat.

Helleborus, παρὰ τὸ ἐλεῖν τὴν βάραν, quod esu perimat.

Helleborine, nomen accepit, ab Helleboro, á foliis nempe Helleboro similibus.

Heli-

Helianthemum, nuncupatur quasi ἥλιος, τὸ ἥλιος, Flos solis, quia semper versus solem se flectere solet.

Heliotropium, dictum ab ἥλιος sol, & τρέπω verto, quia hujus plantæ summitas, soli obvertit.

Herba Paris, Vocis hujus derivatio nobis non constat,

Herniaria vocatur, ob Facultatem hernias curandi.

Hesperis vocem suam habet, ab Hesperide noctu olente.

Hieracium, ἀπὸ τοῦ ἱέρακος, Accipiter, quia ab eo, ad acuendum visum devoratur.

Horminum, ejus nomenclatura ab ὄρμαινον, impetu ferox, quod venerem stimulet.

Hyoscyamus, a græcis vocibus, ὕσος fus, & κύαμος faba.

Hydrocotyle, ab ὕδωρ Aqua, & κοιλύλη Cavitas, folia enim hujus planta intus sunt excavata.

Hypericum appellatur, ab ὑπὲρ super & εἰκόνας spectra, seu imagines, quia super has dominium habet.

I.

Iacea ortum suum habet, á jacere, quia humi sæpe jacet.

Iacobæa, quia circa diem St. Iacobi in optimo vigeat vigore.

Ilex, dicitur á verbo illicio, idem quod Illidium.

Im.

Imperatoria, nomen accepit ab effectu, ob raras nempe insignes virtutes, quibus præ multis aliis simplicibus pollet.

Iris, à coelestis arcus similitudine, puta colorum diversitate.

Isatis græcam originem agnoscit *ισάλης* quod Gladium significat.

Juncago, quasi planta ad juncum accedens.

Juncus, à jungere, quia hac planta herbæ inter se fasciculatim junguntur.

Juniperus nomen habet suum, quod juniores & novellos fructus pariat, antiquis maturiscentibus.

L.

Lactuca, vox hæc, derivatur à Lacte, quia tota planta lacte turget.

Lamium, hoc nomen desumptum est, à pisce Lamia dicto, qui si iratus horrendum vultum refert.

Laserpitium, nominatum à Lasere.

Lathyrus, à græco vocabulo *λάθυρον* Cicercula, vel à *λαθεῖν* latere, forte quia fructus, filiqua inclusa latet.

Lens, à vocabulo lenis deductum, quod qui eo vescuntur, lenes ac moderati fiunt.

Lentibularia, quia ad lenticulam accedit.

Lenticula, dicitur à lente, quia folia ejus lenti assimilantur.

Lenticularia, à foliorum forma appellatur.

Leucanthemum, à *λευκός* albus & *άνθεμος* Flos, quia florem habet candidum, quia

Leucojum, à λευκόν album, & ἴον Viola proprie Viola alba.

Lichen, nomen hoc deduxit à Lichene morbo cutaneo, quia ad Lichenes sanandos confert.

Ligusticum, Dioscoridis mente, quod plurimum in Liguria nascatur.

Ligustrum, à lego quasi legustrum.

Lilac vocabulum est Arabicum.

Lilium, à λείος lævis, quia folia ejus sunt polita.

Lilium convallium, à λείος lævis & Valle, quia lævia habet folia & in convallibus frequenter crescat.

Linaria, à lino, quia semen ejus molle est & valde leniens.

Lingua Cervina, à figura plantæ, cum lingua animalis.

Lithospermum, à λίθος Lapis & Sperma semen, ac si diceres semen lapideum.

Lonchitis, dicta à λόγχη Lanceæ, quia folia ejus acuta sunt.

Lotus, à græco vocabulo λῶλος dulcis.

Lunaria, à Luna, ob formam filiquarum ita nominata lunatam.

Lupulus, à Lupo, hominis ac pecoris infensissimo hoste, qui subter hunc frequentissime sese abdere solet, ut eo melius raptò vivere possit.

Luteola, à luteo colore, pannos tingens.

Lychnis à græco vocabulo λύχνος Lumen quia flores ejus, radios luminis faciant.

Lyco-

Lycoperdon, à λύκος *Lupus* & πέρδω *pedo*, quasi crepitus Lupi.

Lycopus, nominatur à λύκος *Lupus* & πῆς *pes*, planta ad Lupi pedem accedens.

Lyfimachia, nomen accepit, à Lyfimacho Regis Siciliae filio, qui hanc plantam primus invenisse fertur,

M.

Majorana, à μαραίνω, marcesco, vel quasi major ad vitam, quia vitam prolongari censetur.

Malus, à græco vocabulo, μήλον aut ut alii volunt à μέλω *fano*,

Malva, à μαλαίω *emollio*, quod tota planta vim habet emollendi.

Marrubium, ab hebraico vocabulo Marrob succo nempe amaro sic dicto.

Matricaria nomen accepit à Matrice, quia hysteriis utilis est.

Medica à græco vocabulo nomen nactum μηδικὸν vel à Media ut ait Plinius.

Melampyrum huic plantæ impositum est à μέλας *niger* & πυρὸς *Triticum*, propter seminis formam & colorem.

Melilotus nomen habet à μέλι *Mel*, & Lotus, quasi Lotus mellitus.

Melissa, hoc nomine dicitur à μέλι *Mel* quod apes ex ea Mel exugere solent.

Melo creditur nomen traxisse à græca voce μήλον quod pomum significat.

Melo pepo, à græcis vocabulis μήλον *malum* & πίπον *genus cucumeris*, Menz

Mentha, videtur nomen ejus concinnatum esse inde, quod mentem percellat, alii vero putant derivationem suam habere à vocabulo græco *μίνθος*, quod ejus folia lanuginem habent gryseum.

Menyanthes vocis hujus origo debetur, græcis, *μηνίανθος* enim plantam significat paludosam.

Mercurialis, à Mercurio primo Inventore ita dicitur.

Mespilus, ab *ἐπιμελής*, quia folia ejus, ubi sponte nascatur malo similia sunt.

Meum, à *μύον*, herba caule & foliis aniso non absimilis.

Millefolium salutatur, à multitudine foliorum

Morsus ranæ, quod Ranæ ejus morfu gaudeant.

Morus, à græco vocabulo, *μαυρός* niger, quoniam ipsius fructus, nigricantis sunt coloris, vel ut alii putant à Mora, sive tarditate florendi.

Moschatellina, à Moscho, quasi parva planta moschum olente.

Muscus, à *μόσχος* subtilis.

Myagrum, nomen ejus dependet à *μύια* Musca & *ἀγρεύω* capto, quasi planta Muscas capiens.

Myosotis, ex *μύος* Mus, & *αὔλας* auricula, ob foliorum analogiam.

Myofuros, à *μύος* Mus & *ὄρα*, cauda.

Myrrhis à Myrrha, quia Myrrhæ odorem de se ispirat.

N.

Napus vocatur , à græco vocabulo *νάπυ* vel à *ναψο*.

Nasturtium, nomen tribuitur, à narium formento , quia sternutare facit vel ut Varro-
ni placet à torquendis naribus.

Nidus avis, à forma radicum inter sese impli-
catarum, nidum avis repræsentante.

Nicotiana, à Iohanne Nicotio Regis Galliæ
Consiliario qui primus ex Lusitania in Gal-
liam misit.

Nigella potius Nigrella , ob feminis Nigredi-
nem.

Nissolia ab autore Nissole Medico Monspeli-
ensi ita dicta.

Nymphæa à *νύμφη* Sponsa, quod aquosa amet
vel quod hæc planta aquæ sit sponsa.

O.

Ocimum, nomen est, ab *ὀκέως* cito, quod se-
men ejus cito è terra erumpit.

Oenanthe derivationem agnoscit, ab *ὀλυν* vitis
& *ἄνθος* flos, quasi flos vitis, potius quod
cum Vite floreat.

Onagra ab *ὀνος* Vinum & *ἀγρός* ager, quia ra-
dix odorem habet vinosum, alii ab *ὄνος* asi-
nus & *ἀγρός* ager, ob folia forsan ita dicta,
cum auriculis asini quoad longitudinem
comparata.

Onobrychis ab *ὄνος* asinus & *βρύχω* frondeo,
quia hujus plantæ odor, asinos rudere facit.

Ophiō-

Ophioglossum, ab ὄφεις serpens & γλῶσσα lingua, quia serpentis linguam refert.

Ophris supercilium significat, quo nomine dicta est, dum capillis nigredinem inducit.

Opulus, quod Viti fiat opem.

Orchis ab ἐράζω appeto, quia radix ejus deglutita, Venerem stimulat potius à græca denominatione ὄρχη, Testiculus, hinc planta à radicum forma, sic dicitur.

Oreoselinum, ὄρος Mons & σέλινον apium, id est Apium montanum.

Origanum, ab ὄρος Mons & γάνος Lætitia seu planta quæ montes amat.

Ornithogalum ab ὄρνις avis & γάλα Lac, quia flores ejus, tam albi sunt instar animalium plumiferarum.

Ornithopodium à vocibus græcis ὄρνις avis & πῆς pes.

Orobanche ab Ervi strangulatu nomen adepta est, nempe quod ὀροβον ἄγχει orobum aliaque legumina strangulat.

Orobis, appellatur à græcis ἐρεπλω edo & βῆς bos, antiqui enim Orobis, boves saginare solebant.

Osmunda, quid sibi nomen velit, me nescire profiteor.

Oxycoccus à fructus colore & sapore ita dicitur.

Oxys à græco vocabulo ὄξύς acidus, quia saporem habet acidum.

P.

Panicum nominatur à Pane , quia olim ab illo Panis confectus fuit , alii putant nomen accepisse à paniculis suis.

Parietaria , ob locum quem amat , sic dicta , lubentissime enim circa parietes provenit.

Parnassia à monte Parnasso , in quo abunde cresci solet.

Pastinaca , à pascendo , vel à pastu , quia radix ejus comeditur.

Papaver , à Pappa , pultis specie , cui semen papaveris olim immiscebatur vocatur.

Pedicularis , dicitur à sua facultate quam possidet , pediculos enecandi , Dodonæus autem existimat sic denominari , quod pecori ac jumentis , quæ ea pascuntur pediculorum copiam gignat.

Pentaphylloides , agnoscit suam derivationem à πέντε quinque & φύλλον folium , unde pentaphylloides , quasi planta Quinquefolio similis.

Perfica , nomen habet à Perside orientis regione , unde hoc arboris genus , in nostrum orbem est advectum.

Perficaria , à Perfica , quia ejus folia Persicæ assimilantur.

Pervinca , à vincendo , quod vinceret pervinceretque injuriam temporis , ac semper vireat.

Petasites , nomen à πέλαω , quia ejus folia valde sunt extensa , sive à Petafo , ob foliorum formam & amplitudinem.

Pepo,

Pepo , à græca voce πέπων , quod genus cucumeris significat.

Peucedanum , à græco vocabulo πένυκη Pinus quia ejus folia cum pinifoliis similitudinem quandam habent.

Phalangium , dictum à virtute phalanges digitorum curandi male affectos.

Phellandrium nuncupatur , à φελλεύω fluctuo sub mari & ἀναδρεύνω virile robur assumo, quia in aquis crescendo viriliter se erigit.

Pimpinella quasi Bipinella , à foliorum binis ordinibus, pennatim five plumatim congestis.

Pinguicula , à foliorum crassitie atque pinguedinosa quasi substantia.

Pisum , à Pisa urbe Italiæ , in quo loco olim copiosissime nascebatur.

Plantago , vocatur à planta , quia plantis pedum juxta vias conculcatur.

Plantaginella , quasi Plantago minima seu herba ad plantaginem accedens.

Polium à voce græca πολυδς incanus quasi herba incana.

Polygala , à πολὺ multum & γάλα lac, quasi herba lac augens.

Polygonatum à πολὺ multum & γόντ genu, quia gaudet pluribus geniculis , seu quod radices & caules habeat geniculatos.

Polygonifolia vocatur à foliis cum poligonifoliis similitudinem quandam habentibus.

Populago, quia juxta ripas & fossas sub populo crescit.

Populus à populo quod ex ejus calce multi nascantur.

Porrum, dictum quod porro eat & longe lateque grassetur.

Portulaca, quasi porcellorum λάχανον, olus.

Potamogeton à ποταμός fluvius & γείτον vicinus, quia fontibus & præsertim fluminibus vicina est.

Primula veris, à primo vere, quia ineunte vero & ante illud tempus floret.

Prunella, dicta ab effectu, quia in angina die

Bräune, præstat magnam openi,

Prunus, à græco vocabula πρύνη.

Q.

Quercus, quæ sit nominis ratio obscura est putant quidam à κέρχω exaspero quia cortex ejus asper est.

Quinquefolium à quinto foliorum numero quia quinque folia habet πέντε enim quinque & φύλλον folium significat.

R.

Ranunculus à ranis nomen accepit, quia eorum stabulum est.

Rapa, à rapere, quia à prætereuntibus ex agro sæpissime rapiuntur.

Raphanistrum, dicitur à Raphano, quia radix ejus minorem raphanum refert.

Raphanus dicitur, à ράδιος facilis & φαίγο appareo, quasi planta facile apparens.

Rapi

Rapistrum , à foliorum similitudine cum Rapo.

Rapunculus dictus , quasi Rapum parvum, dum Radix ejus minor est Rapo.

Rhamnus à *ῥάμνος* spina, quia frutex est spinosus, spinis enim non secus ac gladius pungit.

Ribes vox est Mauritanica.

Rosa, à græco vocabulo *ῥόδον*, quod largum odoris effluvium emittat.

Ros solis, à guttis roris , quia folia ejus sub maximo solis ardore madent.

Rubeola quasi exigua Rubia.

Rubia, à rubro colore nuncupatur, quod radix ejus inficiat rubro colore, seu quod cum radice lanæ tingantur.

Rubus, à rubro colore, quia fructus rubescit.

Rubus Idæus, à monte Idæo sic dictus.

Ruscus, hujus fruticis nomen, unde derivatur Autores inter se non conveniunt, plerique existimant. à vocabulo rusticus.

Ruta à *ῥύω* servo quia sanitati conducibilis est.

S.

Sabina à belgica voce Sabin. quod septem significat.

Salicaria, dicitur à Salice, quia sub falice lubenter crescit.

Salix à Saliendo nominata, quod celeriter crescat ut falire videatur.

Salvia nominatur à salvando, quod plurimis morbis opitulatur.

Sambucus, ab instrumento musico Sambuce dicto.

Samolus, derivatio ignota.

Saxifraga quasi saxifrangus, quod è fissuris rupium erumpat.

Scandix à græco vocabulo *σκάνδιξ* acus pastoris, à femine acum referente.

Scirpus, veteribus audit luncus enodis, unde proverbium Nodum in scirpo quærere.

Sclarea, à *σκληρός* durus vel ficcus, quia hæc planta caulem habet durum ac ficcum.

Scrophularia, ab effectû ita dicta, scrophulis enim medetur.

Secale dictum à secando.

Sedum, à sedendo, quia in muris sedit.

Serpillum ab *ἔρπω* serpo, quia planta repens est.

Sideritis à *σίδηρος* ferro, quod ad vulnera fer-
ruminanda utilis, seu quod vulnera ferro in-
flicta couglutinat.

Sinapi, originem suam habet à vocabulo *σίνηπι*, quod herbam valde acrem significat, cum ejus semen comedenti lachrymas cieat.

Sisymbrium, à *σίαν* & *ὄβρος* quia hæc planta in locis aquosis provenit, alii putant nomen sumpsisse à verbo *σείω* moveo, quia aquis innatans fluctuat & à vento facile movetur.

Smilax, à *σμάω* rado, quia planta est aspera.

Solanum, dictum ab effectû, somniferum lethale vel à solare, quia dolores intensos sistat.

Sol.

Soldanella, unde ejus nomen, hodie ignotum.

Sonchus, à græco vocabulo *σόγχος* παρὰ τὸ *σῶν* χεῖν, quia hæc planta fabubrem succum fundit.

Sorbus, nominatur, à Sorbere, quia fructus si maturus, mollis fit, ut sorbere possit.

Sparganium, à græca voce *σπάργανον* fasciola, quia ejus folia, fasciolum referunt.

Spinachia arabicam originem agnoscit Hispanach, alii vero derivant à semine spinoso.

Spondylium, ab insecto, quod spondylis nomen habet, quodque amabilem rubrum colorem tingere facit.

Stachys, à græco vocabulo *στάχυς* spica, quia ejus flores in spicam sunt congesti.

Staphylodendron, à *σταφυλή* uva & *δένδρον* arbor uvæ, quia ejus folia & fructus in racemos sunt dispositi.

Stellaria quia summitates foliorum, stellam repræsentant.

Stramonium, nominis hujus derivatio ad huc non constat.

Symphytum à *σύν* cum & *φύω* adnascor, quia hæc planta vim habet consolidandi.

Stœchas, ab Insulis maris mediterranei, Stœchades dictæ ita nominatur.

T.

Tamariscus à Tamarice per appositionem scus vocabulum natum esse videtur.

T 5

Tana-

Tanacetum, à vocabulo Athanasia, quod Herbam significat immortalem, ortum suum duxisse æstimatur.

Taxus à ῥόξα Venena, quia hæc arbor venenosa est.

Teucrium, à Teucro, Ajacis fratre inventore.

Thalictrum, à vocabulo græco θάλλω vireo quasi planta virescens.

Thlaspi, à θλάω premo, quod fructus ejus planus & compressus sit.

Thymelæa, à θύμειλαία Thymi olea, quia folia ejus Thymo similia.

Thyselinum, àθύω suffio & σίλινον apium, ac si diceres, apium suaveolens.

Tilia à ῥιλόν pluma mente Boerhav.

Tithymalus, à ῥιθὴ Mamma & μαλακὸς tener, quasi tenera mamma, quia lac fundit.

Tormentilla ab effectu, quæ tormina ventris sedat.

Tragopogon, à τραγός Hircus & πώγον barba nomen sibi adscivit, quia semen ejus adhuc inclusum barbam hirci refert.

Tragoselinum, τραγός Hircus & σέλινον petroselinum, quia folia petroselino similia sunt & ab hircis devorantur.

Trifolium, à foliorum terno numero.

Turritis, à forma Turris, quia in fastigium instar turris, cacumen ejus transit.

Tussilago à virtute ejus, ad tussim sedandam

Typha à græca denominatione ῥύφη à sceptro, regum

regum aureo , quod ante primos Magistatus gestatur vel à *λύκος* quod locum palustrem denotat.

V.

Valeriana , nomen hoc deducitur à Verbo latino Valeo , quod viribus eximiis valere æstimatur , alii putant à Valerio autore ita dici.

Valerianella , nuncupatur , quasi exigua valerina.

Veratrum , ab avertere , quod mentem avertat.

Veronica , quasi Vere unica inter plantas, ob virium robur sic dicta.

Verbascum , quasi Barbasum.

Viburnum , à Viurno seu viere.

Vicia , à vincendo quod item ut Vitis capreolos habeat, quibus sursum versus serpitret vel à vocabulo Vitium quod inter frumenta fit vitium.

Viola , nomen accepit , à violando , quod manibus dum decerpitur violetur.

Virga aurea , quia caulis virgæ in modum, ramosque & flos ejus aureum habeant colorem.

Viscum , dicitur , à viscositate quia fructum fert glutinosum & viscosum.

Vitis , à Vieo flecto , quia Vitis capreoli apprehendunt plantas vicinas,

Vitis Idæa , à Vite & Ida , quia instar Vitis

tis scandit & in monte Ida crescendo invenitur.

Ulmaria, ab Ulmo, à foliorum similitudine.

Urtica, ab urendo, quia si tangatur valde urit.

Ulmus apellatur, ab uliginosis locis, in quibus lubenter provenit.

Uva ursi, quia ejus fructus uvæ similis, & ab Urfis vesci solet.

Vulneraria, à vulnere, quia ad vulnera adhibetur.

X.

Xanthium à græco vocabulo ξάνθος flavus, quia capillos flavo colore obducat vel tingat,

S. D. G.



IN-



INDEX.

A.

A bies Taxi folio.	38
tenuiore folio.	39
Abrotan, caulicul. albic.	269
— — rubent.	259
— Linifolio.	202
— Mas,	260
Absinthium montan.	203
— vulgare.	202
— pontic, tenuifol, incanum.	260
Acacia germanic.	28
Acanthium vulgare.	215
Acer major.	39
— minus campestre.	15
— montan. candid,	4
— platanoides.	39
Acetosa alpina.	108
— arvensis lanceol.	39
— — angustifolia.	39
— — non lanceolata.	203
minima.	39
hortensis rotundifol.	108
	Acero-

Index.

Acetosa lanceolata elatior.	108
— pratenfis fol. crisp.	40
— — vulgar.	40
Acetofella.	27
Aconitum cœrul.	260
— lycocton. lut.	108. 260
Acorus adulterin.	65
— verus.	40
Adiantum alb.	139
— aureum.	173
— nigrum.	138
Adonis flos, citrin. flore.	30
— — phœnic. flore.	30
Agaricus auriculæ forma.	203
— betulinus.	203
— esculentus.	272
— digitatus niger apicib. albidis.	260
— digitatus niger.	261
— fraxineus niger.	109
— intybaceus.	108
— lamellatus.	203
— lichenis facie variegat.	203
— officinali fimilis.	203
— pedis equini facie.	203
— porosus rubens.	203
— spuamosus.	109
— tubæ Fallopiianæ instar.	273
Agrimonia officinar.	109
Alcea foliis rotundis.	109
— hirsuta.	204
— major.	109
	Alcea

Index.

Alcea vulgaris.	109
Alchimilla erecta gramineo fol.	40
— linariæ fol.	40
— montana minim.	40
— lupina gramin. fol.	110
— vulgaris.	110
Alga bombycina.	111
— fontalis trichodes.	110
— tenuiorib. filament.	110
— virid. capillac. fol.	110
— vulgatissim. & longiss.	110
Alkekengi.	111
Alliaria.	22
Allium montan angustifol.	111
— — bicornæ.	204
— — capite rotund.	111
— Sativum.	41
— sativ. alterum.	41
— sylvestre latifol.	41
— urfinum.	41
Alnus alpina minor.	5
— nigra baccifera.	59
— rotundifol. glutinos.	4
— — fol. incano.	5
Alsinastrium serpillifol.	41
Alfina altissima nemor.	111
— aquatica media.	112
— arenaria.	113
— baccifera.	224
— fluviatilis.	99
— geniculata.	204
	Alfina

Alfine hyperic. fol.	112
— maxima folanifol.	113
— media vulgaris.	15
— minor multicaulis.	112
— — capitul. lini.	112
— muscosa.	113
— palustr. fol. gramin.	113
— — minor.	205
— — repens.	268
— — rotundifol.	204
— — tenuifolia.	205
— plantagin. fol.	111
— pratens. graminifol. ampliore.	16
— — — angustiore.	16
— pusilla graminea.	204
— — flore tenuiss.	16
— saxatilis fol. longiss.	41
— — multiflor.	113
— tenuifol.	41
— spergulæ facie.	13
— spargula major.	204
— — minor.	112
— — minima.	41
Alfinoides paludosa.	270
Althæa diofcorid.	205
Alyssum flore purpur.	231
— foetid.	113
— incan. fruticos.	16
— — lut. serpillifol.	16
— montan, incan. pereune.	205
	Alyf.

Index.

Alyssum segetum fruticos.	16
— foliis acut.	114
— serpillifol.	114
— veronic. fol.	16
— vulgare polygonifol.	1
Amara dulc.	98
Amaranthus luteus.	227
Amygdalus amara.	17
— dulcis.	17
— nana.	17
Ammi majus.	206
— perenne.	206
Anacampseros flore alb.	206
— purpur.	206
Anagallis aquatica major.	199
— minor.	200
— coerulea.	43
— lutea nemorum.	69
— paludosa.	43
— phoenicea.	43
Anblatum.	114
Anemone sylvestris.	43
Anethum hortense.	43
Angelica pratensis altera.	114
— apii fol.	206
— sylvestris.	114
Anisum.	206
Anonis spinosa alb. flore.	115
— purpur.	114
— erecta.	115
— spinis carens.	115

U

Anony-

Index.

Anonymos Clus.	28
Anserina.	83
Anthyllis leguminos.	202
Antirrhin arvense majus.	43
— — minus.	164
Aparine latifol. montan.	43
— femine lævi.	43
— — minore.	215
— supina pumila.	44
— vulgaris.	115
— femine minori.	43
Aphaca.	207
Apium anis. dict.	206
— crispum.	207
— hortense.	207
— montan.	247
— palustre.	207
— petroselin.	207
Aquifolium spinos.	44
— non spinos.	44
Aquilegia hortens.	45
— sylvestris.	44
Arenaria.	113
Arifarum.	45
Aristolochia clematit. recta.	207
— vulgaris purpur.	8
Arnica.	134
Artemisia tenuifol.	70
— vulgar. caule purpurascante.	260
— — viridi albicante.	261
Arum palustre.	45
Arum	

Index.

Arum vulgare macul.	45
— — non macul.	45
— — macul. nigr.	45
Arundo vulgaris.	261
Afarum american.	17
— vulgare.	17
Asclepias albo flore.	45
Asparagus sativus.	115
— vulgaris.	116
Asplenium.	116
Aster arvens. coerule.	116
— atticus vulgare.	207
— canadensis annuus.	259
— montanus luteus foliis fol.	116
— omnium maximus.	116
— palustris luteus laciniatus.	116
— — lanuginosus.	208
— — parvo flore.	261
— pratensis autumnal.	261
Atriplex angusto oblongo fol.	208
— angustiss fol.	208
— folio hastato.	208
— hortensis alb.	208
— — rubra.	208
— foetida.	219
Astragaloides.	219
Astragalus luteus.	117
— florib. vicinæ.	117
Astrantia.	147
Avena alba.	118
— fatua.	147

Index.

Avena nigra.	118
— pilosa.	147
Auricula muris pulchro flore.	113
B.	
Ballote.	185
Balsamina lutea.	118
Barba capræ.	118
— florib. compact.	202
Barbarea.	97
Barbarea mural.	104
Bardana.	240
Beccabunga.	200
Belladonna.	118
Bellis coerulea.	61
— major.	161
— sylvestris media.	45
— — minor flore albo.	5
— — — mixto.	5
— — caule fol. hirsut.	66
Berberis dumetor.	46
Beta alba.	119
— rubra.	119
Betonica alb.	119
— aquatica.	188
— arvens. annua.	209
— coronaria.	124
— purpurea.	119
— minus ramosa.	125
Betula.	46
Bidens fol. non dissect.	209
— tripartit. divis.	209
Bidens	

Index.

Bidens fol. non dissect. tripartit. divis. caule purpurasc.	209
Bifolium.	73
Bistorta radic. maj. intort.	209
———— minus intorta.	209
Bistorta alpina maxima.	210
———— minor.	210
Blattaria.	210
Blitum alb. majus.	210
———— minus.	211
— sylvestre.	210
Boletus escul rugos. albicans.	46
———— ————— fulvus.	46
— in metam fastigiatus.	17
— phalloides.	18
Bonus Henricus.	51
Borrigo minima.	26
Botrys verticillata.	217
Branca ursina.	193
Brassica alb. crispa.	46
— alpin. perenn.	47
— arvensis.	46
— campestris perfol.	5. 119
— cauliflora.	47
— fimbriata.	47
— gongylodes rapo longiore.	47
———— ————— rotundo.	47
— rubra.	46
— — crispa.	47
— viridis.	47
Brunella coerul. flore magn.	120

Index.

Brunella coerulea. flore folio laciniat.	119
—— major fol. non dissecto.	119
—— flore porpurasc.	119
Bryonia aspera.	47
—— nigra.	100
Bubonium lut.	116
Buglossoides Echiifol.	120
Buglossum angustifol. maj.	120
—— arvense annuum.	121
Bunias sylvestr.	26
Buphthalm. tanacet. min. fol.	211
Bupleurum fol. subrot.	211
—— montan. latifol.	121
—— perfoliat.	211
Bursa pastoris major. fol. sinuat.	6
—— ——— non sinuat.	6
—— media	6
—— major loculo oblongo	1
—— minim.	26
Butomus	121
Buxus arboresc. fol oblong.	6
—— ——— pictis.	6
—— ——— rotund.	6

C.

Caecalia.	121
—— tomentosa.	122
Cacubalus.	224
Calamintha humilior folio rotundiore.	18
—— pulegii, odore.	212
—— vulgaris.	212
Cala-	

Index.

Calamus aromatic.	40
Calceolus Mariæ.	122
Campanula alpin. latifol.	213
— — linifol.	213
— — rotundifol.	213
— — arvensis erecta alba.	122
— — — — — coërul.	122
— — — — — procumbens.	48
— — — — — singularib. florib.	213
— — — — — hortensis.	123
— — — — — nemorosa magno flore.	122
— — — — — parvo flore.	123
— — — — — persicæ fol.	123
— — — — — pratens. flore conglomerat.	212
— — — — — pyramid. altissim.	213
— — — — — radice esculent.	48
— — — — — urticæ fol.	212
— — — — — flor. alb.	212
Cannabina aquatica.	209
Cannabis erratica.	214
Cannabis fativa.	213
— — sylvestris.	230
Caprifolium german.	48
— — perfoliat.	48
— — non perfol. Boerhav.	49
— — non perfol. foliis sinuosis.	49
— — — — — variega-	
— — — — — tis.	48
Cardamine annua exiguo flore.	50
— — flore majore elatior.	49
— — pratensis magno flore albo.	49

Index.

Cardamine pleno.	49
— purpurascente flore.	49
— quarta Dalechamp.	18
Cardiaca.	244
Carduus Acanthoid.	214
— benedictus.	224
— capite rotund.	215
— caule crispo.	214
— fullon.	226
— hæmorrhoidal.	222
— lanceolat.	214
— Mariæ.	214
— nutans.	214
— palustr.	222
— pratensis.	224
— stellatus.	215
— tomentos.	215
Carlina acaulos magno flore.	215
— caulescens.	215
— sylvestr.	215
Carpinus vide omiffa.	
Carthamus offic.	216
Carvi.	216
Carvifolia.	216
Caryophyllat. alpin.	123
— aquatica.	18
— vulgaris.	18
— — flore majore.	18
Caryophyllus arvens. umbellif.	15
— flore tenuiffime diffect.	124
Caryophyl-	

Index,

Caryophyllus montan.	124
— sylvestr. barbat.	125
— — humilis.	124
— — lanuginos.	125
— — latifol.	125
— — prolifer.	124
— — plumarius.	261
— — vulgar. latifol.	124
— — angustifol.	124
Cassida palustr. coerule.	216
— — minim.	216
Castanea equina.	65
— — fativ.	50
Cataputia.	101
Cataria major vulgar.	125
Caucalis anglica fab.	229
— — arvens. echinata magn. flore.	216
— — — parvo flore.	217
— — foliis chærefol.	128
Centinodia.	250
Centaurium minus alb.	217
— — — purpur.	217
— — — ramosissimum.	217
— — — luteum,	125
Cepa ascalonica.	126
— — fissilis.	125
— — juncifol.	125
— — — minor.	126
— — sectilis.	125
— — vulgaris oblonga.	126
U s	Cepa

Index.

Cepa vulgaris tunica purpurasc.	126
— — candid.	126
— — tenuifol. sphærocephalos.	126
Cerasus fructu albo dulc.	19
— — magn. cordat.	20
— — parvo amaricante.	19
— — major sylvestris.	19
— — pumila.	19
— — racemosa fructu non eduli.	19
— — ferotina fructu acido.	19
— — sylvestr. amara.	19
Cervaria nigra.	247
Ceterach.	116
Chærophyllon fativ.	51
— — sylvestre.	51
— — — femine brevi.	128
— — — geniculat.	128
Chamæbalanus.	66
Chamæbuxus.	25
Chamæcerasus alpin.	50
— — fructu rubro.	19
— — dumetor.	50
Chamædryas fruticos.	217
— — laciniat. fol.	217
— — major alpin.	127
— — minor.	127
— — palustris.	126
— — spuria angustifol.	105
— — minor.	105
Chamægenista.	128
Chamelinum.	42
Cha-	

Index.

Chamæmel.	foetid.	127
—	inodorum.	127
—	vulgare.	50
Chamæmespilus.		71
Chamænerion	glabrum maj.	218
—	— minus.	218
—	villosum magno flore.	218
—	— parvo flore.	218
—	vulgare latifol.	218
Chamæpythis	lutea.	127
Chamæspartium.		128
Chelidonium	majus.	51
—	— laciniat. flore.	51
—	minus.	57
Chenopodium.		219
—	angustifol.	219
—	betæ fol.	220
—	coma purpurascete.	219
—	— virefcent.	219
—	foetidum.	219
—	folio laciniat.	219
—	— coma purpurasc.	
—	—	219
—	— oblongo.	220
—	— sinuato.	220
—	— triangul.	51
—	latifol.	51
—	pes anserin. 1. Tab.	219
—	— 2. Tab.	220
—	opuli fol.	220
	Cheno-	

Index.

Chenopodium stramon. fol.	220
Chondrilla coerulea.	239
— Sonchifol. flore luteo.	220
— — purpurascens.	221
— juncea.	128
Christophoriana.	52
Chrysanthem. fol. minus secto glauco.	221
Chrysosplenium fol. ampl.	6
— pedicul longis insident.	7
— — mino-	
— — rib. subrotund.	7
Cicer sylvestre.	117
Cichorium angustifol.	129
— latifol.	129
— crispum pratense lut.	128
— fativum flor. alb.	129
— — coerule.	129
— sylvestr. coerule.	128
— — alb. flore.	129
Cicuta aquat. Wepf.	254
— foetid.	129
— major.	129
— minor.	130
Cicutaria alba.	72
— aquatica.	178
— rubr.	72
— latifol. hirsut.	72
Circæa lutetiana.	221
— minima.	221
Cirsium acaulos.	222
	Cir-

Index.

Cirsium arvense sonchifol. flore purpurasc.	221
— — — albo.	222
— — — radice re-	
— — — pente.	222
— — — pratenſe asphodel. radic.	222
— — — ſingularib. capitul,	52
Clematis Daphnoid.	27
Clematitis ſylveſtr. latifol. dentata.	223
— — — foliis non incifis.	223
Clinopodium arvens. ocymi facie.	223
— — — origano ſimile.	223
Clymenum Pariſienſ.	223
Cnicus pratenſ. acanthi fol. flore flavesc.	223
— — — purpur.	224
— — — fativus.	216
— — — ſylveſtr. hirtut.	224
— — — vulgaris.	216
Cochlearia fol. cubitat.	52
Colchicum commune.	270
— — — flore albo.	270
— — — montan. anguſtifol.	270
Conferva Plin. reticulata Dillen.	111
Colutea filiquos.	135
Conſolida Genevens.	48
— — — major alb. flore.	99
— — — — purpur. flore.	90
— — — paluſtris.	238
— — — pratenſ. media.	48
— — — regalis.	134
Convulvulus major alb.	130
— — — minor arvenſis.	130
	Con

Index.

Convolvulus angustifol.	130
— fiore arbo.	130
— — cum umbilic. purpur.	130
— — —	130
— — candido	130
Conyophyllon.	72
Conyza cœrulea.	116
— linariæ fol.	131
— major vulgar.	224
— media.	261
Coralloides abietina.	273
— albida.	262
— altera.	57
— cornicul. candid. sim.	271
— — coccineis.	271
— cornu cervin.	273
— flava.	224
Corallina fœnic. fol.	131
Coriandrum majus.	131
Cornus hortens. mas.	3
— ceræ colore.	3
— fructu albo.	3
Coronilla herbacea.	132
— major.	135
Coronopus hortens.	131
Corylus sativa fructu minore.	2
— — oblongo albicante.	2
— — rubente.	2
— — rotundo maximo.	3
— sylvestris.	2
Cory-	

Index.

Corylus latiore folio.	2
Cotoneaster.	71
Cotula foetida.	127
Cotyledon aquat.	206
Cracca major.	106
— minor.	106
— Rivini.	106
Cratægus fol. laciniat.	52
— subrotundo.	53
Crepitus Lupi.	268
Crista galli fæmia.	82
— flore rubro.	82
— Mas.	82
Cruciata hirsuta.	53
— minima.	132
— palustr.	131
Cuculi flos.	68
Cucumis flexuosus.	53
Cucurbita major.	177
Cucurbita vulgaris.	177
Cucumis vulgaris.	53
— fructu alb.	53
Cuminum pratense.	216
Cupressus Mas.	7
— Fœmina.	7
Cuscuta major.	224
— minor.	225
Cyanus seget. flore albo.	53
— albo.	53
— disco coerul.	53
Cy-	

Index.

Cydonia fructu brevi.	54
— oblongo.	54
Cymbalaria.	24
Cynoglossum majus.	54
Cynoforchis delphin.	74
— foemina.	74
— latifol.	78
— — altera.	79
— — major quarta Tab.	75
— — maculat.	78
— — trifolia.	79
Cyperinum palustre minus.	55
Cyperoides latifol. spica rufa.	55
— — spadicea viridi.	55
— foliis caryophyll. spica oblonga.	54
— rariorib. vesicis.	20
— minus spica densiore.	56
— spica pendula.	132
— — brevior.	55
— — longior.	55
— palustre maj.	55
— — aculeat.	56
Cyperus gramineus.	133
Cyperoides polystachion.	54
— — lanuginosum.	55
— — flavicans.	56
— sylvarum tenuius spicat.	54
— — spica parva.	54
— — spica varia.	20
Cyperoides humile.	132
Cype-	

Index.

Cyperoides nemorense spicis variis.	20
— nigro luteum vernum majus.	20
— — minus.	20
Cyperus maritimus.	133
— minim. panicul sparsa nigricante.	133
— — subflavescente.	133
— rotundus.	132
— vulgator.	132

D.

Daucus annuus minor.	225
— officinar.	133
— fativus.	134
Delphinium feget.	134
Dens leonis ampliss. fol.	21
— fol. angustiore.	56
— canescentib.	225
— hirsuto.	225
— latiore.	20
— minimis foliis.	56
— minor fol. radiat.	56
— minus villoso.	57
— qui Pilosella officinar.	56
Dentaria heptaphyll.	57
— pentaphyll.	57
Digitalis flore candid.	57
— luteo magno.	57
— purpur.	57
— minima.	134
Dipsacus fol. laciniat.	226
— fativus.	226

X

Dipsa-

Index.

Dipsacus sylvestris.	227
Dipsacus fol. lacin. capitulo minore.	227
Doronic. plantagin. fol.	134
— radice scorpii brachiata officinar.	58
Dracunculus aquatic.	45
Dulcamara.	98

E.

Ebulus.	94
Echinophora flore magn.	216
— parvo.	217
Echium majus.	135
— scorpioides.	166
— vulgare.	166
Elæagnus.	33
Elatine Mas.	165
— foemina.	165
— fol. subrotund.	165
Elichrysum montan. angustifol.	227
— citrin. latifol.	227
— purpur.	58
— longo fol. & flore.	58
— flore rotundiore candid.	58
— sub purpureo.	58
— germanic.	227
— spicatum.	227
Emerus major.	135
— minor.	135
Endivia fativa.	129
Endi-	

Index.

Endivia fativa fol. crispis.	129
— vulgaris.	129
Enula.	116
Epilobium.	135
Epimedium.	136
Epithymum.	225
Equisetum aquat. maj.	136
— foetid. majus.	227
— tenuior. ramulis.	228
— foliis nudum ramosum.	136
— non ramos.	136
— minus variegatum.	136
— palustre brevior. fetis.	136
— longior. fetis.	136
— longiss. fetis.	7
— sylvatic. tenuiss. fetis.	58
Erica vulgar.	137
— glabr. flore albo.	137
Eruca palustris minor.	98
— sylvestris major.	137
— tenuifolia.	137
Eryngium arvense.	206
— vulgare.	139
Erysimum alterum filiq. Erucae.	137
— vulgare.	228
Esula exigua.	257
— major.	196
— minor.	196
— officinar.	35
— rotunda.	196
— folisequa.	196

Index.

Eupatorium cannabin.	138
Euphrasia officin.	228
— parva purpur.	176
— minus ramosa.	228
— ramosa pratens.	228
Euonymus vulgaris.	59

F.

Faba major.	228
Fabaria officinar.	206
Fagopyrum scandens altiss.	229
— vulgare.	229
— erectum.	229
Fagus.	21
Farfara.	13
Ferrum equin.	59
Filago altera.	138
— incana.	138
— minor.	262
— vulgar.	138
Filicula quæ Adiantum.	138
— fontana major.	139
— minor.	139
— lutea.	140
— petræa.	140
— saxatilis.	139
Filipendula aquatic.	174
— vulgaris.	139
Filix Mas ramosa major.	139
— minor.	141
— non ramosa.	139

Filix

Index.

Filix minor non ramosa.	140
— mollis.	140
— querna.	140
— ramosa dentata.	140
— non dentata.	140
— rhætica dentata.	140
— tenuissime secta.	141
Flos Adonis.	30
— Cuculi.	68
Foeniculum aquatic.	246
— sylvestre.	229
— peucedani fol.	229
— stellatum.	99
Foenum græcum.	141
— sylvestre.	117
Fragaria fol. hispida.	59
— sterilis.	21
— vulgaris.	59
Frangula.	59
— montana pumila.	59
— saxatilis.	59
Fraxinus excelsior.	21
— humilis.	21
Fucus ferulaceus.	131
— fluviatilis.	230
— tubulosus.	230
Fumaria bulbosa cava, flore rubescente.	8
— niveo.	8
— non cava major.	8
— minor.	9
— minima.	9
X 3	Fuma-

Index.

Fumaria purpur. flore.	8
Fungioides.	141
Fungus albus acris.	230
— angulosus.	230
— auricularis.	263
— betulaceus.	141
— campestr. albus.	263
— corylæus.	271
— crassus.	230
— erynus.	272
— esculentus.	21
— fimbriatus.	21
— fluviatilis.	230
— igniarius.	223
— in metam fastigiatus.	263
— juniperinus.	264
— latus orbicular. candid.	273
— luteus magnus.	263
— pallidus.	230
— maximus.	274
— muscas interficiens.	271
— orbicularis exalbidus.	21
— palustris.	273
— pallidus.	141
— perniciosus.	263
— pileolo lato.	141
— rotundo.	262
— rotundiore.	141
— pediculo longissimo in-	
— fidente.	262
— puniceo.	262
Fun-	

Index.

Fungus planus orbicular.	263
— plurib. ex pedicul. nascentibus.	230
— quercetis innascens.	273
— sambucinus.	203
— umbilic. referens.	263

G.

Galeopsis flore luteo.	60
— fol. caulem ambiente major.	22
— — minor.	23
— iners flore albo.	23
— — purpur.	23
— minor.	23
— palustris beton. fol.	232
— patula seget. alb.	231
— — purpur.	231
— procerior flore candido.	231
— — flavescente.	231
— — purpureo.	231
— purpurea foetid.	23
Gallium album.	131
— album supin.	141
— — vulgare.	131
— arvense.	242
— flore flavescent.	142
— luteum.	142
— montan.	142
Genista humilis.	128
— ramosa fol. hyperic.	143
— spartium majus.	142
— — minus.	143

Index.

Genista tinctor.	142
— angustifol.	142
Genistella herbacea.	128
— pilosa.	143
— sagittata.	143
Gentiana alpina verna major.	143
— autumnalis.	232
— ramosa.	233
— coerulea oris pilosis.	263
— cruciata.	232
— lutea	232
— pratensis lanuginos.	263
— purpurea major.	232
Gentianella minor verna.	143
Geranium batrachiod. flore coeruleo.	144
— cicutæ fol. flore alb.	60
— — rubr.	60
— inodor.	22
— moschat.	61
— columbin. fol. dissectis foetens.	143
— fuscum petalis planis.	144
— reflexis.	144
— pimpinellæ fol.	60
— robertian.	90
— flore alb.	60
— viride.	60
— sanguineum.	144
Gladiolus minor.	61
Glaſtum fativum.	65
— spontan.	66
Glaux palustris.	264
	Globu-

Index.

Globularia cœrulea.	61
Glycyrrhiza sylvestr.	117
Gnaphalium majus vulgare.	138
— minimum.	263
— montan. alb.	58
— — suave rubens.	58
— rectum.	227
— tenuifol.	138
Gramen Alopecuroides.	233
— — minus.	265
— Antoxanthum spicat.	148
— aquaticum.	239
— — fluctuans.	145
— — majus.	145
— — miliaceum.	145
— — paniculat latifol.	144
— — spicat. spica cylindra-	
— — dracea brevi.	145
— Arundinaceum paniculat.	144
— Asperum.	145
— Avenaceum locustis candicant.	146
— — glabris.	146
— — villosis candi-	
— cant.	146
— spica simplici.	146
— utriculis lanuginosis.	147
— montan. lanuginos.	147
— — locustis minorib.	147
— — rubris.	147
— — villosis.	147
— nodosum.	150
X 5	Gra-

Index.

Gramen	panicula sparsa locustis major.	147
—	paniculat. panicul. purpur.	146
—	bufonin.	266
—	canarin. longius radicat.	145
—	capillat. panicul. rubent.	148
—	— viridantib.	148
—	Caryophyllæum.	56
—	cyperin. palustre minus.	55
—	pilosum.	22
—	cyperoides palustre majus	spica
—	compacta.	61
—	divulsa.	61
—	— spicatum minus.	62
—	— triquetrum.	61
—	— dactylon.	62
—	— angustifol.	264
—	— folio latiore.	264
—	— tenuiore.	265
—	— radice repente.	264
—	fluviatile.	145
—	geniculatum.	269
—	harundinaceum montanum.	233
—	Ischæum.	264
—	junceum sylvatic.	158
—	leucanthemum.	16
—	loliaceum altissim.	149
—	— angustiore folio.	149
—	— corniculat. spicis glabris.	149
—	— — spicis villosis.	149
—	— majus.	148
		Gra-

Index.

Gramen loliac. majus spicis longius distan-	
tib.	148
minimum.	149
minus capillaceo folio.	150
panicula multiplici spicata.	148
radice repente.	148
fine aristis, spica longiore	
aristata.	149
fine aristis.	149
multipli-	
ei spicata.	
simplici densa.	
	148
spicis breviorib, & latio-	
rib.	148
Miliaceum.	
minus vulgare.	151
montan panicula miliacea.	224
spadicea.	224
nemorosum panicula rufescente.	151
nodosum.	150
palustre echinatum.	151
majus.	55
spica divisa.	61
triquetrum.	61
panicula fere arundinacea.	146
paniculatum aquatic.	151
arundinaceum.	146
autumnale.	265
latifol.	145
	Gra-

Index.

Gramen paniculatum majus, locustis magnis	
— candicant tremulis.	150
— paniculis elegantiss.	145
— — minus radice re-	
— pente.	151
— pratense panicula duriore.	151
— paniculatum altiss.	152
— majus.	150
— medium.	150
— minus alb.	150
— — rubrum	
— —	150
— — molle.	151
— — pulchrum	
— vernum secalinum spicatum al-	
— tissim.	135
— minus.	
— segetum.	152
— spicatum secalin. minus.	152
— spicatum, spica glumis cristatis.	
— —	62
— spicat. vulgare.	152
— spica cylindracea molli.	62.
— brevi.	152
— nodosa.	265
— glabra.	265
— longiss.	152
— tenuissim,	265
— sylvatic. panicula rufescente.	152
— Gra-	

Index.

Gramen sylvatic. spica divulsa.	61
— tomentar.	67
— tremul. majus.	151
— minus.	151
— triglochin.	157
— typhinum.	264
— vulgare minus.	265

Gratiola.	134
-----------	-----

Grossularia hortens. major, fructu albo.	63
— rubescente.	36
— rubra non spinosa.	64
— non spinosa fructu nigro majore.	36
— minore.	63
— sylvestris.	63

H.

Hedera arborea.	63
— communis.	64
— terrestris.	18
Hederula aquatica.	161
Hedypnois.	20
Helenium.	116
Helianthemum vulgare.	64
Heliotropium majus.	154
Helleboraster.	3
Helleborine altera flore albo.	153
— rubente.	153
— angustifol. palustr.	153
— montana latifol.	153
— angustifol.	152

Hell-

Hellebor. albus.	199
— foetidus.	3
— niger amplior. fol.	1
— angustior. fol.	1
Helxine femine triangul.	
Hepatica fontana.	162
— nobil. flore alb. simpl.	13
— coerule.	13
— purpur.	13
— stellata.	44
Heracantha.	215
Heragrostis.	146
Herba paris.	8
Herniaria glabra.	64
Hesperis alpina.	24
— saxatilis.	24
— sepiaria.	22
Hieracium alpin. latifol.	154
— asperum majore flore.	154
— caule aphylo hirsut.	225
— chondrill. fol. glabrum.	234
— coronopi fol.	234
— dentis leon. fol.	154
— fruticosum latifol.	231
— angustifol.	234. & 265
— minus.	266
— intybaceum.	154
— longius radicat.	235. 155
— luteum glabrum.	64
— hirsut.	236
— majus Diosc.	64
	Hiera.

Index.

Hieracium majus erect.	64
— minus dent. leon. fol. oblongo.	235
— obtuso.	236
— sub aspero.	235
— glabrum.	64
— montan. angustifol.	64
— glabrum latifol.	266
— minus.	65
— murorum fol. pilosissimo.	155
— minus piloso.	236
— laciniato.	236
— pilosell. fol. majus.	235
— minus.	235
— pratenfe latifol.	154
Hippocastanum.	65
Hippomarathrum.	177
Hippuris tenuis sim. fetis.	58
Hirundinaria.	45
Holosteum caryophyllæum.	25
— petræum.	139
Hordeum distichum æstiv.	236
— spica nitid.	236
— zea dict.	236
— polystichum hybern.	236
— vernum.	236
Horminum sylvestr. latifol.	155
Hottonia.	236
Hydroceratophyllum.	155
Hydrocotyle.	266
Hyoscyamus vulgaris.	155
Hyoseris angustifol.	235
	Hyoscri

Index.

Hypochoeris porcellia.	235
Hypericum Androsæmum.	156
— Ascyrum.	156
— minus erect.	156
— non ramos.	156
— supinum.	156
— villosum erect.	156
— vulgare.	156
Hyssopifolia. aquatic.	254
Hyssopus officin.	156

I.

Iacea aculeata.	222
— humilis fol. integro.	238
— nemorenf.	237
— nigra angustifol.	231
— pratens. nigra angustifol.	238
— latifol.	237
— laciniat.	237
— pumila supina.	157
— cum squamis ciliis instar pilosis.	237
— vulgaris laciniat.	238
Iacobæa fol. erucæ instar laciniatis.	157
— latifolia.	238
— montana lanuginosa.	157
— palustris altiss.	238
— vulgaris lacin.	157
Ilex aculeata.	44
Imperatoria major.	157
Iris palustris lutea.	65
-- pratens. angustifol. humilior.	65
Iris	

Index.

Iris pratens. angustifol. non foetida.	65
-- tenuifolia major.	64
Isatis lativa.	65
— sylvestr. latifol.	66
Iva moschata.	217
Juncago palustris.	157
Juncus acumine reflexo.	239
— acutus.	239
— altissimus.	96
— angustifol. villosus.	66
— articulatus.	239
— bombycinus.	67
— foliaceus.	238
— foliatus minim.	158
— floridus major.	121
— lævis panicula sparsa.	158
— non sparsa.	158
— nemorosus.	158
— latifolius.	8
— palustris humilior.	266
— repens erectus.	158
— parvus.	239
— trifidus.	238
— villosus capitulis psyllii.	22
Juniperus arborefcens.	158
— vulgaris.	158

Keiri officinar. K. 23

Labrum veneris. L. 226

Y Lactu.

Index.

Lactuca	agnina.	37
—	crispa.	159
—	foliis Endiv.	159
—	fol. oblongo.	159
—	Italica laciniat.	159
—	montan. latifol.	249
—	perennis humilis.	240
—	ranarum.	179
—	romana.	159
—	sylvestris.	240
—	costa spinosa.	240
Ladanum	segetum.	231
Lagopus	major.	198
—	maximus.	103
Lamium	alb. linea notatum flore albo.	22
—	purpureum.	22
—	fol. caul. ambient. majus.	22
—	minus.	23
—	luteum vulgare.	23
—	maximum sylvat.	231
—	montan. meliss. fol.	70
—	oblongo fol. flore rubro.	23
—	Plinii.	23
—	purpureum foetid. folio majore sub-	
—	rotundo.	23
—	— minore sub-	
—	rotundo.	23
—	vulgare album.	23
Lampfana	Dodon.	159
Lapathum	aquat. maximum.	240
—	minus.	240
	Lapa-	

Index.

Lapathum fluitans.	179
— fol. acut. crispo.	159
— minus acut.	60
— plano.	159
— rubente.	160
— minimum.	241
— pulchrum Bonon.	160
— vulgare fol. obtuso.	160
Lappa major.	241
— capitulis glabris.	242
— montana major.	241
— minor.	259
Laserpitium.	242
Lathyrus angustifol. rectus.	73
— filiqua hirsuta.	160
— arvensis repens.	66
— latifol. luteus.	66
— sylvaticus.	160
— sylvestris.	160
Lavendula angustifol.	241
— latifolia.	241
Laureola fol. deciduo.	35
— semper virens.	34
Lens major.	241
— repens.	170
— palustris.	161
— vulgaris femine ex luteo pallido.	242
— subrufo.	241
Lenticula aquatica trifulca.	161
— palustris fol. major.	161
— quadritolia.	160

Index.

Lenticula palustris vulgaris.	161
Lentibularia.	242
Lepidium latifolium.	241
Leucanthemum villosum.	66
— vulgare.	161
Leucojum bulbos. hexaphyll.	4
— triphyll.	4
— hesperid. fol.	24
— luteum vulgare.	23
— vernum perenne album.	24
Lichen arboreus.	161
— capillaceus longiss.	162
— cinereus arboreus.	162
— latifol. ramosus.	162
— vulgaris.	162
— crustæ modo arboribus. adnasc.	
— flavus.	9
— pullus.	9
— verrucosus cinereus.	9
— fruticosus pendulus.	162
— minimus.	163
— petræus latifol.	162
— pulmonarius saxatil.	161
— pyxidatus oris coccineis.	162
— major.	272
— minor.	272
Ligustrum.	242
— variegat.	242
Lilac.	67
Lilium conyall, alb.	67
— florib. è follicul prodeunt.	67
Lilium	

Index.

Lilium convall. latifol.	67
— montan. flor. reflex. alb.	163
— alterum lanugi-	
— nosum	163
— purpurascente.	
—	163
— vulgare.	163
— purpureo croceum majus,	164
Limofella.	266
Linagroftis panicul. ampliore.	67
— tenuiore.	67
Linaria aurea major.	131
— flore pallido.	164
— hederac. fol.	24
— pumila arvensis.	164
— fegetum nummulariæ. fol. villoso fu-	
— rotundo.	165
— auriculato.	156
— vulgaris alba.	164
— flore luterio majore.	164
— minore.	164
Lingua cervina.	242
Linofyris Rivin.	40
Linum arvense.	165
— cathartic.	166
— pratense seu minimum.	166
— fativum.	165
— fylvestre floribus purpurascant.	165
— angustis foliis, flore minore.	
—	165
Lithospermum majus erectum.	166

Index.

Lithospermum arvense minus.	166
— — — flore luteo.	166
— — — medium.	166
— — — flore albo.	167
— — — nigrum.	121
— repens minus.	67
Locusta.	37
Lonchitis.	251
Lotus corniculat. glaber.	167
— hirsutus.	167
— pentaphyll.	67
— pratensis filiquosus.	68
— tetragonolobus.	68
Lunaria major siliqua longiore.	68
— rotundiore.	68
— botrytis.	176
Lupinus sylvestris.	167
Lupulus foemina.	267
— Mas.	267
Luteola falic. fol.	167
Lychnis annua minima.	243
— aquatic. purpur.	69
— quæ Behen. alb.	243
— montana viscosa.	68
— papav. spumeum.	168
— pratens. flore admodum laciniat. albo.	68
— — — purpureo.	68
— saponaria.	168
— segetum major.	167
Lychnis	

Index.

Lychnis fegetum rubra.	167
— sylvestr. alba simplex.	68
— angustifol.	68
— latifol.	68
— vaccaria.	167
— viscosa rubra.	69
Lycoperdon minus.	269
— vesicar.	267
— vulgare.	267
Lycopodium.	172
Lycopus palustris fol. incis.	243
— villosis.	243
— glaber.	243
Lyfimachia coerulea.	216
— humifusa.	169
— folio subrotund.	69
— lutea cornicul.	246
— major.	243
— purpur. spicata.	253
— siliquosa angustifol.	135
— hirsuta major.	218
— — minor.	218

M.

Majorana tenuifol.	268
— vulgaris.	267
Malus acido fructu.	70
— sylvestris.	69
Malva vulgar. flore majore.	169
— minore.	169
Martagon. vulgar.	163

Marrubiastrum.	244
Marrubium alb.	244
— aquatic.	243
— cardiaca dict.	244
— nigrum.	118
— palustre hirsut.	243
Matricaria tanacet. fol. flore majore.	169
— — minore.	169
— vulgaris.	70
Matrifylva offic.	43
Mays.	244
Medica echinata minima.	70
— sylvestris.	169
Medicago.	170
Melampyrum album.	170
— coma cristata.	170
— coerulea.	170
— luteum.	170
Melilotus altiss. flore alb.	171
— luteo.	171
— capsul. reni similib.	214
— flore albo.	171
— luteo.	171
— major odorata.	171
Melissa hortensis.	70
— humilis latifol.	70
Melo reticulatus.	171
— rotundus.	171
— vulgaris.	172
Mentha aquatica.	243
Mentha	

Index.

Mentha aquatica repens.	245
— arvensis verticillat.	245
— palustris rotundifol. rubra.	245
— sylvestr. longiore fol.	172
— longiorib. & nigriorib. fol.	244
— rotundiore folio.	172
Menthastrum fol. rotundo.	172
— longiore.	172
Menyanthes.	70
Mespilus apii fol.	71
— fol. rotundiore.	71
— subrotundo.	71
— sylvestris non spinosa.	52
— fol. trifido.	71
— vulgaris.	71
Mercurialis montana testiculat.	24
— spicata.	24
— foemina.	71
— Mas.	71
Meum.	172
Mezereum germanic.	35
Millefolium aquatic.	236
— umbellatum.	246
— nobile.	172
— vulgare alb.	72
— purpur.	72
Milium semine alb.	268
— luteo.	268
— nigro.	268
— folis.	166
Y 5	Mili-

Index.

Milium sylvaticum.	170
Montia.	269
Morus fructu alb.	25
— nigro.	25
Moschatellina.	9
Muscus arboreus.	162
— barbatus.	162
— capillac. fol.	173
— coralloides.	162
— corallin. montan.	271
— longiss. aquatic.	110
— pyxidatus.	273
— squamosus.	172
Myagrurn foetid.	113
— monospermum.	72
— sativum.	41
— filiquosum.	199
Myosotis arvensis subhirsuta flore majore.	25
— — minore.	25
— hirsuta.	25
— altera viscosa.	25
— minor.	26
Myosuros.	13
Myriophyll. aquatic.	180
Myrrhis annua nodosa.	128
— foetens.	73
— palustris latifolia alba.	72
— — rubra.	72
— feminib. lævibus.	51
— tuberosa.	72
Myrtillus.	107
	N. Na-

Index.

N.

Napellus flore coeruleo.	260
— luteo.	108
Napus fativa.	26
— sylvestris.	26
Narcisso leucojum minus.	4
— vulgare.	4
Nasturtium aquatic. majus & amarum.	49
— hortenfe crispum.	173
— petræum.	26
— sylvestre.	73
— tenuiter incisum.	173
Nepeta officin.	125
Nicotiana.	246
Nidus avis.	73
Nigella arvensis.	246
Nissolia.	73
Noli me tangere.	118
Nummularia.	69. 169
Nux juglans.	73
Nymphæa alb. major.	173
— minor.	174
— minima.	174
— lutea major.	174

O.

Ocimoides album.	68
Ocymastrum alb.	68
— rubr.	69
Odontites flore lut.	248. 176
	Ompha-

Omphalodes pumila.	26
Ocnanthe aquatica.	174
— altera.	174
Olsnitium.	257
Onagra latifol.	246
Onobrychis.	246
Ophioglossum.	174
Ophris.	73
— unifolia.	98
Opulus.	73
Orchis abortiva fusca.	73
— araneam referens.	78
— autumnal. lut.	76
— barbata odore hirci.	78
— — minor.	78
— bifolia altera.	74
— — latissima.	73
— — minor.	74
— cimicum redolens.	78
— — purpurea.	74
— flore nudi hominis effigiem repræsent	77
— — foliis sessilib. maculat.	78
— — non maculat.	78
— fucum referens.	78
— — major.	78
— — sub virente flore.	78
— — variegat.	78
— — foliis candidis & purpur.	78
— — —	78
	Orchis

Index.

Orchis fucum referens colore rubiginos.	78.
— latifolia hiantе cucullo.	79
— altera.	79
— spica. compacta.	79
— militar. major,	79
— minor.	79
— montan.	80
— maculata.	80
— pratensis humilior.	80
— morio foliis sessilib. maculat.	78
— non maculat.	78
— muscam referens lut.	176
— major.	175
— minor.	175
— myodes.	176
— palmata angustifol.	268
— batrachit.	76
— minor.	76
— montan.	80
— pratensis angustifolia.	76
— latifol. major.	76
— minor.	76
— maculata.	80
— montan. variegat.	175
— palustris altera.	77
— latifol.	77
— maculat.	77
— tota rubr.	77
— papilion. referens.	78
— parva lutea.	176

Orchis

Index.

Orchis simiam referens.	74
— spiralis.	272
— strateumatica.	75
— trifolia major.	26
Oreoselin. apii fol. maj.	246
— minus.	247
— pratenfe.	247
Origan. fylveſtr. alb.	247
— purpur.	247
Ornithogal. bifol. german.	9
— flore carneo.	9
— exalbido.	9
— bulbifer. anguſtifol.	10
— luteum majus.	9
— minus.	9
Ornithopodium majus.	175
— minus.	175
Orobanche hypopit.	176
— ramoſa cœrul.	248
— purpur.	248
— ſubalbido.	248
Orobuſ ſylvatic.	26
Oſmunda.	176
Oxaliſ minima.	203
— ovina.	39
— vulgaris.	40
Oxyacantha.	71
Oxycoccus.	176
Oxys flore albo.	27
— purpuraſc.	27

Index.

P.

Padus.	19
Palma Christ.	77
Paludapium.	207
Panicum vulgare spica aspera.	268
— molli.	268
— multipl.	268
Papaver erratic. maj.	81
— minus.	81
Parietar. vulgar.	81
Paris Herba.	8
Parnassia.	248
Passerina.	256
Pastoria bursa minim.	26
Pastinaca latifol. fativ.	82
— palustris.	254
— sylvestr.	82
Pecten veneris.	96
Pedicular. mont. angustif.	82
— palustr. rubra.	82
— pratens. lut.	82
— erectior.	82
— purpur.	82
— ferotina lut.	248
Pentaphylloides argent. alatum.	83
— erectum.	181
— palustre.	177
Pentaphyllum flore alb.	29
— minus.	29
— parvum hirsut.	29
Pepo oblongus.	177
	Pe-

Index.

Pepo vulgar.	177
Peplus.	196
Perfoliata.	121
— arvensis ann.	211
Periclymen. germ. non perfoliat.	48
— rectum.	50
Perfica buxea.	27
— rubr.	27
— vulgar. seu virid.	27
Perficaria angustifol.	249
— ferrum equin. referens.	249
— minor.	249
— mitis maculos.	248
— non maculos.	249
— palustris fluitans.	250
— pumila.	249
— salic. fol.	249
— urens.	250
Pervinca flore alb.	28
— coerule.	27
Petasites.	10
Petrofelin. crispum.	207
— vulgare.	207
Peucedan. aquatic.	131. 252
— germanic.	177
Phalangium ramos.	83
— non ramos.	83
Phaseolus major flore alb.	178
— coccin.	178
— vulgar.	177
Phellandrium.	178
Picea	

Index.

Picea major rubra.	39
Pilosella major.	235
— fol. angustiore.	57
— repens hirsut.	56
— filiquosa.	46
Pimpinella sanguisorba major.	269
— — minor lævis.	269
— — hirsuta.	269
— saxifraga major.	102
— — minor.	102
Pinus montan. altera.	83
— sylvestris vulgar.	83
Pistacia sylvestris.	98
Pisum arvense.	84
— hortense majus.	84
— minus.	84
— humile.	84
— majus quadrat.	84
— umbellat. proliferum.	84
Plantago aquatica.	253
— humilis.	253
— minor.	252
— angustifol. major.	84
— — minor.	85
— latifol. glabra minor.	84
— — hirsut.	85
— incana.	85
— sinuata.	85
— trinervia.	85
Pneumonanthe.	32
Pœonia commun.	86

Z

Pœnia

Index.

Pœonia flore pleno.	85
— fol. nigricant.	85
Polium campestre.	250
— lavendul. fol.	250
— angustiore.	250
— montan.	269
Polyacantha.	214
Polygala major alba.	178
— coerulea.	178
— purpur.	178
— vulgar.	179
Polygaloides Haller.	28
Polygonifolia.	250
Polygonatum latifol.	86
— — maximum.	86
— — minus.	86
Polygonum Tabern.	251
— angustifol.	251
— latifol.	250
— minus alterum.	41
— — polycarp.	110
— minimum.	118
Polypodium angustifol.	251
— minus.	251
— vulgare.	251
Polytrichum officin.	197
Populago major.	86
— minor.	87
Populus alba.	10
— nigra.	10
— tremula.	11

Portu.

Index.

Portulaca angustifol.	252
Portulaca latifol.	252
Porrum fativ.	252
— sectile.	256
— sylvestre.	252
— latifol.	126
Potamogeton alpin.	180
— angustifol.	249
— foliis undulat.	179
— caule compresso.	181
— crispum.	179
— floscul. ad fol. nodos.	180
— fol. lato splendente.	179
— graminifol.	180
— ingens graminifol.	253
— longo ferrat. fol.	181
— minus non ferrat.	180
— pusillum,	252
— ramosum angustifol.	180
— rotundifol.	179
Primula veris flore odor.	11
— pallido.	11
Pruna avenaria.	28
Prunus sylvestris.	28
Pseudo melanthium.	167
Pulsatilla flore purpur.	28
— rubr.	29
Pulegium vulgare.	245
— repens.	245
Pulmonaria angustifol. maculat.	11
— arborea.	161
Z 2	Pul.

Index.

Pulmonaria fol. echii.	11
— gallica fœmina.	236
— gallica fœmina tenuifol.	236
— maculat.	11
— non maculat.	12
Pulsatilla flore purpur.	28
— rubr.	29
Pyrola fol. mucron.	181
— rotundifol.	181
Pyrus fativa.	87
— sylvestris.	87
Pyxidaria.	269

Q.

Quercus latifolia.	87
— vulgaris.	88
Quinquefol. majus alb.	29
— repens.	29
— minus repens.	29
— lanuginos. lut.	29
— fol. argent.	181
— paluître.	177
— petræum maj.	181

R.

Ranæ morfus.	174
Ranunculoides fol. circin.	182
Ranunculus aquatic. alb. fol. circinat.	88
— — fluitans peucedan. fol.	88
— — aquatic, capillac,	88

Ranun-

Index.

Ranunculus arvensis echinat cum globul.	88
— hederac. fol.	89
— aquatic. rotundifol.	88
— arvensis echinat.	90
— flore citrino.	30
— — phoeniceo.	30
— graminifol. flore caudat.	13
— lanceat. major.	182
— montanus aconit fol.	89
— — magno flore.	89
Ranunculus nemorosus.	30
— palustris longifol. major.	182
— — minor.	182
— fol. sagittato angustiore.	183
— — maximo.	182
— — minore.	183
— plantagin. fol. ampliore.	253
— — humilis.	253
— — ferratus.	30
Ranuncul. phragmit. alb.	30
— luteus.	30
— purpur.	30
— pratens erect. acris.	31
— — maculatus.	31
— — dulc.	89
— repens hirsut.	90
— verticilli modo rotunda	89
— major.	89

Index.

Ranuncul. rotundifol. minor.	90
— tridentat. vernus flore alb.	12
— — — — — magno.	13
— — — — — coerul.	12
— — — — — rubro.	12
— — — — — sub purp.	12
— — — — — violaceo.	12
— — — — — apicib. alb.	13
— — — — — nibr.	13
Rapa fativa oblonga.	183
— orbiculat.	183
— rotunda candid.	183
— — — — — flavesens.	184
— — — — — minor.	183
— — — — — punicea.	184
— — — — — vulgaris.	183
Raphanistr. flor. alb. striat.	90
— — — — — filiqua arriculat. mi-	
— — — — — nore.	91
— — — — — segetum flore lut.	91
— — — — — filiqua articulata glabra.	91
Raphanus aquaticus.	98
— major oblongus.	90
— minor oblong.	90
— niger.	90
— orbicular.	90
— — — — — rusticanus.	92
Rapistrum aquatic.	97
— arvense fol. auriculato.	91
— — — — — flore albo striato.	90
— — — — — luteo.	121
Ra-	

Index.

Rapunculus alopecuroid.	91
Rapunculus fol. oblongo spica orbiculari.	91
— nemorosus.	122
— scabiosæ capitulo.	184
— spicatus.	91
— fol. maculato.	91
— vulgaris campanululat.	48
— non macul.	92
Reseda vulgaris.	84
Ribes officinar.	63
— nigr.	63
Rhamnus cathart.	92
Rorella.	253
Rosa alba vulgar.	93
— flore pleno.	93
— campestr. spinosissima.	92
— lutea multiplex.	93
— maxima multipl.	93
— purpurea.	93
— rubra multipl.	93
— simpl.	93
— sylvestris pomifera.	93
— repens alba.	92
— rubente flore majore.	92
— vulgaris flore albo.	92
— incarnato.	92
Rosmarinus hortens. angustifol.	184
— argenteus.	184
— latifolius.	184
— spontan. latiore fol.	184
— variegat. folio.	184

Ros folis fol. oblongo.	253
— folis fol. subrotund.	253
Rubeola lævis.	185
— vulgar quadrifol.	184
Rubia coerulea elatior.	142
— parva.	44
— sylvatica lævis.	142
— sylvestris Monspessulana.	185
— tinctorum.	185
Rubus idæus spinosus.	93
— fructu albo.	94
— repens.	94
— vulgaris.	94
Ruta hortensis.	94
— lunaria.	176
— muraria.	185
— palustris.	147
— pratensis major.	195

S.

Salvia baccifera.	155
— sterilis.	155
Salicaria hyssopifol. angustifol.	254
— latifol.	254
— vulgaris.	254
Salix aquatica.	33
— aurita & non aurit.	32
— caprea latifol.	31
— folio longo utrinque albido.	33
— ex rotunditat. acuminat.	33
— fragilis spontan.	32
Salix	

Index.

Salix	humilis angustifol.	94
—	humilis capitul. squamos.	32
—	latifol. repens.	32
—	rotund.	31
—	lutea fativ.	33
—	maxima hirsuta.	33
—	minima fragil. hirsut.	31
—	oblongo incano fol.	31
—	pumila.	32
—	rubra.	31
—	sylvestris latifol.	32
—	vulgar. alb. arborefc.	31
—	nigricans.	31
—	rubens.	31
—	vulgatissim.	33
Salvia	baccifera.	186
—	fol. tenuiore.	186
—	latifol.	185
—	ferrata.	186
—	major.	185
—	fol. ex lut. & virid.	185
—	minor aurita.	186
—	non aurita.	186
—	sylvestris.	217
—	tricolor.	186
Sambucus	aquatica.	73
—	fructu nigro.	95
—	viridi.	95
—	humilis.	94
—	montana racemos. rubr.	33
Samolus	Valerandi.	186

Index.

Sanguis Dracon. herba.	160
Sanguisorba major.	269
— minor hirsut.	83. 270
— lævis.	83. 270
Sanicula.	95
Saponaria.	168
Satureja fativa.	95
Saxifraga alba.	33
— aurea.	7
— graminea pusilla;	205
— verna.	33
Scabiosa angustifol.	227
— capitata squamat.	238
— capitulo globoso major.	186
— minor.	187
— fol. integro flore albo.	187
— majore hirsuto.	187
— hirsuta flore alb.	187
— coerule.	95
— montana.	95. 96
— ovina.	184
— pratens hirsut.	95
— major.	95
Scandix minor.	96. 40
— vulgaris.	96
Scirpus palustr. altiss.	96
Sclarea major.	96
— pratens. flore alb.	96
— coerule.	96
— rubent.	96
Scordium.	126
	Scor-

Index.

Scorzonerafol. falv.	217
— angustifol.	187
— humil. angustifol.	187
— latifol.	187
— laciniat.	188
— latifolia sinuat.	188
Scrophularia aquat. major.	188
— nodosa foetid.	188
— palustr non foetida.	188
Secale hybern.	188
— vernum.	188
Sedum maj. vulgare.	254
— minim. luteum.	189
— minus luteum.	189
— ramulis reflexis.	189
— teretifolium alb.	189
— majus.	189
— palustre subhirsut.	189
— parvum acre.	189
Sempervivum minus vermiculat.	189
Senecio minor vulgar.	97
Serratula.	237
Serpillum vulgare citr. odor.	190
— majus flore albo.	190
— purpureo.	190
— minus fol. acutiore.	190
— flore alb.	190
— purpur.	190
— capitulo lanuginoso.	190
Seseli pratenfe.	206
Sicla officin.	119
	Side-

Sideritis.	97
Sideritis glabra.	97
Sigillum Salomon.	86
Sinapi alb.	34. 97
— arvens. præcox.	191
— erucae fol.	191
— rapi fol. fativ.	34
Sisymbrium annuum.	255
— aquatic.	97
— fol. in profund lacin.	98
— raphani fol.	97
— cardamine hirsutum.	18
— erucae fol. glabr.	97
— palustre repens.	98
Sium aquatic. maj. angustifol.	254
— aquatic. virulent.	254
— latifol.	254
— palustre.	191
— umbellat. repens.	255
Smilax hortensis.	178
Solidago faracenic.	201
Solanum maniacum.	118
— officinar. acin. lut.	256
— nigr.	255
— quadrifol.	8
— scandens.	98
— tuberos.	255
Sonchus altissimus.	192
— arboresc.	192
— asper laciniat.	191
— asper non laciniat.	191
	Son-

Index.

Sonchus coeruleus.	239
— lævis angustifol.	256
— laciniat. latifol.	255
— minor.	256
— purpureus.	239
— repens.	192
— fylvatic.	220
Sophia Chirurgor.	255
Sorbus alpina.	53
— fativa.	34
— torminal.	52
Sparganium non ramos.	192
— ramosum.	192
— minimum.	192
Speculum vener.	122
Spergula.	112
— minima.	16
— minor.	112
Sphondylium vulg. alb.	195
— purpur.	195
Spina Cervina.	92
Spinacia vulgar.	192
— capsul. semin. aculeat.	195
Squamaria Riv.	114
Stachys major germanic.	256
— fylvatica.	231
Staphylodendron.	98
Stellaria aquatica.	99
— minor.	99
Stœchas arvens. minim.	244
— citrina angustifol.	227
	toe.

Index.

Stoechas citrina latifol.	227
Stramonium.	99
Succisa hirsuta.	187
Symphytum majus flore alb.	100
— coerul.	99
— purpur.	99
— pumil. repens.	26
Syringa alba.	100
T.	
Tamariscus germanic.	195
Tamnus racemosa.	100
Tanacetum inodorum.	169
— vulgare.	270
Taraxacum officinar.	21
Taxus.	34
Telephium.	206
Tertianaria.	216
Testiculus vulpinus.	74
Teucrium pratense.	105
Thalictrum fol. angustiss.	256
— majus striat.	195
— non striat.	270
— minus.	256
— pratense angustifol.	270
— angustissimofol.	256
— minus.	195
Thlaspi arvense perfol. majus.	34
— minus.	34
— filiquis latis.	100
— clypeat. minus.	42
— iberidis fol.	42
Thla.	

Index.

Thlaspi incanum campestre majus.	42
— montan. lut.	205
— oleraceum.	34
— supinum lut.	42
— umbellatum amar.	100
— vulgatus.	100
Thymelæa lauri fol. decid.	35
— semper virens.	35
— linar. fol.	257
— alpina linifol.	35
Thymus vulgaris.	101
— fol. tenuiore.	195
Thyffelin. palustre.	257
— Plin.	256
Tilia fæmina.	101
— fol. majore.	101
Tithymalus amygdaloid.	257
— angustifol. 197.	257
— arvensis latifolius.	257
— characias.	101
— cyparissias.	35
— capitul. rub.	36
— punctat.	36
— foliis pin.	195
— foetidus.	196
— helioscopius.	196
— latifol. cataput. dictus.	101
— montan non acris.	196
— myrsinites angustifol.	196
— palustris fruticos.	196
— rotundifol.	196
Tithy.	

Index.

Tithymalus sylvatic. lunato flore.	101
— verrucosus.	196
Tormentilla alpin.	197
— sylvestr.	197
Tragopogon majus.	101
— minus.	102
Tragoselinum majus.	102
— minus.	102
Tribuloides.	197
Tribulus aquatic.	197
Tridactylitis tector.	34
Trichomanes.	197
— minus.	198
Trifolium acid. flore alb.	27
— purpur.	27
— arvense humile spicat.	198. 244
— capitul. spumos.	199
— echinat.	70
— fibrinum.	70
— hepaticum.	12
— Lupulin.	102
— montan alb.	103
— lupulin.	198
— purpur.	102
— spica longiss.	198
— pratense album.	103
— minus.	103
— non maculat.	103
— luteum capitulo brevior.	102
— purpur.	103
	Trifo.

Index.

Trifolium pratense purpur. majus.	198
— filiquosum.	167
— spica oblonga rubr.	198
— montan. longissim.	198
— subrotund. rubr.	103
Triglochin.	157
Triorchis trifol.	26
Triticum æstivum.	199
— hybernum.	199
— indic.	244
— typhin.	199
Turritis.	104
— alpina.	199
— foliis infer. cichor.	36
— hirsut. mont.	36
— leucoj. fol.	193
— minor.	104
— petræa.	104
— vulgar. ramosa.	36
Tussilago.	13
Typha palustr. clava gracil.	104
— major.	104
— minor.	104

V

Vaccaria.	167
Vaccinia palustr.	176
Valeriana aquatica minor.	36
— hortensis.	37
— major odorata.	37

A a

Vale-

Index.

Valeriana palustr. maj.	36
— minor.	36
— sylvestr. maj.	36
— alter.	37
— minor.	37
Valerianella arvens. præcox.	37
— femine umbilic.	38
— ferotina.	38
Veratrum flore atro rubent.	199
Verbascum fæmin.	258
— latifol. seu Mas.	258
— lychnit. flore.	258
— nigrum.	258
— flore ex lut. purpurasc.	258
— pulverulent.	258
Verbena cœrul.	258
Veronica aquat. maj.	199
— minor.	200
— major.	200
— frutesc.	106
— minor.	405
— montan.	106
— pratens. serpill. fol.	105
— spicata angustifol.	258
— longifol.	259
— minor.	105
— supina teucree facie.	105
Viburnum.	106
Vicia dumetor. maxima.	106
— minima cum filiq. glabris.	106
— multiflora.	106
Vicia	

Index.

Vicia fativa alba.	106
— vulgar. femine nigr.	106
— segetum filiquis singularib.	106
— hirsut.	107
— sepium.	200
Victorialis longa.	111
Vinca pervinca.	28
Vincetoxicum.	45
Viola aquatica.	236
— arvensis bicolor.	38
— flore coeruleo & candid.	38
— luteo.	38
— hortensis tricolor.	201
— lunaris.	68
— Martia alb.	14
— arborese.	107
— purpur.	13
— montan. alb.	201
— coerule.	200
— lutea.	201
— tricolor.	205
— pentagonia.	122
— sylvestr. major.	14
Virga aurea angustifol.	238
— latifol.	201
— pastoris.	227
— ferrata.	201
— virginian.	259
Viscaria Rivin.	69
Viscum.	14
Vitis Idæa fruct. alb.	107
A a 2	Vitis

Vitis Idæa fruct. nigric.	107
— rubr.	107
— fylvestris.	107
Ulmaria offic.	202
Ulmus campestr.	14
— fol. glabr.	15
— latissim. scabro.	14
— minor.	15
Urtica urens maxim.	259
— minor.	259
Volubilis nigra.	229
Vulneraria rustica.	202
Vulvaria.	219

X.

Xanthium.	253
Xylosteum.	50



Addenda.

ad pag. 111.

Alkekengi officinar. T. five Solanum halicacabum vulgare IB. 609. est Halicacabum repens flore monopetalo diviso candido, bacca rubra Ic. vid. Garidell. in Hist. plant. Tab. V. & in Rivin. Coqueret. Juden Kirschen nostrat. Schlitten, Buppen-Kirschen, in denen Weinbergen und in der Ruprechtsau, zwischen denen Hecken häufig. *perenn.*

ad pag. 16.

Alfene verna glabra T. flosculis albis rosaceis umbellatis five Caryophyllus arvensis umbelliferus IB. 3. 361. est Holosteum cariophyllæum arvense Tabern. hist. Ic. 2. pag. 543. Acker-Mägelein Gras, aller Orten, in denen Früchten Acker. *ann.*

ad p. 50.


Carpinus Dodon. T. & Matthiol. Epit. pag. 71. five Fagus sepium vulgo Ostry Theophrasti IB. 1. 146. flore amentaceo osseo in umbilicis foliaceis. Charme Hagen oder Weiße Buchen, aller Orten in denen Waldungen. *perenn.*

ad p. 98.

Sorbus aucuparia IB. 1. 62. five Sorbus sylvestris alpina Lobel. icon. 107. est Aucuparia Rivin. Vogelbeer-Baum, forbier sauvage auf dem Gebürg Hochfelden, hin und wieder in Gärten. *perenn.*

Corrigenda.

In Fundament. botanolog. nro 11. lin. 2. lege pro terra, terræ. In horto alsatic. Pag. 4. lin. 5. post & add. J. p. 8. lege nemosus p. 11. l. 6. deleatur five p. 12. post translata adde planta p. 19. l. 1. dele striato p. 29. leg. repens p. 31. l. 13. leg. suaveolent. p. 32. l. 28. leg. candicantibus. pag. 34. l. 10. add. und braunrothen p. 37. l. 5. conjunge Olufatri pag. 41. l. 9. leg. rocambole p. 42. l. 13. leg. filiculis pag. 42. l. ultim. lege animalium p. 45. l. 2. post color. add. Ugley p. 45. l. 10. add. perenn. pag. 54. l. 6. leg. læviore p. 81. l. 4. leg. calcarib. p. 84. l. 2. leg. Kienbaum p. 100. l. 11. leg. caret. p. 102. l. 1. lege tragopogon. p. 109. l. 17. leg. major p. 116. l. 24. leg. suaveol. p. 134. l. 12. leg. angulato p. 136. l. 20. leg. Queue p. 152. l. 27. leg. prodr. p. 157. l. 7. l. radice p. 177. lin. ultim. leg. smilax 187. l. 8. leg. scabios. p. 188. l. 5. lege Bouc p. 204. l. 26. leg. tenuibus p. 210. l. penult. leg. lentiformi p. 215. l. 22. leg. chamæleon p. 229. l. 1. leg. Sau pag. 235. l. 22. leg. de porc pag. 240. l. 24. leg. major pag. 242. l. 24. leg. cerf. p. 246. l. 24. leg. Esparvette.



Lindern, Franz Balthasar <<von>> ,

Hortus Alsaticus Plantas In Alsatia Nobili, In Primis Circa Argentinam
Sponte Provenientes, Menstruo, Quod Singulae Florent, Ordine Designans ;
Annexo Characteres, Loco Natali, Ac Florum Colores, Additis Aliquibus
Iconibus, Aeri Ad Vivum Incisis, Ut Et Aliis Ad Botanices Doctrinam Rite
Addiscendam Pertinentibus, In Usum Botanophilorum Excursiones Facientium

Argentorati 1747

Bamberg, Staatsbibliothek -- Bip.Bot.o.34
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11428292-7
VD18 10740171-004